




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3618/A Vol. 3





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3618/A Vol. 3



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3618/A Vol. 3



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3618/A Vol. 3


3618⁽³⁾A

A. XVIII. P

1208

LIBRERIA ALDO MANUZIO
VENEZIA

REG. N.	
BUSTA	612
CAT.	N



EPITOMES

Omnium Galeni

PER GAMENI OPE

RVM, VNIVERSAM IL-
LIVS VIRI DOCTRINAM.

& methodū, quā accu-
ratissimè continētis,

SECTIO QVARTA.

PER ANDREAM LACVNAM

Secobiensem, Doctorem Medicum, atq; ex sacro

Militum Sancti Petri apud Urbem collegio,

Auratum Equitem, summa fide

atq; studio collecta.

CAVTVMEST PONTIFICIA, CÆSAREA,

& Christianissimi Regis, Augustissimiq; Senatus

Veneri autoritate & decreto, ne quis impunè

hoc opus aut cudat, aut ab alio excusum,

quā à Hieronymo Scoto,

exponat venale.

VENETIIS M D XLVIII

LIBRARIUM

42599

PER GAMES

PER GAMES

PER GAMES

PER GAMES

PER GAMES

SECTIO QVART

PER ANDREAS

PER ANDREAS

PER ANDREAS

PER ANDREAS

PER ANDREAS

CAVITATE

CAVITATE

CAVITATE

CAVITATE

CAVITATE

VENETIS M D XLVIII

ILLVSTRISSIMO ET REVEREN-
 disimo D. D. Petro Pacheco, Gienensi Episcopo,
 atq; S. R. Ecclesiæ Senatori Vigilantissi-
 mo, Andreas Lacuna, Secobiensis,
 Doctor Medicus, Miles San-
 cti Petri. S. P. D.



IVT corpus erectum sortitur
 homo, sic animum ad sublimia
 erigeret, neutiquā caducarum (ut
 solet) rerum, teneretur admira-
 tione, Pater Obseruandis, sed per
 petuo & Diuina suspiceret, et as-
 sidue in eorum exerceretur medi-
 tatione. Caterum quum ita sit natura cōparatum mor-
 talibus, ut pars quidem uicti, ac ueluti captiui ducti à
 suis cupiditatibus, illis tantum inferuiant: pars autem,
 adeo ignaui, stupi^tiq; sint, ut animam habeant, nec ne,
 ignorent penitus: contingit sanè, ut perpauci eorum sur-
 sum aspicere queant (lux enim lippos maxime offendit)
 sed omnes fere humi serpāt, instar crocodilorum. Id quod
 certè est in causa, ut si quādo uideant canem transilientē
 per circulum, aut tripudiantē simiam, aut deniq; foedissi-
 mum Scythā supra funem saltātem, uniuerſi, sui ipsorū
 obliti, confertim ad id genus spectacula cōfluant: atq; ea
 quidem admirentur stupefacti: negligent autem & asper-
 nētur cōditoris illius nostri opera: quæ si, ut decet, expē-
 derentur, omnium spectatorum animos in maximā admi-
 rationem sui, cōmendationemq; cōuerterent. Nam ut im-
 præsentiariū præteream ordinatas illas orbium cœlestiū

aaaa ij

lationes, constātiſſimos ortus ſyderum, uiciſſitudines tē-
porum, animaliumq; generationes & incrementa, quæ
captum humanū ſuperāt: de ijs autem diſſeram, quæ in-
dies calcantur pedibus: quid obſecro admirabilius poſſit
unq̃ contingere, q̃ ex erucæ, naſturtij, aut alio uix perce-
ptibili ſemine, oriri herbam bicubitalem? ex nucleoq; ali-
quo exiguo, naſci prodigioſæ magnitudinis arborē? Ete-
nim poſtea q̃ ſemē in terram, ueluti in matricem quandā,
coniectum eſt, attracti humoris copia intumeſcit, intume-
ſcensq; rūpitur, ac duo de ſe emittit germina: unum qui-
dem, quo terræ adhæret, ab eaq; ſibi alimentū ſugit: quæ
eſt radix: alterum uerò, quod ſolem uerſus, à quo uiuiſi-
catur, erumpens, ab uno caudice in uarios tādē ramos
diuaricatur. Atq; hic ſanè plantarum eſt ortus: quas qui-
dem uniuerſi Philoſophi & Medici, animatas eſſe dixe-
runt, neq; id iniuria: q̃ nimirum animantium ritu gignā-
tur, creſcant, uiuant, atq; ſenio abſumantur. Primò ſiqui-
dem ſunt molliuſculæ, ductilesq; & tractabiles, ut infan-
tes. Dein proceſſu tēporis adoleſcunt, ſuiſq; articulis ro-
borantur. Poſtea uerò iam conſiſtentes, ubi creſcere deſti-
terunt, & renituntur trahenti, & ſolida fructuum uber-
tate pingueſcunt: donec tandem concedentes naturæ, ho-
minum inſtar ſeneſcunt, atq; fatiſcentes dehiſcunt. Repe-
ritur etiam, ut in animalium generibus, ſic ſexuſ uterq;
in ſtirpibus. Diſcernitur autem à ſœmina maſculus, q̃ ſo-
lia huius prius germinent, ſoliſq; ſœminæ ſint minora.
Quòd ſi maſculus adeò coniunctus ſit ſœminæ, ut ſoliſ
mutuò ſeſe contingāt: aut ſi ex flagrantia maſculi portio
aliqua ad ſœminā, uentorum beneficio, puenit, ipſius

foeminae fructus cito ad maturitatē perueniunt. Sunt au-
tem stirpes ut cæteris rebus omnibus longē amœniōres
& iucundiores uisu, sic earum usus mortalium uitæ mul-
tis numeris necessarius: utpote à quibus non modò alimē-
ta ipsa, sed etiam medicamenta, quibus utimur ad profligandos morbos, multaq; alia pertinētia ad uitæ cōmodi-
tatem, p̄ficiſcantur. Vnde nō immeritò Marcus Curius,
Lucius Quintius Cincinnatus, Marcus Valerius Corui-
nus, Cyrus Persarum Rex, aliq; Viri grauiſſimi, allecti
plantarum amœnitate, plurimum agriculturæ indulſe-
runt. Quum igitur undecim cōmentarios Galeni de uiri-
bus medicamentorū simplicium: septem, de compositione
pharmacorum ſecūdum genera: ac deniq; decem alios de
compositione medicaminum iuxta ſingulas noſtri corpo-
ris partes (in quibus non modò uniuerſæ dotes, ac ſacul-
tates plantarum, ſed uaria etiam morborum genera, eo-
rumq; abſolutæ curationes exaggerantur) ſuperioribus
diebus ad Græcorū exemplarium fidem reſtituiſſem, re-
ſtitutosq; cōtraxiſſem in methodū ut breuiorem, ſic mul-
to ſtudioſis aptiorē, ſtatui equidem hos ipſos uigintiocto
cōmentarios, Naturæ theſeuos quosdā opulētiſſimos,
tibi, Antistes Reuerendiſſime, nuncupare: idq; non ut ex
hac ipſa dedicatione aliquid ſplendoris accederet tuæ Cel-
ſitudini, quæ iam pridem ob inſignem prudētiam, uariā
eruditionem, raram incredibilemq; Clementiā, ac deniq;
ſummam pietatem, conciliauit ſibi omnium bonorū ani-
mos, atq; extra omnē ingenij aleam eſt poſita: ſed ut tui
nominis fulgore illuſtrati, inirēt multo maiorem gratiā
eruditorum hominū: ſub tuoq; patrocinio, ueluti ſub cly

peo Aiacis, delitescentes, non tam facile impeterentur à
uirulentis quorundā morsibus, quibus alienæ famæ de=
trahere, & exercitium, & summa uoluptas est. Siquidē
quum olim summi Imperatores & Principes, aduersus
impedentes fluctus & tempestates fortunæ, cōmuniren=
tur literis: nūc ingenuæ artes et disciplina, ut tutò pro=
dire possint (Proh dolor) fautoribus & Mecœnatibus
egent. Ceterū si. T. C. hasce nostras lucubrationes de=
fendendas suscepit, nulla inuidia, aut calumnia, in nos
quicq̃ moliri poterit. Quòd si quæ barbarorum ac sophi=
starum cohors (hi nāq; præcipui sunt, infestissimiq; bona=
rum disciplinarū hostes) accedat propius, ut faceffat no=
bis negotium, cōfestim in pedes se conferet, uel solius no=
minis tui fulmine perterrefacta. Adeò siquidē heroicæ
illas ac nondum satis laudatas Virtutes tuas, quadam se=
ueritate, grauitateq; prudentissima adornas (quod pas=
sim de te omnes prædicant) ut non minus tetræ ac flagi=
tiosis hominibus, terrori ac formidini sis, q̃ ingenuis om=
nibus admirationi. Quibus quidē rebus adductus Diuus
Carolus. V. Imperator, Tridentinæ synodo te unū inter
alios omneis præfecit, ut singulari sapientia tua, Eccle=
siæ causam tuereris: sibi nimirum persuadens, te præsen=
te, nihil transactum iri, quod non pium, non æquum, non
sanctum, non deniq; uniuersæ Christianæ Reip. maximè
salutare futurum esset. Quam prouinciam adeò alacri=
ter suscepisti: eaq; fide et pietate suā pacem, religionemq;
Ecclesiæ restituendam curasti, ut. S. D. N. P. III. P. M.
te inter Purpuratos illos Patres censuerit tandem annu=
merandum: sentiens haud dubiè se non minus accessu tuo

illustraturum Senatum illum Patrum Amplissimorum:
q̄ exornaturum Amplitudinem tuā tam splendida, tãq;
iusta pietatis tuæ, atq; integritatis corona. Quocirca Il-
lustrissimi illi, Reuerendissimiq; omnes collegæ tui, su-
mo desyderio tenentur uisendæ tuæ Celsitudinis, in eaq;
suos pascēdi oculos: sed inter omneis præcipuè Illustris-
simus et Reuerendissimus D. D. Franciscus à Bouadilla
& Mendoza, Cardinalis Cauriēsis. meusq; Mecœnas
maximus. Qui quidem tuarum uirtutū præco, ut est stu-
diosissimus tui, iam uellet ut moram rumperes, quo lice-
ret sibi ac cæteris frui isto cōspectu tuo, splendoreq; illis
tam exoptato. Cui nec potuissē equidem (quod certò
scio) rem unq̄ gratiorem facere, q̄ si hosce labores meos,
futuros ceu testimonium quoddam arctissimæ illius ne-
cessitudinis, quam inter uos mutuò alitis, consecrārē tuo
numini: nec poterit Tua Celsitudo, q̄ si ipsos singulari
suo patrocínio dignetur. Deus, Op. M. Amplitudinem
istam tuam, Antistes Obseruandis. diu nobis q̄ florētis-
simam seruet, ut tum pietas, tum religio, tum bonarum
literarum studia, sub tali coryphæo & protectore inua-
lescant. Vale. Venetijs. Ex ædibus Illustrissimi &
Sapientissimi Viri, D. D. Ioannis Furtadi à Men-
dozza, in hac Rep. Oratoris Cæsarei
Vigilantissimi. XV. Cal. Maias.
M. D. XLVIII.

INDEX COMMENTARIORVM

qui in hac sectione quarta habentur : nominaq;

Doctissimorum uirorum, quorum uersio=
nibus sumus usi & adiuti.



E SIMPLICIVM medica=
mentorum facultatibus, lib.
xi. Theodorico Gerardo in=
terprete.

De compositione medicamento=
rum secundum genera, lib. vii.
Ioanne Guinterio Andernaco

interprete.

De compositione medicamentorum secundum partes,
lib. x. ~~Ioanne Guinterio~~ interprete. 309

De theriace ad Pisonem, lib. I. Ioanne Guinterio Ander=
naco interprete.

De Antidotis. lib. II. Ioanne Guinterio Andernaco in=
terprete.

De ponderibus & mensuris, libellus, Andrea Lacuna,
Secobiensi, authore.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E S I M P L I C I V M M E D I C A M E N T O R V M

Facultatibus liber Primus.

C A P. I.



Edicamentorum simplici-
cium facultates exquisitè
cognoscere, quum ad ua-
riorum compositionem,
tum ad inuentorum op-
portunum usum, admo-
dum necessariū est. Por-
rò medicamentum omne
id dicimus, quod alterare
nostrā naturam potest: si-
cuti nutrimentum, quicquid substantiam augere. Re-
fertur enim utrūq; ad aliquid. At uerò medicamētum
simplex, et ipsum per oppositionem ad cōpositum nū-
cupatur. Estq; id quod secundum naturam suam, syn-
cerum est. At facultas, causa quædam est effectrix:
eaq; partim actu, ut calefaciendi in igne; partim potē-
tia, siue futuro tempore: quali nimirum calefacit pyre-
thrum. Quum autem singulis medicamentis propria
quædam effectrix facultas insit, aut purgatoria, aut uo-
mitoria, aut alterius generis alia: nosq; alibi demon-
strarimus ex calido, frigido, humido & sicco, corpora
uniuersa conflare, certè facultatum effectricium essen-
tias (de quibus neq; inter Medicos, neq; inter Philo-
sophos conuenit) tum in alijs omnibus, tum in medi-
camentis, has ipsas qualitates statuemus.

Tomus IIII.

Aaaa

Simpliciū me-
dicamētōrū co-
gnitio ad quid
conferat.

Medicamentū
quid.

Nutrimētum
quid.

Medicamēsim-
plex quid.

Facultas quid.
Facultas ē du-
plex, actu. s. &
potentia.

Medicamētis
singulis ppria
quædam facultas
inest.

Essentię facul-
tatū sunt quali-
tates ex quibus
corpora cōstāt

2 GAL. PER. DE
CAP. II.

Facultatis iudi-
candæ experi-
mentū sumēdū
ēē ab ea re ad
quā dicitur.

Aqua frigida
calfacit ex ac-
cidētī vt cali-
da sæpe refri-
gerat.

Calida et frigi-
da facultate, q̄
dicantur.

Examinī uedi-
camētorū quid
requiratur.

Tenuiū et cras-
sarū partiū, q̄
dicant esse me-
dicamenta.

Aquā esse ad
vitā maxime
necessariam.

IN primis autem ac maximè sumendum est iudicā-
dæ facultatis experimentum, ab ea re ad quam di-
citur. Nam quam uim in homine aliquod medicamen
habet, in alio animali eandem nō necessariò fortietur.
Proximum est, ut quod ex accidētī est, distinguatur ab
eo quod primariò & per se. Nam aqua frigida calorē
quandoq; reuocat, cutem refrigerando, contrahēdoq;
ad quod sanè consequitur reuocatio caloris. Rursum
calida quoq; ipsa refrigerat sæpenumero, digerēdo ex
calfacientem humorem. Quæ igitur admota corpori-
bus nostris, primariò ac p se excalfaciūt, ea sanè facul-
tate dicuntur calida: si uerò contrā, refrigerēt, frigida: nō
autē q; alba uel rubra sint, tali facultate sunt prædita.

CAP. III.

ET enim quod ab initio ad finem usq; dum appli-
catum est, magis semper calfacit, aut refrigerat, id
non ex accidenti, sed ex sua natura est tale. Danda au-
tem opera est, ut quodcunq; medicamen in iudicium
uocare uelis, diutius hēreat applicitū, omnis q; sit alie-
næ tum frigiditatis, tum caliditatis expers: ne natiuam
facultatem illius ascititia adulteret qualitas. Porro
quædam tota substantia in sese mutuo & agunt, et pa-
tiuntur: quædam una duntaxat, aut duabus qualitati-
bus. Ad hæc, alia quidem tenuium partium sunt: alia
crassarum: tenuium quidem, quæ facilē in tenues com-
minui partes possunt: crassarum uerò, quæ contra.

CAP. IIII.

SI igit primò aquam, quæ & cōmunissima uniuersis
homīnibus, tam sanis q; ægris est, & ad uitam
maximè necessaria, nec frigidam insigniter, nec cali-
dam, corpori temperato applicueris: dein ijs quæ na-
tura sint intemperata: tertio, quæ aliquo affectu tenē-
tur: temperato quidem admota, plusculo tempore om-
nino ipsum refrigerabit: intemperato uerò, citius qui-

dem refrigerabis id quod frigidius natura fuerit: tardius autem qđ calidius: semper tñ refrigerabit. Quum uidelicet talis existens, nequeat reuocare calorē, quē admodum summē frigida: quę si quadrato, aut iuuenilis corporis naturę pauculo fuerit tempore admota, caloris molietur reuocationem. Sin aliter utaris, semper refrigerabit: id qđ etiā facit admota ijs qui simplici laborant affectu. Nam ubi affectus compositus fuerit, contingit aliud primariō à medicamento fieri: aliud ex accidētī: ut licet cernere in phlegmone, quę calidę copiosęq; fluxionis est soboles. Siquidem quę modicē exalfaciunt pharmaca, dum superfluitatem euacuant, id quod affectum est, protinus frigidius efficiūt. Aqua itaq; potabilis utrobiq; uidetur frigida: id quod nō licet de ijs asserere, quę sulfureę, bituminosę, atq; nitrosę existunt. Immo uerō neq; marina ipsa, prius qđ ascititium frigus summum acceperit, admodum refrigerare conspicitur. Ergo quę exactē ac syncerē aqua est, omnis alterius substantię mistione uacans, ea necessariō ex sua facultate est frigida. Si qua uerō per bituminosa, sulfurea, nitrosa, aut aluminosa loca distillās, aliquid secum eius substantię absterferit, mista iam ea est, non autem exactē aqua. Quod si etiā ipsi aquę potabili igneam aut essentiam, aut qualitatem adieceris, sic etiam quodammodo compositam illam effeceris. Quinetiam aqua limosa, quali apud Ægyptum utunt, composita quadātenus est: sed ea per fictilia uasa optimē percolata, qđ purissima efficitur.

C A P. V.

Iudicatur autem aqua gustu, uisu, & olfactu. Siquidem gustu est pura, si omnis qualitatis expers uideatur. Visu, si syncera & pellucida fuerit. Sic nec odoratu, ullam prę se ferre qualitatem debet, ut sunt quędam prauitatis extremę, quę aut aciditatem, aut acrimoniam, aut faldinē, aut putredinē pręferunt. Igi-

Aaaa ij

Aqua summē frigida i qbus calorē reuocet.

Aqua potabilis frigida existit.

Aqua oīs syncera est naturaliter frigida.

Aquę mistę quę sint.

Aqua limosa apud Ægyptū utuntur.

Aqua debet iudicari gustu uisu, & olfactu.

Elemētum pu-
rū minime re-
peri.

tur aqua, quæ absq; his est omnibus, ut ad naturā cer-
tē, ne ipsa quidē adamussim syncera fuerit, sicuti neq;
aliud ullum sensibilem elemētum, sed ut ad sensum
& usum, syncera est. Quæ itaq; examinanda ueniēt me-
dicamina omnia, omnis extraneę qualitatis ualentis q;
aliena sumpto. **C A P. VI.**

Aqua oīs dul-
cis refrigerat.
Ceratū humi-
dū ablutū fri-
gida, calidos
omneis affe-
ctus refrigerat

Quod autem omnis aqua dulcis manifestō refri-
geret, hinc discas licet, quōd si cerā oleo liqua-
ueris, humidumq; ceratum confeceris, ac postea ipsum
refrigeratum, largiori q; affusione frigide ablutum ad-
moueris, ualenter eos qui febre urunt refrigeret, si hy-
pochondrijs supponatur: nec non omnem phlegmonē,
herpetes, carbunculos, erysipelata, phygethla, & bre-
uiter omnes calidos morbos: id quod non continge-
ret illi per aliquam nuper dictarum aquarum, quæ cali-
dis aduersantur affectibus, calidæ nimium quum sint.

C A P. VII.

Aqua potabi-
lis sola est hu-
mida.

Cæterū q; aqua quoq; potabilis sola sit inter p-
positas humida, ex eadē disces methodo. Nam si
ulcera supra modum sicca, hac irriges, statim admodū
humida & mollia reddentur, quum aliæ aquæ uniuersæ
ulcera desiccant: nōnullæq; etiam ob acrimoniam
exasperēt. Quin etiam sitiētī, dulcis aqua remedio est:
cæterę uerō, acerbiores etiam sitim relinquunt. Tum
aqua inter cutem laborantibus aduersissimū est & po-
culum & lauacrum aque dulcis. Salsarum uerō, nitro-
sarum, sulfurearum, bituminosarumq; omnium, sanē
perutile. Imitari autem potes, sicuti marinam, sic alia-
rum quamlibet, substantia uidelicet admista, quæ in
quaq; uincere cernitur.

C A P. VIII.

Aquę natura.

Aquā summe
humectare.

Aquę igitur propria natura humida & frigida est.
Cæterū summē quidem humectat, siue tepida,
siue temperata ea sit: non autem calfacit summē, nisi
quę extremē ferueat. Quōd si corpus aliquod eucratū,

S I M. M E D. F A C. L I B. I.

calida moderatè perfundas, in ipso quidem pfusionis
tēpore, calidius simul, atq; humidius efficies: paulo ue-
rò post, id seipso euadere frigidius, non tamen siccius,
conspicies. Nam tāetſi humores qui in uasis, alijsq; cō-
munibus spatijs sunt, per id genus perfusiones, uniu-
ſi exhauriant, ipsa tamen uasorum corpora, & uniu-
ſum genus carnosum seipso humidius redditur. Qua-
le exēplum, quāuis ratione diuerſa, licet uidere in ſeni-
bus: qui quum genuinas partes, q̄ adolēſcentes, magis
ſiccas ſortiantur, pluribus tamen excrementis redun-
dant. Hanc itaq; humectandi uim ſolam, nuncq; aqua
deponit. Neq; enim ſiue ſeruens ſit, ſiue etiam extremè
frigida, partem cui affuſa fuerit, ſicciorē efficit: quāq;
ob euaporationem quē à calida perfuſione excitari ſo-
let, perfuſa particula nonnullis longè ſiccior uideatur,
quum præſertim uapor, humor ſit extenuatus.

C A P. IX.

NEc uerò uſq; adeò absurdum fuerit, quod facile
in ignem uertitur, id calidum facultate putare.
Vnum quippe ex ijs quæ facultate talia dicuntur, eſt id
quod ex propria eius quod dicitur materia, tale eſt fa-
cultate. Vt ſi quid facile in ignem uertitur, id non actu,
ſed facultate eſt ignis. Nam hoc quod eſt facultate, ex
aduerſo ei diuiditur, quod eſt actu: ſicuti & quod eſt p-
ſe, huic quod ex accidenti contingit.

C A P. X.

AT quibus conſilium eſt, tutò à rebus extraneis,
ad corpora tranſire animalium, uidere primū
debent, an tenuis ſit eſſentiæ, an craſſæ, quod exploran-
dum uenit. Secundò, an ſibi continuum, denſumq; ac
ſolidum: an interuallis interceptum, an rarum.

C A P. XI.

EOrum autem quæ in conſeſſo eſt facultate eſſe ca-
lida, nullum omnino apparet nos calfacere, prius
q̄ in tenuia ſit cōminutum. Nam ſi quis piper integrū

A a a iij

Aqua ſemper
humectat.

Senes p̄tibus
quidem ſolidis
ſunt ſicci, ex-
crementorū au-
tem copia hu-
midi.

Vapor humor
ē extenuatus.

Ignis potentia
eſt, quod facile
in ignē uertit.
Facultate ali-
quid, ex aduer-
ſo dicitur ei
quod actu.

Calida poteſta-
te, ut nos calfa-
cere poſſint,
debent prius i
tenuia commi-
nui.

Piper calfacit.
Ignis omnium
tenuissimus &
calidissimus ē,
ob idq; facile
penetrat.
Caliditas no-
stra crassæ est
essentiæ.
Calfacientia
corpus, ab eo
initium caloris
assumere.

cuti inspergat, nullam planè caliditatem percipiet; si ue-
rò pollinis instar cuti inspergatur aut linguæ, excalfa-
ciet utiq; ac potissimum si fricueris. Quare multa qui-
dem facultate sunt calida, facileq; in ignem uertuntur,
quæ nos tamen haud facile excalfaciunt. Ignis siquidē,
ut qui omnium tenuissimus & calidissimus sit, mini-
mo negotio penetrat illa, atq; uincit. Nostra autem ca-
liditas, præter q̄ quod crassæ est essentiæ, halituosa q;
adeò existit infirma, ut ægrè quod contingit permutet.
Quare nihil eorum quæ calfacere nos uidentur, perin-
de ut ignis calfacere potest, sed tanquam materia quæ
accenditur facilè. Siquidem mutationis principium à
nostra caliditate accipiētia, ut calami aridi ab igne, nos
contra recalfaciunt, & ueluti partes fiunt quædam na-
tium caloris; ut ignis illi. Quare mirandū nō est, si quæ-
dam medicamenta primæ q̄dem mutationis principium
à nostro calore nacta, inde iam pergāt, eum quoq; qui
mutabat, uincere & superare.

C A P. XII.

Corpus uniuersum
esse trās-
pirabile.

Medicamenta
oīa quo pacto
ī corpore suas
uires exerceāt,

PORRò cutis omnis in primo statim ortu sibi conti-
nua quum sit, tēporis spatio pertunditur, sic ut uni-
uersum corpus fiat perspirabile, arteriæq; ipsæ (quæ
in cutis meatus, quemadmodum uenæ, aperiūtur) un-
dequaq; se dilatantes, per poros attrahant, non aerem
modò, halitumq; sed quicquid etiā trahi facilè potest,
ac præ tenuitate sua, motum ipsius spiritus consequi.
Quam obrem quicquid piperis ad exactissimum fue-
rit redactum pollinem, uerisimile est, simul cum am-
biente aere, ab ipsis arterijs attrahi, protinusq; à calore
natiuo alterari, idq; tum ob paruitatem, tum ob ingeni-
tam ut à calore alteretur aptitudinem. Quod quidem
si semel illi insit, per totum corpus, temporis progres-
su, perlatum, ipsum recalfaciet; prius tamen calfaciens
sibi proximiores particulas, Vnde liquet, crassorū nul-
lum, prius q̄ ad unguem comminuatur, neq; ipsum à

SI M. MED. FAC. LIB. I. 7

nostro corpore quicquā perpeti, nec rursus in nos posse agere. Quod uerò in pipere adduximus, exēplum idē licet ad alia transferas, siue ea calefaciendi, siue etiam refrigerandi facultatem sortiantur.

C A P. XIII.

Consyderandum autem est, non solum crassarum ne sit partium, an tenuium, explorandorum medicamentorum substantia. uerū etiam rara ne an spissa, densaue. Voco sanē rarā, cuius partes inanibus spatijs sunt interceptę. Vbi igitur spatijs eiusmodi multis, quę plena semper sunt aere, corpus fuerit distinctum, facilius q̄ spissum accenditur; etiam si calidius illo non fuerit. Nam qui in ijs spatijs continetur aer, primo statim ignis occurſu accenditur, atque inflammatur (aer enim accensus est flamma, quemadmodum terra, carbo) unā uerò secū corpus uniuersum accēdit. Sic itaq; calamos aridos ignis exurit celeriter, tametsi minus alia substantia calidos, idq; ob meatuum multitudinē, quos prius aer occupabat, quorum argumentum summum, calamorum leuitas est. Nam ficcum natura corpus, leue esse alioqui non posset. Quęcunq; autem fistulosa sunt, multumq; uacui obtinent, pondere existunt leuia. At calamus à nostro corpore ægre calſieri potest, q̄ essentię sit crassę. Si igitur alicuius medicamenti substantia tenuis sit & continua, eandem in nos naturam ostēdet, quam prius in ignem; sin autem rara sit & crassa, fieri poterit, ut ab igne quidem alteretur per faciliē, non tamen à calore nostro, ac proinde nec nos recalfaciat.

C A P. XIII.

Quamuis aqua ipsa tenuis substantiæ sit, non tamen ob id ex sua natura nos calfacit, nec proprium est ignis nutrimentum, sed potius extinguit illum, ut quod illi sit aduersissimum. Nec mirum si cum igne tum calidissimo, tum siccissimo pugnet aqua, fri

Rara quę sint.
Rara q̄ spissa
cur accendant
facilius.

Flāma est aer
accensus.
Carbo est terra
succensa.

Fistulosa omnia
sunt leuia.

Aqua igni aduersissima, nimium frigida & humida.

Aaaa iij

Oleum cur ob-
scure nos cal-
faciat.

Aqua feruens
simul cū oleo,
citius, q̄ illud
absumitur.

Calfaciēs actū
et potētia, unū
quodq̄ dupli-
citer dicitur.

Concrescentia
in glaciē faci-
lius, tēperamē-
ti sunt frigidio-
ris, si vtrūq̄
eadē consisten-
tia insit.

Tenuia corpo-
ra prōpte inca-
lescūt, atque re-
frigerantur.

Ignis non con-
gelatur.

gida & humida existens. Porro oleum, tametsi in flammam uertatur facile, non tamen admodum celeriter, nec manifeste nos calfacit, ob lentorem substantiæ, quo tenaciter inhæret ijs, quæ semel contigit: neq̄ ab ambiente facile aut extenuari, aut augeri ualēs, nec promptē intus in corpus transumi. Aqua uerò, & celerrimē in halitum soluitur, & expeditē digeritur. Quod si in idem uas coniectam aquam, oleumq̄ decoquas, prior aqua absumetur. C A P. XV.

VT autem calfacientium, aliud est simpliciter calidum, ut ignis: aliud exuperantia, ut qui in nobis est calor: sic eorum quæ facultate sunt calida, aliud quidē ad id q̄d primò & absolute est calidū: aliud uero ad id q̄d per exuperantiā refertur. Non ergo quod citius accendit, protinus ad nos simpliciter apparet calidius.

C A P. XVI.

Sed neq̄ citra limitationem, ex eo q̄ aliquid in glaciem cogatur, debemus frigidum esse colligere. Nam in ijs quæ eandem habent aut tenuitatē aut crassitudinem consistentiæ, quod ocys à frigore congelatur, temperamenti est frigidioris. Si uerū alterum sit tenuius, puta exempli gratia, uinum: alterum crassius, ut oleum: non est necesse aut citius, aut magis concrescere quod est frigidius: nisi frigiditatis excessus, q̄ huic inest, excessum crassitudinis, quæ inest alteri, superet.

C A P. XVII.

Est autem refrigerari, frigidam qualitatem recipere: at congelari, durescere est præ frigore. Quæcunq̄ igitur corpora tenuis essentia sunt, promptē tū incallescunt, tum refrigerantur: at non aquē congelantur: ut aer, & ignis. Nam hic planē non congelatur: ille autem, nempe aer, non perinde ut uitrum, pix, cera, resina & bitumē: cuius quidem, tametsi calidissimum sit, terrenitas tamen crassitiesq̄, ad congelationis celeritatem adiuuat. Porro aquam quæ celeriter & incalē-

sceret, & refrigeraretur, meritò leuissimā esse dixit Hippocrates. Nam quanto tenuior fuerit, tātò pati erit pròptior. Atqui quæ tenuior est, minimum habet limi terreftris. Non ergo absolutè ex materiæ passionibus ad ignē, conijcere eius ad nos facultatem oportet: quum multò securius sit hoc iudicium, quo ad nostrum corpus quippiam examinamus. Quòd lac simile nō sit, nec undequaq; sibi simile, coagulatio indicat, qua sero sæ partes à caseosis facilè separantur. In uniuersis etiā liquoribus, qui à fructibus exprimuntur, crassum deferitur quippiam, quod spatio temporis subsidet: uocaturq; fæx in uino; in oleo autem amurca. In aceto uerò est eiusmodi quipiam: ac forsan ipsum est, quod caloris est particeps. Nam quod frigoris, id quod tenue est. At acetum maiori ex parte frigidius est, q̃ calidius.

CAP. XVIII.

Perperam igitur faciunt, qui usq; adeò calidum esse acetum pronunciant, ut cauterio illud assimilent: quum tamen nec tantam sensu percipiamus in aceto caliditatem, nec ipsum crustas, instar cauterij, excitet. Constat siquidem ubi per cauteria consilium est, sanguinem sistere, crustam relinqui haud exiguam, quæ ueluti operculum sit corporibus sanguinem profundentibus. Ac proinde illis cauteria planè candentia applicamus: quæ haud quidem q̃ calfaciant, sed q̃ urant, atq; subiectis partibus operculum, quā Græci uocant escharam, relinquant, fluentem sanguinē supprimunt. Itaq; acetum, haud perinde ut crusta facientia medicamenta, sed potius ut astringentia citra crustam, sanguinis fluores cohibet: qua ratione non excalfacere, sed refrigerare potius ipsum existimandum est.

CAP. XIX.

Si uerò idiotam aut plebeium aliquem (nam horum in istiusmodi rebus icorruptum est iudiciū, quia nulli dogmati seruiliter sunt addicti) temperato aceto ex

Aqua q̃ dicat
leuissima.

Lac non esse
simile.

Fæx.
Amurca.
Acetum maio
ri ex parte fri
gidius q̃ cali
dus, exilit.

Cauteria san
guinem suppri
munt, q̃ relin
quāt escharā.

Acetū, qua rō
ne fluentē san
guinē sistat.

Idiotarū iudi
cium cur incor
ruptum.

Acetū est frigidum, q̄q̄ calorū particeps

Acetū ardorē a thapsia excitatū, sua refrigeratione restinguit.

spongia fouerimus, dein autē interrogauerimus, nū calorem an frigus percipiat, fatebit̄ quidē se, primō sanē frigus percipere: postea autem, nempe spōgia sublata, sensim nascentis in parte quādam calorū phantasiā sentire. Vnde perspicuum est, omnino quidem frigidum esse acetum, obtinere tamen quendam calorem, qui acrimoniæ ratione per accidens successu temporis corpora calfacit; nisi fortē ubi laxus ac doloris expers tumor infestat. Si quis etiam illo ab illata thapsia utat̄, ardor aceto restinguitur: nō q̄ acrimoniā & mordacitatem obtundat, ut oleum atq̄ rosaceū, sed q̄ euidenter refrigeret. Quare nisi molesta facultatis asperitas illi inesset, non alio utendum ad refrigerationem foret.

C A P. X X.

Aceti tēperatūram non lōge a media distat

Q Vum autē alij ob acrimoniā ipsius, calidissimū esse acetum contendunt; alij contra, maximē frigidum, quod putent ipsum grumos cōstringendo dissoluere, uerisimile est, id iuxta mediū consistere. Quippe si longē ab extremorum utroq̄ distaret, nō tanta incidisset de facultate ipsius controuersia.

C A P. X X I.

Neutra dici tripliciter.

Acetū quā rōne dicat̄ neutrum
Rosaceū quā ratione dicat̄ neutrum.

Q Via uerō quæ neutra sunt, dicuntur tripliciter, secūdam diuisionem Herophili, partim ambo- rum extremorum participatione: partim neutrius: partim nunc illius, nunc huius: mihi sanē tum acetum, tum etiam rosaceū, utriusq̄ extremi necessitudine, esse neutra uidentur: & q̄ nunc quidem sensibilibiter calfacere, nunc refrigerare cernantur.

C A P. X X I I.

Aeris tenuitas unde iudicet̄.

Ignē cōm non esse tenuem.

Q Vod uerō ad aerem spectat, iudicatur eius tenuitas, ex sola in tenuia diuisionis celeritate. Ceterū si ea ratione ignis sit tenuis, haud omnis ignis tenuis existimabitur, quum æs & ferrum fiat ignis, non tamen q̄ antea tenuius. At flammæ, quum aliud sint ignis genus, re uera tenues existūt. Quocirca non om-

SIM. MED. FAC. LIB. I. 11

nis ignis est tenuis, nec quicquid tenue, protinus & ignis fuerit. Nam pruna ignis quidem est & non tenuis; & aer tenuis, uerum non ignis.

Tenuia oia nō esse ignem.

CAP. XXIII.

Quocirca minimè concedendum arbitror, acetum, quod mordax & tenue sit, calidum continuo esse. Nec enim quicquid mordax fuerit, id & calidum est: fortè uerò, nec quicquid mordax fuerit, & tenue.

Mordacia oia non eē calida.

CAP. XXIIII.

Eorum igitur medicamentorum quæ uehementer aut refrigerant, aut calfaciunt, non sunt facultates ambiguæ. Verum ea de quibus dubitare cōtingit, neutra omnino esse, necesse est. Pleraque autem, ut ad sensum simplicia, expugnātibus facultatibus constant: ob quas quidem fieri potest, ut acetum uim illam obscure calfaciendi, quam ostendit, sortiatur, existens alioqui tenue, refrigeratorium, atque exiccatorium medicamentum. Etenim quidam efflorescere rubor in partibus ab acetum

Neutra eē de quibus dubitari cōtingit.

Aceti facultas

CAP. XXV.

Ceterum non sat est generaliter uires medicamentorum cognoscere, quod hoc uidelicet calfaciat, illud autem refrigeret, nisi etiam ipsarum facultatum excessus & gradus, accuratissimè didicerimus. In qua quidem cognitione, tum artificialis simplicium usus est constitutus, tum ratione proficiscens ac methodo compositio: ipsorumque compositorum recta usui accommodatio.

Facultatū medicamentorum excessus & gradus discendos esse.

CAP. XXVI.

Perperam autem superioris seculi homines à compositis orsi medicamentis, eorum quæ in illa ingrediuntur medicamentorum simplicium uires diiudicabant. Quum non liceat rectè composita ipsa cognoscere, prius quàm simplicia sigillatim examinarimus.

Cōposita cognosci nō posse, simplicibus ignoratis.

CAP. XXVII.

Atque hi quidem, quum citra iudiciū simpliciterque

compositis omnibus facultatibus fidem habent, uel Empiricis ipsis reprehensionis locum & occasionem exhibent.

C A P. XXVIII.

Sensus cur nō
sint cōtēnendi.

Quum autem non aliunde ignem calidum esse, ac glaciem frigidam cognoscamus, q̄ ex sensu ipso, omnino stupidi sunt, qui sensus esse cōtēnendos existimant.

C A P. XXIX.

Oxycrati vi-
res.

Aquā ab ace-
to deduci per
vniuersum cor-
pus.

Aqua uino p̄-
mixta, q̄ sola,
cur efficacius
restringat sitim

Vini semper
ad auget sitim

Porrò æstiuo tempore oxycrati potu, quidam plā-
nē refrigerantur, atq; sitis expertes permanent. At
nondum constat, an id aceti causa contingat. Dixerit
tamē aliquis, aquam, tardioris distributionis quum sit,
ab aceto, tanq̄ uehiculo, duci digeriq; in uniuersas par-
tes. Sic etiam si cum uino bibatur aqua, sitim efficacius
extingui, q̄ si sola. Refrigerationem itaq; sitisq; sana-
tionem ab aqua prouenire, ut quæ frigida & humidaq;
naturæ sit: cæterum adminiculo esse, ac ueluti alas illi
ad omnes corporis partes permeandas, tum uinum, tū
acetum: quæ ipsa nequaq; frigida sunt & humida: alio-
qui ad restringendam sitim, præstaret ea sola, q̄ cum
aqua, exhiberi. Porro ut à uino apparet homini semp̄
sitim increescere, sic ab aceto epoto, interim quidem au-
geri, interim uerò sedari.

C A P. XXX.

Sitis unde exo-
riatur.

Acetū cui siti
remedium sit.

Oxycratū ex
aqua & aceto
constat.

Quum igitur sitis, partim humoris inopia, p̄tim
caloris copia proueniat: neq; à sicca dispositio-
ne prouenientem sitim, neq; à calida & sicca, epotum
sanare unquam potest acetum. At si quando in unum
coeant humiditas atq; caliditas, eiusce sanē sitis, acetū
medela optima existit. Siquidem humectare nequit: at
refrigerare, non instrenuē. Verūm siti, quæ ex compo-
sita affectione, uidelicet calida & sicca, nascit̄, compo-
sita medela est oxycratum, quod ex aceto cōstat tenuit̄
partium, atq; refrigerante; & ex aqua, quæ non modo

refrigerat, sed humidorum etiam omnium est humidissima. Nihil enim aqua est humidius.

CAP. XXXI.

Per se autem solum, quod iudicandum est, expendere oportet, tum in sanis temperatisque corporibus: tum etiam in intemperatis: ac præterea in ijs qui alicui sunt morbo obnoxij. In temperatis quidem, ut supra: in intemperatis autem, sicuti dixit Hippocrates. Naturis picrocholis utilissimum esse acetum: at melancholicis aduersissimum. Porro in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in simplici exploretur affectu: si mixtum alicui, necessum est, id cui miscetur, temperatura sit medium. Siquidem quod medio coniunctum fuerit, ipsum eorum quæ perficietur, existet causa. Quare si acetum simplici cerato commisceas, cerato ipso longè frigidius medicamen effeceris: eritque tibi id remedium uel optimum, ad erysipelata, phlegmonas, herpes, & carbunculos. Sin autem quod mixtum est, tanquam simplex expendas, hallucinaberis. Nam quemadmodum ærugo neque carnem producere, sed ceratum quod illam recipit, sic ulcerum glutinatorium, non acetum, sed oxycratum est. Quippe acetum per se, ulcera erodit & mordicat.

CAP. XXXII.

Iam uerò, quum liceat ex astrictorij complura offendere, quæ minimè sanè conglutinent: sicuti ex conglutinantibus, haud etiā pauca, quæ minimè astringentia uidentur, falluntur quæ absurdissimè, qui astrictoria omnia conglutinare, conglutinantia omnia astringere proficiuntur.

CAP. XXXIII.

Miserè etiam hallucinantur, qui astringentia omnia refrigerare dicunt: quum si nihil aliud, saltem chalcitis, chalcanthos, & misy, quæ ualenter astringunt, tantam assequuta sint caliditatem, ut nos etiam exurant.

Aqua humidiorum omnium est humidissima.

Medicamenta quæ iudicare uolumus, qualiter expedere oporteat.

Acetum biliosis esse utilissimum, aduersissimum melancholicis.

Ceratum simplex aceto ablutum, contra tumores calidos optimè esse perfidum.

Oxycratum uulnera glutinat.

Astrictoria omnia haud quæque conglutinare, neque glutinantia omnia astringere.

Astringentia etiam haud quæque refrigerare.

Dioscoridem
suggillat Ga-
lenus.

Caprillus ade-
ps contra suc-
cos itesina ero-
dentes, cur sit
salutare p̄diciū
Astringentium
opus.

Herodotus autem & Dioscorides, q̄ medicamen-
ta quædam profluuijs alui, atq; dysenterijs mede-
antur, ob id astringentia ea esse colligunt: quum tamen
ne minimum quidem astrictionis sortiatur, sed potius
rarefacientia & laxantia sint. Nam exempli gratia, ca-
prinus adeps, omnibus quæ & gustu & facultate sunt
astringentia aduersissimus est: ijs tamen quæ acria &
mordacia per aluum fluunt, manifestè efficaciterq; au-
xiliatur: q̄ scilicet concresecat facillè, inūgaturq; intesti-
nis, ac plurimo tempore inhærens, illa demulceat, &
foueat Quum uidelicet condensare, cōstringere, & cō-
stipare, opus sit astringentium.

CAP. XXXV.

Tāgibiles qua-
litates.

Visui quæ sub-
iiciantur.

Gustui q̄ subii-
ciantur.

VNaquæq; sensibilibus natura, priuatim subiecta
est, tactui quidē caliditas, frigiditas, durities, atq;
mollities: albedo uerò, nigredo, atq; ut summatim di-
cam, uniuersum colorū genus, uisui: amaritudo, dulce-
do, austeritas, acerbitas, aciditas, salsedo, acrimoniaq;
gustui. Planeq; demens uideatur, si quis gustu colores
iudicare tentet, aut sapes uisu, similiterq; & de alijs
sensibus. Siquidem tactu iudicandæ sunt differentiae
tangibiles: auditu audibiles: odoratu odorabiles. Om-
nis autē inuentionis demōstrationisq; principia sunt,
quæ sensui atq; intellectui euidentia existunt.

CAP. XXXVI.

Saporū diui-
siones ex doctri-
na Platonis.

Porrò Plato in Timæo, sapes (quos Græci χυ-
μοίς appellant) duos primū assignat, eosq; ut spe-
ciei eiusdem, sic rōne maioris & minoris inter se diffe-
rentes. Quorum sanè alterum austum, alterum acer-
bum (qui ex illius intensione procedit) nominat. Secū-
dam speciem facit, eorū qui illis opposita sunt, nitro-
forum uidelicet, salforum, & amarorū. Et in his quoq;
amarus ex nitroso prouenit intensione. Salsus uerò, aut
nitroso imbecillior est, aut astrictionis quoq; assumēs

aliquid. Deinde à Platone acris expositus est: mox acridus: postremo dulcis. At à Theophrasto additus est unctuosus, quem nimirum omisit Plato, ut qui ad gustum nihil attineret.

Unctuosum saporem nihil attinere ad gustum.

CAP. XXXVII.

EXponere autē hos sapores exactē, impossibile est: quandoquidem neq; aliam ullam sensoriam passionem: eum tamen qui tali sensu cōmunicat, recordari fuerit possibile. Igitur quando quod linguae nostrae fuerit ad motum corpus, uehementer desiccatur, contrahitur, & in multam profunditatem usq; illam exasperatur, sicuti pira syluestria immatura, & corna, eiusmodi omne appellatur acerbum: ab austeris tantum intensione diuersum. At quod astringens uocamus, idem uidetur significare quod austerum, aut etiam cōmune esse genus tum huius, tum etiam acerbi. Quae uerò linguam, dum contingunt, non contrahunt, neq; constipant, sed detergunt potius & abluunt, etiam si astringentiū quippiam permixtum habeant, haec omnia falsa cognominamus. At quae his etiam magis detergunt, ita ut etiam molestē exasperent, amara uocantur. Porro quae mordicant, roduntq; idq; cum ualida quadam caliditate, dicuntur acria: sin haec absit, acida: ceterum haec fermentandi quoq; uim obtinent. Rursus, quae ueluti inungunt atq; implent, in statumq; suum restituunt exasperatas ac ueluti erosas linguae particulas, haec, si cum uoluptate manifesta cōtingant, dulcia: sin hac sine, pingua uocantur. Quod si ex calido, frigido, humido, & sicco, coeuntibus, uniuersa constent, uerisimile profecto est, dictarum quamq; qualitatum, ex horum etiam miscella conflare.

Sapores exacte exponere esse impossibile:

Acerba quae. Astringēs esse cōmune genus austeri & acerbi.

Salsa quae dicuntur.

Amara quae.

Acria quae. Acida quae.

Dulcia quae. Pingua quae. Sapores oēs ex miscella quatuor qualitatum primarum nasci.

CAP. XXXVIII.

Verum non quale unumquodq; ex se sit, & ad totā naturam, sed quale secundum corpus nostrum, consideramus. Alioqui nec acetum, nec marina aqua

Medicamenta singula taliadici qualia erga nos sunt.

Experientia est
certissima iudi-
catrix faculta-
tum q̄ medica-
mentis insunt.
Impuros aīos,
prius esse a pa-
ralogismis pur-
gandos, q̄ ve-
ra doctrina i-
buendos.

nos exiccare possent, sicuti nec sicca dici, quum utrumq̄
illorum sit actu humidum. Ceterum si nos exiccare ap-
pareant, sicca dicentur, ad nos uidelicet, & nostram na-
turam, parē siccandi uim obtinentia: de cæteris q̄ qua-
litatibus idem est ferendum iudicium. Quare faculta-
tum omniū quæ medicamentis insunt, experientia erit
certissima iudicatrix. Quam qui relinquunt, nō solum
falsa pro ueris ducūt, sed tractationis etiam utilitatem
destruunt. Idcirco prius delēdi sunt dispungendi q̄; om-
nes paralogismi à discentium animis, q̄ in uera disci-
plina imbuantur. Nam quemadmodum corpora im-
pura, quāto magis nutries, tanto magis lædes, sic quo-
que si impuris animis nutriētes sermones offeras, nō
modò nihil prodis, uerū etiam magnopere obfueris.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E S I M P L I C I V M

Medicamentorum facultatibus. Lib. II.

C A P. I.



Rationem solā
esse nobis cō-
munē cū Diis.
Sensus referen-
tios non esse.

NON desunt qui nobis, mortales quū-
simus, à sensibus auspicandum esse
contendant, ad facultates omnes exa-
minandas: in illis tamen perpetuò im-
morandum nō esse, sed ad partem di-
uiniorem accedendum, nempe ratio-
nem. Sensus quippe & animantibus inesse rationis
expertibus: rationem autem solam, hominibus esse cū
Dīs cōmunem. Qui sophistæ non sentiunt, si à sensi-
bus recedendum sit, demonstrationis primordia futu-
ra esse longè incertiora, quā ea quæ demonstnan-
da ueniunt.

C A P. II.

E Quidem optarim nullas non res clarè sub sensus
nostros

nostros cadere, nec quicquam esse quod illos fugeret. Hoc enim pacto nihil ambiguum unquā aut anceps foret. Verū quoniam illos quedam effugiūt, rationem ipsi superinducere conandum est: sic tamen ut nec cōfusa, nec infinita colligamus, sed ante omnia, nominū significata diligenter definiamus: deinde quod ex se quid agit, ab eo quod per accidens, separetur. Irridendi autem meritō sunt, qui de olei aut rose colore nimis anxie ratiocinantur, quum rebus ipsis uarie uti liceat, de illisq; periculum facere. Ac tales mea quidem sententia, perinde factitare uidentur, atq; ij qui ex aliqua imagine cognoscere quempiam conantur, quem etiam uiuum intueri, maxime illis est licitum.

CAP. III.

TRibus ergo modis in sermone peccant, qui aiunt rosas temperatura esse calidas, q̄ sint rubræ. Primum, q̄ non demonstrata hac propositione, omnis ignis rubet, conuertere ex hac aliam, uidelicet omne rubrum est ignis, tanquam ueram conantur. Secundō q̄ nesciunt, propositiones quæ ex mutuo ueris conuertuntur, non autem simpliciter conuertentes, ueras existere. Tertiō, q̄ etiā si mutuo conuerterentur, non tamen omne quod colore sit rubro, calidum esse, ex mutua illa conuersione sequatur, sed rubrum omne esse ignē: id quod minimē inuestigamus. Eodem errore tenentur, qui ex odoribus, medicaminum facultates coniiciunt. Nec enim quicquid bene redolet, calidū est: nec quicquid calidum est, bene olet. Quin etiā nec si quid graueolens est, calidum etiam fuerit, nec si calidum, etiam graueolens. Sic nec si quis quicquid grauiter oleat, frigidum dicat: nec si quicquid frigidum sit, olere grauiter, uerum dixerit. Siquidem calidorū innumera sunt, partim bene olentia: partim grauiter: partim neutra: atq; frigidorum similiter. Quāquam quid calida dico, ac frigida, cum dicere debeam nos calfacientia, & re.

Tomus IIII.

Bbbb

Ambiguū nihil esset si oīa sub sensus caderēt.

Ratio cur interponēda sensibus.

Rosas q̄ rubræ sint, calidas esse dicētes, quōtupliciter peccēt

Propositiones q̄ ex mutuo ueris cōuertunt, sunt veræ.

Odores nō indicant facultates medicamentorum.

Calidum mul-
tipliciter dicitur
Homo non absolu-
te, sed per exu-
perantiam cali-
dus dicitur.

Color non fat-
est ad iudican-
das medicami-
num vires.

Sophistæ vtun-
tur inductioni-
bus et exēplis.

Inductio quæ exē-
plū validior.

Olei effectus
uarii.

Oleo incocta
reddunt, sicca.

Oleum oculos
mordicat.

Oleum aluum
subducit.

Oleum insecta
perimit.

frigerantia? Etenim aliud est facultate calidum: aliud actu. Et huius quod actu calidum est, aliud absolute dicitur calidum: aliud per exuperantiam: aliud ad symmetrum sui generis: aliud ad quiduis obuium collatum. Homo autem non absolute calidus, quemadmodum ignis, sed exuperantia calidus dicitur: quia maior in eo portio calidi sit, quam frigidi. Ergo & quæcumque ad hunc modum dicuntur calida potestate, illum dicuntur excalfacere, facileque de ipsis iudicium sumitur per experientiam solam, cui adiuxeris paucos quosdam epilogismos. Quare neque a calore, neque ab odore, neque a consistentia, aut huius generis aliquo, de medicamentorum facultatibus est opus ratiocinari.

C A P. IIII.

T Aceo sophistas minimè quidem rationibus scientificis uti, sed aut inductionibus, aut exemplis. Differt autem ex exemplis quippiam suadeas, an ex inductione. Siquidem qui ex exemplis fidem facit, unum, aut duo generis eiusdem affert: aut certè planè paucula, plerisque cæteris preteritis. Qui uerò ex inductione, omnia comprehendere nititur, quæ per experientiam sunt cognita. Quare talis inductio uehementis est, ac plurimum persuadet.

C A P. V.

Quod uerò ad oleum spectat (quo de multa Archidamus citra demonstrationem atque ineptissime prodidit) quæ in ipso coquuntur omnia, sicca & friabilia efficit, contra quam in aqua contingit: quæ uerò sunt illo imbuta, magis propriam humiditatem conseruant, quam si eo madidata non essent. Quin etiam scillæ & urticae morsus oleum persanat: & quum reliquum uniuersum corpus demulceat, tantum oculos mordicat, nec non guttur exasperat. Subducit autem aluum: lassitudines tollit: tueturque inunctos a frigore, atque lora emollit, insectaque animalia perimit. Quorum omnium causam

reddere debuisset Archidamus. Porro coci oleo tum carnes, tum pisces, interim dum assantur, oblinunt, q̄ siccæ, adustæq; extimæ eorum reddantur partes, si assentur citra talem unctionem. Athletas etiam oleo gymnastæ inungunt, q̄ præsentem quidem lassitudinem soluat; occurrat autem futuris; ac breuiter frictionem tum æqualem, tum mitem efficiat, corpusq; ad motus futuros præparet.

Oleum lassitudinem lenit.

CAP. VI.

AT Archidamus non solum quæ in multis perspicuè apparent contemnit, sed hac etiam parte iure taxandus est, q̄ dicat meliorem esse frictionem siccā, ea quæ cum oleo adhibetur, quia corpus durius & siccius hīs qui inunguntur, euadat: mollius autem hīs qui fricantur sicci. Falli præterea mihi in hoc uidetur, q̄ similiter affici putet tum ea quæ in illo coquuntur: tum eos qui fricantur. Neq; enim eadem agere dixerim oleum calidum, frigidum, temperatum, tepidum, aut feruens, sicuti neq; aquam ipsam. Nam quæ obscuro simile fuerit, herbas in oleo feruente coquere, ac exercitantiū corpora oleo temperato fricare. Etenim si quis uelit expendere oleum, ab omni prius aliena qualitate (à qua semper propria obscuratur) ipsum liberum reddat, atq; ita demum ad explorandum se accingat.

Archidami opinio cōuellitur.

Olei uires qualiter expēdēde Qualitatem propriam ab aliena obscurari.

CAP. VII

PRæparare oleum solemus, non aliter atq; aquam: nempe prius excalfacientes, ac deinde in aquā mergentes summè frigidā. Quod si etiam fons in ipsum cū strepitu decidat, uasculo cui inest oleum, ante diligenter occluso, magis quoq; ac magis ita reddetur frigidū. Multum item frigefeceris, si præcalfactum ita in puteū demittas, ut aquam contingat. Ac sic oleum reddimus frigidum: * cōtrario autem modo, calidum. Quo sanè utimur in refrigeratis corporibus, in alueum olei calidi demittentes, quibus pars quæpiam obstupuit, aut qui

Olei refrigerandi ratio.

Olei pfusio calidi, quibus cōueniat.

Bbbb ij

Oliua.
Olea.
Oleum simpli-
citer & p abu-
sum dici.

tremuli sunt, aut conuulsione, aut tremore, aut motus
sensus ue oblesione tentant. Porro fructus ex quo pre-
mitur oleu, oliua nūcupatur: & arbor, olea: atq; hoc q-
dem simpliciter & primariò oleum dicit: reliqua autē
omnia per abusum & translationem.

CAP. VIII.

Olei differētię
complures.

Cæterum ueri olei plures sunt differentię. Secun-
dum ætatem quidem, quū aut recens est, aut æta-
te uigens, aut inueteratum. Secundū præparationis mo-
dum, quum simplex atq; impermixtum fuerit, aut præ-
paratum cum sale. Secundū fructus diuersitatem, quū
is aut immaturus, aut maturus extiterit. Secundum in-
ductam arte alterationem, quum ut ab initio fuit, sic re-
linquitur: aut candidum redditur.

CAP. IX.

Experiri q̄ &
quomō medi-
camēta debeat
mus.

Experiri autē solū oportet, quę impermixta sunt,
& ab omni extranea qualitate aliena: eaq; primū
in optima corporis constitutione: deinde in intempera-
tis: demū in morbis simplicibus.

CAP. X.

Oleum lassitu-
dini confert.

At nonnulli Medicorum, non solū in exploran-
dis medicamentorum uiribus hallucinantur, ue-
rū etiam in opinionibus quas habent de affectibus.
Nām oleum q; lassitudinis remediū sit, omnes p̄pemo-
dum consentunt: cæterū quis affectus sit lassitudo, non
consentiunt: ac proinde secundum ipsorum doctrinā,
nihil certi de olei facultate colligi potest.

CAP. XI.

Oleū expers
salis, et salsum
qua rōne sub-
ducant aluum.

Nec uerò parum interest, an inīciat in uētre pī-
tuita scatentem oleum expers salis, an quod plu-
rimum accepit salis, in uentrem purum. Vtrūq; enim
aluū subducit, facultatibus tamen diuersis: nempe il-
lud quod sale uacat, in pituitoso uentre per lubricitatē:
quod uerò salem habet, in puro, per acrimoniam, per-
inde ut muria, & marina aqua. Idcirco sanè hoc radet,

alterum non rader.

C A P. XII.

Nonnunquam autem mordicationes ex accidenti quod saluginosum est, sanauerit, unà secum educens acres & mordaces humores, pinde ut cætera omnia quæ abluunt. Sed nō statim ubi immissa sunt id genus medicamenta morsus sanāt: quin potius tunc etiā magis exasperant. Siquidē euacuationis, haud mistionis ratione, sanationē moliuntur. At ceratum ex rosaceo & adipe infusum, sæpenumero morsibus cōtinuò succurrit, idq; cōmitionis ratione. Oleum etiam solū, sed dulcissimum, idem frequenter præstitit: sicuti certē adeps hirci, aut succus chondri, aut ceratū ex oleo dulci. Nos autem sæpenumero quibus ex frigore torquebantur dolore interna, iniecto oleo calido liberauimus: atq; ubi maius esse frigus coniecimus, addidimus & anethum: si uerò adhuc etiam maius, rutā quoq; et bitumen. Cæterum occurrunt interdum quædam affectiones permistæ, ex intēperie uidelicet atq; mordicatione: in quibus consueuimus nos anethinum, aut rutæ oleum infundere, anserino in eo liquato adipe: is si non adsit, saltē gallinaceo, aut aliquo aliorum, aut cera mordacitatis experte, qualis nimirū est lota. Vnūquodq; autem medicamentorum temperātium, ubi ualentius euasit humoribus mordicantibus, morsum eorum retundit. Verū si aut ualētioribus facultatibus, aut multis, paucum permistum fuerit, unà & ipsum corrumpitur, alitq; cacochymiam. Quamobrem protinus euacuandi sunt, qui ab ijs quæ temperandi naturam habent, exasperantur.

C A P. XIII.

Sic sanè lac frequēter simul atq; sumptū fuerit, alijs sacescit, alijs in nidorem uertitur, prius q̃ probè cōcoctum, corruptionem temperet. In quibus utiq; primum cacochymix pars euacuar i debet: atq; inde su-

Bbbb ij

*Saluginosa
ex accideſti nō
nūq̃ mordica
tiones sanant.*

*Dolentibus in
testinis q̃ so
leāt opitulari.*

*Cera elota est
mordicationis
expers.*

*Vacuandos p
tinus esse, q̃ ab
iis q̃ tēperandi
naturā habēt,
exasperantur.*

mendus chondrus, & ptisana, & lac, & alia, q̄ ubi probè fuerint confecta, cōferunt ad boni succi generationem. Porro ptisana, ex sua propria natura, boni quidē est succi: uerū interdu, unā cū ijs succis, qui excitant mordicationes, corrumpitur, atque ipsum auget symptoma.

C A P. XIII.

Cacochyma
qua rōne mor-
dicationes fa-
ciunt.

Mordicationi-
bus cibi apti
qui sint.

Lenientia per
se, ab ijs q̄ ex
accidēti id fa-
ciūt quatuor i-
ndicijs distingui
posse.

Lenientia inter-
dū a cacochy-
mis uicta, mor-
dacia reddunt

Cæterū cacochyma, non temperando, sed id q̄d mordicat educendo, mordicationes sanant. Ac proinde, donec uacuentur, hominem, mordicare non desinunt: & insuper euacuata, in partibus asperū sensum relinquunt, aliud medicamen desyderātem: quod non faciunt quæ boni sunt succi & dulcis, cuiusmodi existūt chondrus, lac, atq; ptisana, quæ in id genus affectibus & edenda præbemus, et per sedem injicimus, ubi aut melle, aut quopiam eiusmodi, quod infestabat exterferimus. Quo tēpore opportunus est, & adeps, & ceratū dulce, & oleū dulce. Quatuor itaq; indicijs, quū possis quod per se leniens est distinguere, ab eo quod per accidens, facile cuiusq; talium medicamentorum facultatem inuenies. Primum indicium est, an statim mitiget, an non. Secundum, an simul cum lædentibus euacuetur, an non. Tertium an asperitatem quandam in corporibus ipsis relinquat, an non. Quartum, an nō ita affectis cōmodum utileq; uideat. Nam quum nec protinus mordicationem sanat, nec intus leniendo remanet, molestamq; asperitatē parti affectæ relinquit, quam, si denuo offeratur, exasperat, argumentū est rodentis, ac mordicantis ipsum esse naturæ: ex accidenti tamen quandoq; morsus sanare. At quod continuo mitigat, & nullam excretionem prouocat, sed nec exasperat dum intus manet, imò exasperatorum medela existit, ipsum quidē natura bonum est, uerū interdum à cacochymia quæ ipsum alterat, corrūpitq; mordax efficitur.

L Auanda porrò est nō modò cera, sed pix, resina, & oleum, omniaq; breuiter, quæ cal fieri & fundi quum possint, aquæ misceri nequeunt. Singula igitur modicè calfacta in uas latioris orificij & magnum, cuiq; insit aquæ copia qualitatis expertis, infundito. Dein tundito, et frangito, manibusq; impetè subigito. Postea effusa priori aqua, rursus quod abluatur exal faciens, in aliam æquè synceram aquam inijcito: rursusq; in aliam, et aliam, donec aqua nullam ex eo qualitatē recipiat: quod quidem gustu datur cognoscere. At si quæ sunt lapidosa & dura, ut cadmia & æris squama, & æs ustum, ea cōminuētē exactè in tenuia plurimūm terere in aqua fotana & purissima oportet, idq; sæpius aqua priori effusa, aliaq; denuò instillata, donec nihil in ea innatet, maneatq; aqua prorsus à cōtriti medicaminis qualitate immunis. Sic itaq; abluta omnia quæ elui possunt, expertia mordacitatis redduntur. Ac præter id sanè, oleum etiam candidius reddit. Mitius tamen id uerberari, q̃ alia, debet, ne uidelicet adeò ipsi aquæ misceat, ut ægrè postea secerni possit.

CAP. XVI.

Oleum autem quod immaturum non fuerit (hoc enim astringit) nec preparatum sale, nec recens, ac ueluti etiam nū feruens, ad hæc adamussim lotum, id neq; epotum, neq; infusum, excitabit mordicationē. Quòd si guttur ad tussis impetum prouocet, non ideo mordax dicendum erit. Nam quicquid mordax est & acre, ad tussim incitat: non tamen quicquid ad tussim incitat, existit mordax & acre: quū & pingua mouere impetum ad tussim appareant. Sequitur itaq; si quid non cieat ad tussim impetum, id haudquaquē mordax existere: non tamen perinde constiterit, quicquid ad tussim impetum moueat, cōtinuò mordax esse, nec si categoricas, nec si hypotheticas cōficiamus propo-

Lauanda q̃ sint
medicamenta
et quomodo.

Lapidosa ab-
luendi ratio.

Abluta reddi
mordacitatis
expertia,
Oleum ablutū
candidius reddi

Oleū omphaci-
nū astringit.

Tussim excita-
tia non esse ne-
cessario mor-
dacia.

Tussim mini-
me prouocātia
esse mordacia
non possunt.

sitiones: quod scilicet ex duabus uniuersalibus affirmatiuis, nihil concludi in secunda figura possit, nec conclusio ex necessitate sit uera.

CAP. XVII.

Sternutationis
usus.
Tussis usus.

Tussis causæ.

Potionis desil-
lare semper ali-
quid in pulmo-
nes per arteriã
asperam.

Succis planta-
rum oïbus du-
plex excreme-
tum inesse.
Olei partes.

Natura hominibus sternutandi uim indidit, ut p-
sidio ipsius, quod in naribus infesta molestaque sunt,
propulsarent: tussendi uero, ut quæ in gutture. Contin-
git autem hæc affectio dupliciter: aut resiccata, exaspe-
rataque, quæ in arteria est membrana: aut à delato cor-
pore, inæquali reddita. Hinc siue panis micula, aut alte-
rius cuiuspiam edulij, nobis inuitis, in spiritus meatum
decidat, tussire adigimur: seu si bibentibus affatim ip-
sius potus quippiam eò influat, similiter ad tussim cõ-
pellimur. Percolatur tamen per asperam arteriam per-
petuò in pulmonem ipsius potus tam exile quippiam,
ut protinus ab instrumentis raptum, perfacile quocunque
distribuatur, nec animal ad tussim irriter. At ubi uel id
ipsum plusculum, uel aliud quodpiam seu liquidum, seu
solidum corpus, per asperam deferret arteriam, iam in-
de tussire est necesse, donec à spiritus uehementia mo-
lestum id excutiat. Mordacia itaque gutturis exaspe-
ratione, oleosa uero & pingua, illitu inæqualitatem, &
ad tussim impetum faciunt. Spiritus siquidem, in emi-
nentia quadam impingens, efficit inæqualem concus-
sionem in gutture, ad tussimque animal prouocat. Cete-
rum non eo inficias, ex oleis esse mordicantia pleraque:
qualia tum salsa, tum recentia uidentur: atque hæc quidem
non propria essentia, sed quod omnibus plantarum succis
geminum excrementum insit, alterum crassius, tenuius
alterum. Quæ ambo quum reperiuntur etiam in oleo,
ad concoctionem & discretionem, tempus sanè postu-
lant. Procedete uero tempore, quod crassum quidem
est, nuncupatum amurca, subsidit: quod uero tenuius &
ueluti aquosius & ipsum compositum quodammodo
est, ex acri scilicet essentia, & tenui serosa.

Cæterum serosum istud rufi coloris est, à crasso il-
lo scilicet qualitate absterfa. At oleum ipsum, tū
minimè mordax, tum candidū sua natura existit. Qua-
propter ubi tenue hoc excrementū secretum fuerit, can-
didius & dulcius reddetur. Separant autem ipsum, aut
insolantes oleū, conchisq; aut tollentes in altum; aut uas-
culis in quibus est oleum, calidos subijcientes cineres;
aut oliuatum nucleos, aut frumentum circa ipsa appo-
nentes; aut deniq; medicamenta in uasa ipsa injciētes.
In summa, quod aqueum est, consumunt; reliquum ue-
rò reponunt. Tale igitur oleum, si salis expers, lotumq;
sit, medicamentorum omnium minimè mordax erit, ma-
ximeq; humectat et mollit, si nec summè frigidum, nec
calidum applicetur. Porro cui injectus sal est, nonnulla
quoq; necessariò mordacitas inest. Frictio itaque ex
oleo, magis q̃ sicca, lassitudinem tollit; emollitq; cor-
pora, cohibens occludensq; quicquid è nobis foras ef-
fluere est natum; haud quaq; digerens & exiccans.

CAP. XIX.

Quæ autē ex oleo fit frictio, prorsus æqualis exi-
stit; inæqualis uerò quæ sicca. Cutim siquidem
per siccam frictionem manus coadducūt, ac ueluti du-
plant, uiolenterq; ac præter naturam complicant. De-
inde ubi non amplius prior ueluti duplicatio labentes
sequi manus potest, ipsa quidem recurrit, atq; ad con-
tinuum reuellitur; manus autem semel ac uno impetu
in alteram cutis partem transeunt, inferiorē transgressę
ipsius duplationis partem; ac proinde inæqualem, du-
ram, & laboriosam talem frictionem sentimus. Quod
si læuis lubricaq; exactè sit cutis, nec duplicari facilè
poterit, nec inæquabiliter admittere ipsos manuum de-
cursus. Quare externo aliquo medicamēto indiget, qd
rugas impleat, manibusq; lubricitatem conciliet; quas
ad res oleo nihil aptius inuenias.

Oleum reput-
gandi ratio.

Olei dulcis na-
tura & vires.
Frictionis ex
oleo usus.

Frictionem ex
oleo quidē q̃-
lem, sicca uerò
inæqualē.

Oleū frictio-
nis accom-
datissimū est.

Oleum experi-
undum esse in
hominibus.

QUum autem liceat in hominibus de ipso oleo pe-
riculum facere, nescio equidē qua nam occasione
ducti complures ueteres, ad diuersa alia uertuntur, ut
illius facultates explorent.

CAP. XXI.

Experiendi rō-
nes diuersæ.

Medicamenta
q̄ experiiri vo-
lumus, debent
ēē aliēq̄ qua-
litaris exp̄tia.

Oleū calfacit
quidē, sed non
euidenter ad-
modum.

Oleū quibus
sit noxiū flu-
xionibus.

Oleum videt̄
calorem parē
eis quibus ap-
plicat̄ accēdet̄

AT recta experiendi ratio, in primis quidē ea est,
quæ in corporibus sit temperatis: dein ea quæ in
intemperatis: mox, ut sæpenumero antea monuimus,
quæ in simplicissimis sit, hoc est calidis, frigidis, humi-
dis, atq; siccis affectibus: distinguētibus semper nobis
id quod per se sit, ab eo quod ex accidenti. Curandum
etiam est, ut oleum de quo experimentum sumit, alie-
næ qualitatē sit expers: id quod est in omni medica-
mento obseruandum. Si igitur ita oleum adhibeas, ma-
nifestē comperies, refrigerarē ne, an sit calfacere natū.
Atq; hæc quidem summa est rationis. At opus ipsum
quod perficitur, experientia cōmonstrat. Nam qui ar-
dore tenentur, tantum abest, ut à calore liberentur, ut
etiam magis & æstuent, & processu tēporis calidiores
euadant. At algētibus, ex olei inūctione, perspicua nul-
la aut noxa, aut utilitas conspicietur. Ex quo liquet, cal-
facere quidem ipsum, non tamen admodum, nec eui-
denter, ut resina, pix, & bitumen, quæ uidelicet sponte
fluunt. Nam quæ sicca sunt, ut eis inūgi non possumus,
sic nec simplicia, nec sponte nata medicamēta existūt.
Cæterū in ardoribus, si salis sit expers oleū, perfun-
daturq; frigidum, nonnullum sanē solatium adfert. In
erysipelatis autem, sicuti in omnibus quæ à pura bile
sunt fluxionibus, quantūuis sit frigidum, uel maximē
legdere est natum. Quæ uerò ex sanguine sunt misto cū
bile, eas fluxiones minus aliquātulo affligit: uideturq;
calorem parem eis quibus applicatur, accendere: quā-
do quidem modicē calida, calfacit mediocriter: immo-
dicē autem illa quæ magno ardore æstuant.

Igitur medicamenta omnia quæ facultate dicuntur calida, caloris sui à nobis accipientia principium, partim similiter nos recalfaciunt: partim ualētius. Atq; ex ijs sanè quæ nos æqualiter recalfaciunt, oleum esse mihi uidetur: ac proinde nec conuulsiones, nec tremores, nec sensum tum difficilem, tum deperditum magnopere aut iuuare, aut lædere potest: nisi ascititiū sibi compararit calorem. Tunc siquidem plurimū prouderit. Vnde meritò ueluti materia quædam cæterorū medicaminum fuerit. Nam si frigida illi commisceas, frigidum efficietur qđ mistum erit: sin calida calidū. Quippe quod ex media tēperie est, utrisq; summis inseruit. Porro non calfacere oleum hac ratione quis dixerit, qđ caliditatem quam reperit, non augere, sed conseruare uideatur.

Medicamenta facultate calida quomō nos calfaciant.

Oleū est ueluti materia reliquorū medicaminum. Medium tēperie, utrisq; extremis inseruit.

CAP. XXIII.

Calfacere itaq; nos dicuntur, & quæ energia, siue actu, sunt calida, ut ignis: & etiam quæ potestate. Hæc tamen partim alimenta sunt: partim medicamenta: partim tegumenta. Sed & calidum actu est, quod simpliciter calidum est ut ignis: & quod per exuperantiam, ut animal: & quod ad sui generis symmetrum comparatur, & quod ad quiduis obuium. At quod potestate dicitur, primo quidem distinguit ab eo, quod ex accidenti est. Deinde totidē habet significationū differentias, quot actu calidum. Etenim quum sit ueluti quidam apta materia ei quod est actu calidum, partim ad ea quæ absolutè calida nuncupantur, partim ad ea quæ per excellentiam quandam, tum ad quiddam sui generis, aut speciei deniq; & ad obuium quoduis collatū, ppria fuerit materia. Quocirca quū ea calida quæ ad hominem referunt expendimus, ut alia omnino omitantur, æquum existimamus.

Calfacere nos quæ dicantur. Calidum facultate, & actu, utrūq; quotūplicitè accipiat.

CAP. XXIII.

Oleum multifariam dicitur nos calfacere.

Vestimenta a nobis calfacta nos recalfaciunt. Olei cum vestimentis collatio.

Oleum et vestes non proprie nos calfaciunt, sed obfistentia frigori.

Similia corpora a se mutuo nullam mutationem accipiunt.

Medicamenta quomodo nos calfaciant.

Oleum corpori illitum, caloris & sudoris effluxum prohibet. Oleo ungendi qui sint, & qui minime.

Accidit autem fortassis oleo, ut tanquam alimentum nos excalfaciat, ubi intro in corpus assumitur: quum probatis medicis quibusdam uideatur, sicut ex cibis, ita ex oleo fieri corpori appositionem. Accidit etiam illi, ut tanquam medicamen, sit medium inter nos calfacientia et refrigerantia: tum ut ipsum nos ueluti tegumentum excalfaciat. Nam quemadmodum uestimenta a nobis excalfacta, nos excalfacere consueverunt, ita & oleum. Et quemadmodum illa excalfaciente corpore calidiora minimè euadunt, ita quoque neque oleum. Mediæ siquidem aeris nos ambientis temperaturæ similis est tum qui a uestimentis, tum qui ab oleo profiscitur calor. Quam ob rem tum uestimenta ipsa, tum oleum, calfacere nos non propriè, sed per abusum dicuntur, quod frigori obfistant. Quemadmodum si duos æquè temperatos adolescentes, qui contingantur mutuò, sese dixerimus calfacere, tametsi haudquaquam excalfaciant, sed duntaxat arceant frigus ambientis. Quæ enim similia undequaque corpora sunt, a se mutuò nullam mutationem accipiunt. Respondet itaque calidiori aeri pyrethrū, & piper: moderato autem oleum & pinguitudo: actu tamen aeres sunt calidi: potètia uerò, medicamenta. Siquidem a nobis accipientia excalfactionis principium, partim nos recalfacere sunt nata: partim plus: partim minus. Oleum igitur ex genere eorum, quæ æquè recalfaciunt nos, existēs, duplici ratione ut excalfacere uideatur euenit, quod nimirum instar uestimenti, aut munimenti illinatur: & quod meatus infarciat, prohibeatque foras effluere magnam uaporosi intus caloris partem. Hac ratione, quos largius sudare uolumus, non protinus his ab initio admouemus oleum. Verum eos quidem qui morbo laborarunt, ubi sudare inceperint, tum excalfacto perfundimus: eos uerò qui etiam non laborant, ubi abundè iam satis sudauerint. Porro sanis

quauis occasione exhaustis, inungi et ante sudorem p-
mittimus. Verum quibus cruditas inest, aut corpus la-
borat plethora, his neq; in balneo inungi cōcedimus.

C A P. XXV.

Quemadmodum inter calfacientia & refrigeran-
tia, sic oleum mihi inter humectantia nos, & sic-
cantia mediū esse uidetur. Atq; humectat quidē aqua:
exiccat uerò tum laurinum, tum cedrinum oleum. At
expers qualitatē alienæ oleum, talem seruat nostram
temperiem, qualem scilicet accepit: uaporosas omnes
expirationes uel maximè prohibens. Quod si pluscu-
lum membra oleo frices, comparabis ascititium calo-
rem: qua ratione lassos nō parum iuuabis, q̄ uidelicet
in minutos corporis meatus pingue ingrediatur, ac sic
quæ durata sunt molliat: & q̄ acrem & subtilem hu-
miditatem, quæ latebat sub cute, per halitum digerat.
Nam quum in lassitudine similes quidem animalis
partes siccantur, spatiola autē uacua, tenui, acri, & mor-
dace humore impleantur, ea certè corpora remedijs in-
digent q̄ & siccitatē irrigent, & humorem acrem discu-
riāt. Cui negotio aqua per se sufficeret, si inherere pos-
set corporibus. Quia uerò facilè diffluit, ob id nimirū
illi cōmodissimè oleum miscetur: maximeq; ex utroq;
frictio auxiliatur siccis equalibusq; corporibus: quum
ipsius olei ratione diutius aqua adhærescat. Quare hu-
meccantium et exiccantium, sicuti calfacientium atq;
refrigerantium, oleū ueluti materia existit. Nam si exic-
canti cōmisceas, totum effeceris exiccans: sin humectā-
ti, & ipsum humectās, ac plerunq; magis q̄ antea red-
dideris: ut in aquæ exēplo docuimus. Quum itaq; om-
nibus quæ sibi commiscantur subseruiat oleum, recta
ratione ueluti omnium materia existit: nam licet eorū
necessariò propriam actionē retundat, ac minuat, non
tamē utilitatem: imò est ubi eā quoq; adaugeat. Quip-
pè contusa cum oleo aqua, magis auxilio est lassitudini

Oleū esse me-
diū inter hu-
meccantia & sic-
cantia.

Oleū talē ser-
uat nostrā tem-
periem, qualē
illam accepit.

Lassitudini di-
scutiendæ qua-
lia requirātur
remedia.

Frictio ex hy-
drelæo cur sic-
cis corporibus
auxiliatur.

Oleū est alio-
rū medicamen-
torū materia.

bus, q̄ si esset sola: non sanè quod intendatur uiribus,
sed q̄ ijs quibus opus est, diutius inhæreat.

C A P. XXVI.

QUod autem nisi mediam habeat temperiem id
quod ea quæ primariò affectibus auxiliantur,
ueluti deuinciet, sepe numero ipsorū repugnabit actio-
nibus, generatim quidem ex ipsa rerum omnium na-
tura: speciatim autem, ex medicamentorum historia
licet addiscere. Etenim generatim, quoniam id quod
miscetur, si in contrarium retrahat, admisti sibi facul-
tatem medicamento uincere interim poterit, & in alte-
ram planè speciem id quod ex ambobus miscetur,
transferre. At speciatim, sic etiam id ipsum cogno-
sces. Nam si excalfacientium resiccantiumq; medica-
mentorum cuiuspiam aquam miscere uelis, non modò
nihil eorum quæ agere nata est, fieri uidebis, sed om-
nino obscuratam esse, perindè ac si admista non esset.
Omnino ergò constat mediam obtinere temperatu-
ram debere, quod utrisq; extremis tanquam materia
inseruiet. Quem in ordinem si oleum statuas, utiq; ni-
hil peccaueris.

Mediū esse de-
bere, q̄ utris-
q; extremis ē
futurū materia

C A P. XXVII.

QUum igitur oleum ueluti media quædam mate-
ria sit medicaminum calfacientium atq; refrige-
rantium, constetq; tantūm ex oleo & rosis rosaceum
(quod saltem exactum & simplex est) utiq; & ipsum
talis temperaturæ fuerit, qualis rosarum succus exi-
stit. Quare illos qui adustione tentantur experieris ab
eo refrigerari, protinusq; aliquam utilitatem perci-
pere: qui uerò refrigerati sunt, omnes lædi. Non
tamen ualida in ipso apparebit refrigera-
tio, sed quæ in primo refrigerantium
gradu collocari mereatur.

Rosaceum ex
oleo et rosis cō-
ficietur.

Rosacei tēpe-
ries est qualis
succo rosarum
inest.

Rosaceum in
primo gradu
refrigerat.

31

GALENI PERGA MENI DE SIMPLICIVM

Medicamentorum facultatibus. Lib. III.

CAP. I.



CORPORVM unumquodq; aut calidum, aut frigidum, aut humidū, aut siccū, et dicitur & apparet, interim quidē ex sua natura, hoc est primariō, & per se: interim autem aduēticia qualitate assumpta, quod est per accidens. Porro eorum quæ propria sua natura calida aut frigida, aut humida, aut sicca dicuntur, quædā actu siue energeia talia existunt: quædam potentia. Sed & eorum quæ actu dicuntur, aliud quidem absolutē est calidum, frigidum, humidum, siccum, ueluti elementa: aliud excessu, ut homo, equus: aliud ad symmetrū, seu generis sui, seu speciei: ut leo cum homine cōparatus, homo autem etate florens cum puero: aliud ad quiduis obuium, ut Dion ad Theonem. Quin & corpora quæ potentia talia aut talia dicuntur, unumquodq; ut ad id quod est actu relatū dici necessariō monuimus: id quidem quod facili accēditur, ad id quod actu est absolutē calidum: hoc uerō quod alia calfacit, ad id quod per exuperantiam.

Calidum, frigidū, humidū, siccū, quorū modis unumquodq; eorum dicat.

CAP. II.

IN eo igitur corpore periculum est sumendum, ad quod unumquodq; tale & est & dicitur: à cæteris autem recedendum. Elementa nāq; huiusce tractationis, in primarum quatuor qualitatum, uidelicet caliditatis, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis cognitione consistunt. Porro alimentum à medicamento differt, q; hoc quidem alteret in qualitate: illud autem substantiæ corporis assimiletur.

Alimentum à medicamento quo differat.

Alterationes
sunt duplices.

Medicamento-
rum vires sub
quibus cōtine-
antur alteratio-
nibus.

Qualitates spe-
cificæ q̄ sunt,
& cur sic di-
cantur.

Verū quum duplices sint in genere alteratio-
nes, aliæ specificæ, quæ propriè sanè & primariò
dicuntur alterationes: aliæ uerò quæ contundunt & cō-
trahunt corporis nostri particulas, quas utiq; per abu-
sionem potius q̄ propriè alterationes cognominant: in
primo sanè genere, contineri uires medicamentorum
censemus. Nec enim quicq; mutari ex specie in speciē
possit citrà exsiccationem, refrigerationem, humecta-
tionem, & resiccationem; etiam si constringatur, con-
tundatur, conuulneretur. Dico autem mutari ex specie
in speciē, ueluti quum ex pane fit sanguis: aut ex hoc
caro. Itaq; non ab alio q̄ à calore, frigore, humiditate,
siccitateq; specificas alterationes singuli corporis
affectus accipiunt. Qua ratione quatuor eæ qualitates
elementares, primæ & specificæ nominantur. Earum
igitur, quam unumquodq; medicamentum in mistu-
ra pollentem sortiatur, inuestigamus.

CAP. IIII.

Quum autem totius naturæ respectu bifariam
unumquodq; dicatur calidum, frigidum, humi-
dum, atq; siccum, partim absolutè, ut singula elemen-
torum: partim per exuperantiam, ut homo equus, &
bos, minimè profectò nos Medici inuestigamus, an in
aqua marina humidi simpliciter plus sit quàm sicci (id
enim clarè cōspicimus) sed an corpus humanū facul-
tate sua equaliter resiccare ualeat. Cuius sanè rei sume-
mus periculum, si eam admoueamus corpori, per fo-
menta aut emplastra: id quod ex accidenti, ab eo quod
propria medicamenti ui proficiscitur, distinguentes.

CAP. V.

Ceterū quod per exuperantiam dicitur, id Phi-
losophi accipiunt dupliciter: aut enim secundum
substantiæ molem: aut secundum qualitatum effectū.
Atq; hi quidem calidum uincere in omnibus plantis,
p̄nunciant

pnunciāt, ob incrementa earū & germinationes id iudi-
cātes. Quibus sanē, quū de tota natura scrutētur, rectē
hec & similia alia dicunt; Medicis autē nō rectē. Siqui-
dem nulla planta, q̄ planta sit, calida dici debet, sed q̄
hominem calfaciat. Sic enim & salamandram, & cicu-
tam, ad hominē frigida esse dicemus; qua ratione sunt
alia omnia etiam diiudicanda. Nam cicuta non modō
sturnos nō refrigerat, et enecat, uti nos, sed alit quoq̄,
ob idq̄ nimirū etiam et calfacit. Insunt quippē omni-
bus rebus amicitiae quaedam, & qualitatum pugnan-
tiae. Præterea quod familiare est, promptissimē assimi-
latur: quod uerō contrarium, ad internitionem ducit,
tum animalia, tum plantas. Cæterū familiaritates il-
læ, à totius substantiæ proprietate exoriuntur. Porro
quum acetum & rosaceum nos primariō & per se re-
frigerent, nemo ea calida dixerit.

CAP. VI.

Quod applicitum nobis uidetur actu esse calidū
eodem gradu quo nos, aut ex cōtactu similiter
calidum redditur, id ex media est temperie, nobiscum
collatum: ac per se etiam calidum secundum exuperan-
tiam, quemadmodum nos. At si quid nōdum adeō ca-
lidum est sicut nos, nec tale admodum redditur, id tem-
perie humana frigidius est, quantumcūq̄ in eo cali-
ditas exuperet: ac proindē admotum, nostrum calo-
rem minuet.

CAP. VII.

EA autem est cōmunis alterabilium corporum om-
nium natura, uti in se agant & patiantur admota:
quodq̄ minus est calidū, à magis calido calidius red-
datur: quod uerō magis calidum, à minus calido remit-
tatur. Nā id uel ex ipso tactu clarissimē discas. Etenim
eadem subindē illi tum calida, tum frigida esse uiden-
tur: calidiori quidem facto, frigida: frigidiori uerō cali-
da. Quæ sanē causa est, ut in balneis quidem frigida ui-

Tomus IIII.

Cccc

Salamādra est
frigida respe-
ctu hominis.
Cicuta sturnos
alit & calfacit
Cōsensus quos-
dam & discre-
pantias quali-
tatū inesse unī-
uersis rebus.
Familiaritates
unde exoriantur

Media tēperie
pōitū, quomō-
cognoscatur.

Alterabilium
omnium natu-
ra, quæ sit.

Urina cur apparet nobis frigida in balneo. Putealis aqua cur apparet rigentibus frigidam.

Tactu debere esse ab omni alia qualitate immuni, si sensibilia sit recte iudicaturus.

Medicamentorum facultates in quod modum examinentur a medicis.

Rosas rosarumque succum, euidenter refrigerare.

Oleum esse medium temperie. Rosaceum esse ex primo refrigerantium ordine

Rosarum succum tepidam quandam caliditatem pos-

deatur nobis urina, foris uero calida: quum tamen semper ipsa reddatur tepida. Similiter dum rigemus frigore, aquam ex puteo profundissimo haustam, calidam iudicamus: quæ eadem nobis in balneo, aut balneum egressis, apparet frigida. Itaque tactum calidi frigidiq; dignoscendi normam ponentes, atque eius dispositioni cuius iudicium omne tribuentes, merito sane crebro fallimur: ut qui quod haud ex se est frigidum, id frigidum esse dicamus: quod uero calidum ex se non est, id calidum pronunciemus. Absolutè autem et urina, et aqua putealis, qualis ad nos optimè temperatos, atque ab aliena qualitate immunes uidetur, talis profectò & est, & dici etiam potest.

C A P. VIII.

QUum igitur nec an absolutè unumquodque calidum sit, ut ignis: nec an per exuperantiam, ut sanguis: nec denique an cum symmetro sui generis aut speciei collatum, considerare nobis propositum sit: sed an ad hominem sit tale uel tale: nec rursus ad hunc, tanquam id quod ad aliquid aliud comparatur: sed an ad motum ipsi, eam partem quam tetigerit, reddat aut calidior, aut frigidior, aut humidior, aut siccior: rectè in experientia omnis iudicandi et dignoscendi consistet ratio: per quam nimirum docemur, & rosas exempli gratia, & rosarum succum euidenter refrigerare.

C A P. IX.

SIue enim in ijs qui inculcata sanitate fruuntur, siue in ijs qui laborant simplicissimo affectu, uidebitur tibi planè oleum quidem in media temperie existere: quod uero componit ex ipso rosaceum, ex primo esse ordine refrigerantium. Siquidem rosarum succus frigidioris naturæ est quam oleum: sed non ita multò, quum tepidam quandam in se caliditatem possideat. Eiusdem cum illo ordinis est, quod ad calorem quidem tepidum attinet, linospermon: ab eo tamen haud minimè tenui-

tate relinquitur. Nam rosarum succus est exquisitè tenuis essentia; pinde quàm celerrimè arefcit, odores quàm aliorum unguetorum exoluit. Est & chamæmelum tenuitate quidē, rosæ perfimile: calore uerò, ad olei uires magis accedens, homini tum familiares, tum temperatas. Quapropter lassitudini, ut si quid aliud, in primis confert: dolores quàm; sedat. Præterea tēsa remittit & laxat: mediocriter dura emollit, constipata quàm; rarefacit. Ad hæc febres quæ citra uisceris inflammationem infestant, concoctas discutit, ac dissoluit: & potissimum quæ ex cutis dēfite & humoribus biliosis proueniunt: ob id quàm; Soli à sapientissimis Ægyptiorum est cōsecratum. Est autem hypochondrijs gratissimum. Quibus etiam lini semen est gratum: minus tamen quàm chamæmelum, quum & minus calidum sit, & essentiæ crassæ. Cæterum ad ascensus, augmenta quàm; inflammationum, chamæmelo rosaceum præfertur: quum hæc tepida caliditate cum leui astrictione indigeāt. In principio siquidem, quæ refrigerant, atque astringunt: per incrementa uerò tepida, & mediocriter constringentia: at in uigore ac statu inflammationum, quæcunque tum moderatè calfacere, tum laxare possunt, magis cōpetūt: sicuti in declinationibus, quæ ualenter calfacere quàm; & discutere.

CAP. X.

Cæterum quæ mediæ tēperature sunt, & quæ utrāque in partem declinant leuiter, interim calfacere uidebuntur, rursus quàm; refrigerare: interim talia seruare corpora, qualia in principio acceperūt. Nec mirum sanè, quum aqua tepida, urina quàm; in balneis quidem frigidæ: argentibus uero, calidæ appareant. At rosaceum, oleo quidem, minus: succo autem rosarum, magis existens calidum, refrigerat sanè exustos, id quàm; suæ caliditatis tepore: argentes uerò, paulatim etiam excalfacit: qui effectus etiam caloris est tepidi.

CAP. XI.

Cccc ij

fidet, odoresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli facultates insignes.

Chamæmelum Soli ab Ægyptiis est consecratum. Linospermon.

Inflammationes qualia medicamenta desyderent.

Urina uidet in balneo frigida

Rosaceum refrigerat & calfacit diuersa corpora.

Reducenda ad
tēperie, nō me-
diocria, sed cō-
traria, & quæ
eque a medio
recedāt, p̄sidia
postulant.

Eucraton.

Tēperatū me-
dicamen quod
dici debeat.
Gradus viriū
medicamētorū
quomō inueni-
endi sunt.

QUocirca si aut refrigeratibus medicamentis, aut calfacientibus rosaceum indideris, sicuti nec magnoperè obfueris, ita nec admodū profueris. Nam caliditas tepida, nec est sufficiens quæ refrigerata sunt lædere, nec eadem curare potens. Siquidem quod curari debet, tanquam quod ab immoderatione ad symmetriam reducitur, non id quod probè tēperatum sit postulat, uerū id quod contrariam habet temperaturā, & æquè recedētem à media. Etenim si quod curari desiderat, multò frigidius sit, necessariò oportet quod ipsum curabit, multò etiam calidius existat: sin paulò frigidius, paulò etiam quod curabit calidius erit: ac de ceteris intēperaturis, pari iudicio. Porro si exquisita utamur nominum appellatione, quod medium in singulis est, id eucratum, siue temperatum dicemus: quod autē ab huius excedit modo, si ad calidius quidē, tum plus, tum minus calidum: sin ad frigidius, plus minusq; frigidum: nec de alijs alia ratione. Quandoquidem igitur corpora humana, tum ijs quas ab ortu nacta sunt temperaturis, tum ijs quas ab ætate postea acquirunt, tum ijs quæ ex uitæ consuetudine adueniunt, plurimū inter se differunt, ab ijsdem eā medicamentis uariè alterentur necesse est.

C A P. XII.

Medium ergo horum mihi quempiam intelligas, qui & natura sit temperatus, & moribus & consuetudine conuenienti, hanc ipsam eucrasiam tueatur. Deinde hos tres optimæ temperaturæ scopos concipiens animo, secundum corpus illius, ueluti secundum regulam quandam, uires omnium medicamentorum explores. Quodq; similem illius temperiei caliditatem accedit, temperatum uocetur, etiā si uel maximè excalfacere senem refrigeratum uideatur. Quod uerò calfacit aut refrigerat corpus eiusmodi, illud quidem calidum, hoc uerò uocetur frigidum. Esto autem ipsorum

excessuū ordo, ad frigidum quidem, primus, cuius esse dicas rosaceum: secundus, cuius sit ipsa rosa: post hūc tertius & quartus, quo ad sermone ad frigidissima pertigerimus: nempe cicutam, succum papaueris, mādragoram, hyoscyamū. Rursum ad calidum, anethum quidem, & fœnum græcum, prima: secūda uerò deinceps, tertiaq; & quarta, donec ad exurentia peruentū sit. Ad eundem modū in medicamētis humectantibus & exiccantibus est ineundum iudicium.

C A P. XIII.

Verū omnia propemodum medicamenta, licet sensu simplicia appareant, natura tamen composita sunt, diuersissimasq; in se facultates possidēt, excernendi, sistendi, incrassandi, extenuandi, atq; alias id genus uniuersas oppositiones. Nec mirum id esse debet, quum uni eidemq; medicamento, uim calfaciēdi & refrigerandi esse appareat: aut exiccandi, humectandiq;. Quæ primæ efficacissimæ uirtutes nisi hoc pacto complicarentur, haud sanè quæ ex illis sequuntur, similiter complicatæ forent. At si nos ipsi rhu succum melli miscamus, quod ex ambobus conficitur, astringendi simul & abstergerendi uim possidet: sicuti & cohibendi uentris, atq; laxandi. In lacte autem duas esse facultates, nempe sistendi uentrem atq; euacuandi, non item concedimus: tametsi caseus quidem secretus, uentrem sistat: serum autem resoluat.

C A P. XIII.

Quod uerò et brassica duas easq; cōtrarias in se se facultates obtineat, neq; id quidē promptē concedimus. Nam tametsi succum eius planè aut solū, aut ex melle purgare cernamus, attamen quoniā quod reliquum est, edere minimè possumus, astrictoriū esse id diffidimus. Quāq; si bis ter uel quater elixam, ipsam brassicam edamus, cōperiemus sanè, succum eius qui in aqua fuit relictus, purgare: ipsam uerò uentrem

Cccc in

Rosam esse frigidam in secundo excessu.

Medicamenta propemodū oīa esse cōposita, cōtrariasq; in se facultates fortiri.

Caseus sistit uentrem. Serum aluum laxat.

Brassicæ blastem elixam succū, uentrem soluere, ipsam autē suppressere.

Gallorum veterū
ius ventrē sub
ducit, caro au-
tem cohibet.

Aloe lota aut
nihil aut parū
purgat.

astringere. Eadē est ratio in beta, lente, atq; in ijs quæ testa pro cute integuntur: ac breuiter in omnibus ferme illis, quibus sapor aut acris, aut falsus, aut nitrosus inest. Gallorum etiam ueterum ius, uētre subducit, tametsi caro eundem sistere possit. In æris autem squama, sicuti duplex qualitas, ita gemina quoq; facultas inest: nam & astringit & mordicat: cæterū si intra corpus sumatur, purgat quidem uētre, uerū non cohibet. Quippè uincitur eius astringendi facultas, ab acri purgatoriaq; potentia, quemadmodum si rhu succum scāmōniæ cōmisceas. Sic enim cum mali cydonij carne, aut cum alio quopiam eorum quæ & astringentia et grata uentriculo sint, non pauca purgantium medicamentorum dum mista exhibentur, gustum quidem fallunt: at effectu solo quid ualeāt cōmonstrant. Persæpe siquidem lingua à materiæ uicta est copia: at actio, pro facultatis robore, uiribusq; perficitur. Itaq; quum substantia exigua quidem, sed ualidis prædita uiribus, mista alteri substantiæ plurimæ, eidemq; imbecillæ, corpus ingreditur, gustum quidem fallit: attramen effectū, q̄ illa, efficaciorē exhibet. Porro si ab aloe quod purgat, ab eo quod est astringēs, eluatur (id quod fieri potest, per exactam lotionem) tunc certē aut debiliter, aut planē nihil purgabit: id quod usu etiā uenit æris squammæ, æriq; usto. Iam uerò ipsius quoq; qualitatis medicaminosus sapor, primo statim gustu, facultatis mitionem demonstrat. Nam si unica semper qualitas, unicuiq; gustu astringentium medicamento inesset, haud sanē inter ipsa alia esui apta, alia medicaminosa existerent: sed tantū intensiōe aut remissionē astrictiōis differrent. At non ita res habet: quū uideamus æris squāmam malo cydonio astringētem minus, gustu tamē eo longē insuauiore existere: quā gustus absurditatem proficisci: à uehementia astrictiōnis, dicere id quidē non possumus. Si itaq; ut astrictio,

Ita etiam astringens unum perpetuo esset, sane unum quoque perenniter eius esset opus. Verum quum praeter astrictionem insuper alias qualitates, neque paucas, sortitur, semper quidem omnibus illis agere: sed euidentius alias per aliam, nempe uincens: idque ut ad corporis cui admotum est affectionem. Astringens igitur hac ratione, non est ei quod purgat contrarium: quamquam si quis illa esse contraria statuatur, nihil inde absurdum sequetur. Etenim in rosae succo, aliud quidem grauissimum est, amurcae & faeci proportionale; aliud leuissimum, & ipsum proportionem respondens flori in quoque succo supernatanti; aliud tertium, quale est quod in musto feruet: ad haec quartum, ipsum uidelicet purissimum, ac syncerissimum, cuius haec tria excrementa existunt. Euenit autem alios quidem succos aut acescere, aut corruptos putrescere: sola uero, oleum, mel, & uinum, in longum tempus durare. Quare nec per ebullitionem, nec per secretionem in alijs succis, has excrementorum differentias inuenire perspicuum licet: uerum protinus ab initio coctione quadam illis est opus, aut saltem alii cuius perdurantis succi mistura. Nam sic rosae succum melli miscetes, aut totas rosas ei immergentes, reponimus. Quum autem rosa non astringens modo, sed etiam dulcis atque amara gustanti appareat, satis aperte ostendit, se habere illorum succorum quatuor miscellam. Quin etiam uel ex hoc tantum, quod non extreme astringat, aliorum quoque saporum misturam intelligere in ea possemus. Quippe si solus sapor austerus illi insit, summus itidem fuerit: quo modo si sola corpori cuius caliditas summa inesset, id ignis utique foret: at si non summus, sequitur quod neque etiam solus. In uniuersum enim contrariorum mistura, summitates ipsas frangunt.

CAP. XV.

A Tque in similaribus quidem corporibus calor, frigiditas, siccitas, & humiditas, particulares differ-

Cccc iiij

Astringens non esse contrarium purganti.

Rosae partes quatuor ternae.

Succos alios acescere, aut co putrescere, sola autem oleum, mel et uinum in longum tempus durare.

Rosarum succum afferendi ratio.

Rosae succum seruandi ratio.

Summitates frangunt contrariorum mistura.

Similarium inter se ac dissimilium differentiarum unde nascantur.

Lingua secundum diuersas partes a diuersis saporibus qualitatibus afficitur.

Lipyrice feb.
Hepialis feb.

Saporibus qualitates afficiunt reliquas etiam partes, ut lingua, licet non perinde ab iis percipiuntur.

Lingua cum sensum habet exquisitum.

rentias efficiunt: in dissimilaribus uero acrimoniis, siccitates, austeritates, acerbitates, dulcedines, amaritudines, falsedines, aquositates, & pinguitudines. Quare unumquodque corporum similiarium, hoc est, quæ non ex diuersis substantiis constant, in ipsis partibus non multas, sed unam ex his qualitatem obtinet: quod uero totum est dissimulare, complures. Quarum hæ quidem astringunt: hæ laxant: alia aliam facultatem ostendunt, sic ut omnes quidem lingua partibus diuersis, per contactus ratione, afficiant: affectio tamen ipsa, ex eo quod primo affectum est, in totam eam quam celerrime diffundatur. Cuius simile in tranquillis aquis uidere licet. Nam si in duas eius partes duos conieceris lapides uno eodemque tempore, non sanè duos efficient circulos, qui mutuò per sese ferent, contrariosque; cernes in quauis ipsius aquæ particula motus. Quod si unum pedem in calidam, alterum uero in frigidam simul demittas, haud dissimile habebis etiam exemplum. Quippe in totum corpus utriusque affectionis motus peruadit, contrariosque; inuicem sibi occurrunt: id quod etiam euenire autumno in lipyriis, & hepialis febribus, nisi quod in illis non extrinsecus, sed ex ipso corpore caliditatis frigiditatisque affectus oritur. Si uero parem absynthii portionem melli exquisitè commistam, lingue imponas, simul dulce & amarum, quod ex ambobus mistum fuerit, uidebitur: quum non alio tempore mellis saporē lingua ipsa sentiat: alio autem absynthii, sed utrumque simul. Quemadmodum igitur ab alijs lingua afficitur, ita necesse est quaque aliarum corporis partium, ab eis similiter affici: etiam si qualitates ipsas non sentiat. Neque enim in patiēdo, aut non patiēdo, ab alijs linguam differre est putandum, uerum eò quod ipsam similiarium affectuum, ob exquisitam sentiendi facultatem, nihil latere possit. * Ad quod sanè non nihil ipsius conducit raritas: sic enim succi facilius penetrant. Porro si solano & anthemide alicui parti simul applicitis, neque

ita densa, dura, tensa, liuidaq; reddatur, ac si solo usus solano esses: neq; adeò rara, mollis, tepida & rubens, ac si anthemide sola usus fuisses: sed dictorū mediam accipere affectionē particula conspiciatur, consentaneum certè est, utrūq; medicamentum secundum suā facultatem esse operatum: ac p̄inde particulam ipsam eodem tempore contraria simul perpeſsam fuisse. Igitur quemadmodum mirum non est, * si à medicamentis compositis contrarij simul affectus corporibus infligantur, ita nec si à simplicibus: quum & ipsa sensui quidem simplicia appareant: natura autem composita sint. Siquidem quemadmodum nos in ijs quæ indies cōponimus, sic natura in simplicibus ipsis, contrarios temperare succos consuevit: quorū sanè actiones, si pari facultate & portione ipsi in mistura coeant, euadent similes: si dispari autem, diuersæ. At uerò, ut astrictio quidem una res est, ita astringens, duplex. Aliud quippe summum existit, ut alumen & galla: aliud autem, quod astrictionis sit particeps, ut pirum, uinum, et rosa: nam huius minimum est id quod astringit: quare medela existit inflammationum.

CAP. XVI.

Rosaceum uerò (utpote cuius natura olei rosęq; in medio est) in inflammationum augmētis, hoc est in illarum medio, optimum est præsidium. At oleum commodum est, ubi inflammationes maximè uigent. Etenim per initia repellere cōprimereq; influxus oportet: in uigore autem, ita per halitus digerere, ut morsus absit: at in incrementis, repellere simul ac digerere. Vtrūq; autem rosaceum præstare potest. Nam præter quod tenuium est partium, leuem quandā astrictionem sortitur, nimirum inter oleum & rosam existens medium. Quippè medium omne ex cōtrarijs mistum existit, ijsq; totis per tota contemperatis, aut p̄ exiguas particulas, sensum effugientes eorum quibus admouē

Simplicia medicamenta affectus contrarios gignere nō est mirū cū natura composita sint.

Astringēs duplex.

Rosaceum quē cōueniat inflammationibus. Inflammationū curatio.

Rosacei fortas.

Mediū olei contrariis sum existit

tur. Etenim quæ magnopere austera, acerbæq; sunt, primo statim contactu superficiem densantia, homorem ingredi prohibent. At quæ modicè astringunt, cæterum plurimum in se continent essentia tum tenuis, tum tepida, tantum abest, ut præ astrictione ingredi altius corpora admota prohibeant, ut etiam ab ea, magis scilicet impellente, iuventur. Quæ autem penitus tenuia calidæq; sunt, magis digerunt humores ex corporibus quibus admouentur, quam alios ipsa apponant. At quæ frigida sunt & essentia crassioris, omnino nullum introducere humorem queunt. Quæ itaq; humida, tenuia, et modicè astringentia sunt, ea inter omnia humectantia efficacissimè humectant.

Humectare q̄
possint omniū
efficacissime.

Calor innatus
ad quid condu-
cat.

Frigida & de-
leteria medica-
menta, cur ci-
tius, magisq; ī
calidis naturis
uim suā exerāt

Qualitates oēs
tradātenus in
limutuo agūt
q̄pis ab assi-
do stillicidio
luatur,
stadius cerā
secando hebe-
cit.

C A P. XVII.

AD hæc autem omnia, nō mediocriter confert innata nobis caliditas, & intrō ad sese attrahens, & comminuendo extenuans. Hinc est q̄ frigida deleteriaq; medicamēta, utputā cicuta, papauer, hyoscyami semen, mandragora, & alia id genus, citius magisq; in calidis naturis uim suam exerant. Nam quū sit impossibile ut talia interficiant, nisi prius cor refrigerent, necessum sanè est, ut intrō comminuta ingrediantur: id quod ex sua natura prestare nequeunt, crassa & inepta ad motum quum sint. Quare ascititiam caliditatem requirunt, quæ in minuta extenuet, ac ueluti manu ducat in subtiles meatus. Itaq; si quando ea absit, cunctant, in maioribus hærentia meatibus, in ipsisq; fluctuātia arterijs & uenis, temporis spatio aliquid perpetiuntur. Siquidem qualitates omnes quadantenus in sese agūt. Nā et lapis ab assiduo stillicidio excavaat, gladiusq; cerā secando hebescit. Quādiu igit solidæ partes (à quibus perficiuntur actiones) à refrigerantibus medicamentis nondum refrixerint, tandiu animans superfit, est necessarium: refrigerari autem nequeunt, prius quam illa subierint proprios harum meatus, id quod sua ex natu

ra non possunt. Deducit quippè succos, ut causa quidē primaria, arteriarum attractio: ut secundaria uerò & materialis, ipsorum tenuitas: qua destituta quum sint, frigidiora & crassiorum partiū medicamenta, ijs opus habent, quæ præbeant. Cæterum corpora frigidiora, tractum arteriarum imbecilliorē possident, medicamentorumq; substantias cōminuere nequeunt: proinde medicamenta ipsa cunctari est necesse, processuq; temporis tum immutari, tum concoqui: quod solet succus lactucæ. Qui si integer ad cor perueniret, nō secus ac cicuta perimeret. Hæc igitur & similia, nisi celeriter perimant, nullius tandem effectus redduntur. At quæ aut erosione aut putredine enecāt, ijs ut tempore uires acquirant, accidit: quū temporis spatio putrescant omnia, eoq; magis, quo fuerit humidior atq; calidior locus. Merito ergo fit, ut quæ frigore suo noxam inferūt, ijs actionis celeritas ad perniciē proficiat: quippè quæ alioqui spatio excafacta, uim per quam agebant, deperdant. At quibus in putredine actio consistit, ijs tempus actionē adauget, quoniam et putredinem. Nullum autem animal interire potest, nisi cor ab agendi munere cesset; at fieri ut cesset non potest, citra maximam intemperiem. Cicuta itaq; hominem ē medio tollit, tum ob meatuum amplitudinem, calorisq; multitudinem, tum ob ualidam arteriarum in attrahēdo uim, usq; ad cor ipsum perueniens. Sturnos uerò ob causas contrarias haud enecat, ut putā quum & retineatur, & cunctetur, ac sese temporis tractu concoqui, præparariq; à corde patiat; quemadmodum & in ipsis lactucis accidit, quæ moderate quidem sumptæ, alunt hominē: si uerò quispiam expressum earum succū largiter hauriat, non secus proculdubio morietur, q̄ qui aut cicutam, aut papauer sumpserint. Ad eundem quippè modum cicuta hominem quidem celeritate distributionis interficit: sturnos autē tarditate ipsa, nutrit. Sin autem

Succi a quibus deducantur per corpus.

Lactucæ succus, si integer ad cor perueniret, nō secus ac cicuta perimeret.

Deleteria quæ putrefaciendo enecāt, quomō ab iis differāt, quæ sua extinguunt frigiditate

Interire nullū animal posse, nisi cor a munere agendi cesset. Cicuta cur minime sturnos enecat.

Lactucæ succū liberaliter sumptum, esse letalem,

Vetula quædā
Atheniēsis ale
batur cicuta.
Cōsuetudo est
adscititia natu
ra.

exiguū quippiam sumatur, mortē hominī haudqua
quā inferet; id quod anus illa Atheniensis experimen
to docuit, q̄ ab exigua cicutę portione auspicata, nullo
detrimento ad permagnam progressa est copiā; adeo
consuetudo uidetur esse adscititia natura.

CAP. XVIII.

Necātia frigo
re, nō genere,
sed sola quāti
tate dicunt le
talia, cōtra q̄
ea q̄ putrefaci
endo aut ero
dēdo iterimūt.

Eorum ergo medicaminū quæ frigore interimunt,
nullum genere letale est, sed sola quātitate: quum
si exigua portione sumantur, mortem non inferant. At
in erodentibus, putrefaciētibz, & calfaciētibz, haud
ita res sese habet. Ad hæc, quemadmodum frigida me
dicamenta, nisi calorem offendant ualidum, qui cōmi
nuat atq; deducat ipsa, non perimunt, sic si quod com
minuit deducitq; multo ualentius fuerit, deuincet, pr
sus, mutabitq; , ac alimento ut sibi sit medicamen
tum, efficiet.

CAP. XIX.

Medicamenta
calida & frigi
da a nobis su
munt initium
actionis suę, ac
pinde potesta
te dicunt talia
Cicuta si cum
modico & mi
nime generoso
uino bibatur,
ocyus perimit
Vinum uetus,
generosumq̄,
& calidū, auxi
lia ur uenenis
refrigeratibus
Vinū refrige
ratis oibus uti
le, quale nā eē
debeat.

Quum igitur medicamenta refrigerantia quadā
tenus à nobis accipiāt suā refrigerādi uim, sicut
et calfaciēdi calida (neq; enim quicq̄ moliri possent,
absq; corporis patientis auxilio) iure potestate dicunt
frigida Nam ut actu nos refrigerent, nō prorsus ex sese
obtinēt. Ea propter meconium & cicuta, si cum mo
dico eoq; minime generoso uino bibantur, ocyus qui
dem interimunt. Si quis uerò papaueris succum, quā
tus interficere potest, hauserit, ac etiānum tamē super
sit, huic largē epotum uinum uetus generosumq; & ca
lidum auxiliabitur. Cæterū quod tenui pellucidaq;
substātia est, colore uermiculo aut flauo, odore gratū,
quodq; multam aquæ misturā postulat, id tum admo
dum excalfacere est natum, tum facili undiq; per cor
pus uniuersum deferri. Tale ergo natura uinum, ætate
uetus, multum, atq; impermistum, non modò perfri
geratorum omnium, sed eorum etiam qui aut ex oris
uentriculi, aut cordis dolore, animi deliquium patiun

tur, præsentanem remedium existit.

C A P. XX.

A Teorum medicamentorum quæ erosione atque putredine interimunt, pleraque sanè perinde ut illorum quæ potestate dicuntur calida, actu etiam calida existunt, sed iccirco nos fugiunt, quoniam aut ipsi plurimum habemus caloris, aut crassa est ipsorum substantia. In balneo quippè urina nobis uidetur frigida, quemadmodum argentibus, hyeme, aqua putealis, calida: cæteris autem frigida. In summa enim, pro suo unumquodque affectu, admota consuevit sentire corpora. Sic ergo si manum habens frigidam, eam in tritici aceruum immiseris, luculenter calorem percipies. Sin calidam, nequaquam. At si columbino stercorei accumulato, potissimum columbarum sylvestrium, manum inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misy, fori, chalcitis, ærugo, calx, aliaque id genus innumera, si illis aceruatis manum altius iniicias, protinus uidebuntur excalfacere. Cæterum si bolum ex eis unum acceperis, cuius extrema superficies ab ambiente fuerit refrigerata, meritò nulum percipies calorem. Quà ob rem fieri etiam potest, ut quæ respectu nostri sunt potestate calida medicamenta, ea secundum alterum animantium genus calida esse actu uideantur.

C A P. XXI.

Quæ igitur nos contactu per putredinē aut erosionem enecant, ea recta quidem ratione, deleteria humanæ naturæ toto genere existimantur: non ut refrigerantia, quâritate duntaxat. Hæc enim interdum uincuntur & nutrimentum animali redduntur: putrefacientia autem, uel si sumantur portione minima, omnino tamen corrumpunt, quòd uidelicet quæ putredini obnoxia sunt, calore humiditateque putrescant: calidus autem humidusque sit sanguis. Proinde longo etiam post

Quisq; p suo
affectu admo-
ta cōsuevit sen-
tire.

Deleteria hu-
manæ naturæ
quæ sint,

Putrefaciētia
uel si sumātur
portione mini-
ma, corrumpūt
animal.

tempore à quo sumpta sunt, nonnulla interimunt, potissimum quæ crassa terrenaq; essentia sunt prædita.

C A P. XXII.

Eroderentia.

Cantharidas cō
mode misceri
diureticis.

Alexipharma-
cis commode
misceri interdū
letalia.

Cantharices ue
sicā exulcerāt.

Interdum autem ipsa erodentia medicamēta adeò exigua sumuntur, ut excerni cum excrementis possint, prius q̃ iniuria corpus efficiant. Interdum etiam qui illa sumpserit, opportunis remedijs usus, asseritur. Nam ubi grauis ab ijs noxa illata est, malū ipsum sisti nullis præsidijs potest. Ceterum cantharides medicamentis diureticis commodè permiscentur, sicuti alexipharmacis alia pleraq; letalia. Feruntur enim alioqui sponte sua per urinam ad uesicā cantharides, ac sic rodendo illam exulcerant, nisi ubi copia modica induntur. Ex quibus patet, quæcunq; frigiditate interimunt, si exigua sumantur, nutrire corpus posse: at quæ putrefaciendo, nequaquam: quum naturæ humanæ aduersentur.

C A P. XXIII.

Medicamētis
multas diuersi
generis imistas
esse substantias.

Purgantiū me-
dicamētorum
discrimina.

Purgantia, ubi
a natura uincu-
tur, talē gignūt
humorem, qua-
lē ducitura erāt

V Tigitur in alimentis mistos esse uarios sapes diximus, sic in medicamentis intelligere oportet, multas diuersi generis mistas esse substantias: id quod inuenias facile, si consyderes granum cnidium solum hoc à cnico differre, q̃ plurimum habeat caliditatis. Porro attractio quæ in ipsis cernitur, à qualitātū proprietatibus, quæ sunt in substantijs, perficitur. Iccirco purgantium medicamentorum ubi fortè purgatione frustrantur, quædam præter quàm q̃ noxam corpori nullam inferunt, etiam alimentum corpori præbent: alia uerò in corruptionem ac uenenum uertuntur. Omnino siquidem medicamentum purgans, uel cum uno saltem humorum, qui in nostro corpore sunt, similitudinem habet: non autem perpetuò mista est uis uirofa. Quamobrem nec perpetuò, licet non purget, iniuria afficiet, uerū & concoctionem admittere, talemq; producet humorem, qualem erat natum educere.

Pleræque itaque attractiones fiunt qualitatis familiaritate: ac proinde singulæ animalis particulæ familiare sibi alimentum attrahunt: ad quam sententiam sequitur medicamenta purgantia familiaria esse purgandis humoribus: quodammodo efficaciora, ualētioraque; sicuti magnes ferro: quippe qui ad ferri naturam accedat, reperiaturque; in ferri fodinis, ei que specie magnopere sit per similis: uerum fortior est quodammodo, ut attrahere sit aptior, quam trahi. Cnicus etiam (quæ carthamum uocant) colore quidem pituitæ similis, calore illā superat, sic ut trahere quæ trahi sit prōptior. Ad eundem modum granum cnidium, si quando à corpore nostro uincatur, uice purgationis alimentum efficitur: ueluti ueratrum semper coturnicibus. Verū enim uerō quoniam attractiones, substantiarum similitudine fiunt, necessum est, ut si quod purgatur pituita est, id quod trahit sit non pituita, sed pituitosum. Differt siquidem similitudo ab identitate.

CAP. XXV.

Ad hæc purgantium medicamentorum quædam iam a cū possident idoneam ad attrahendum similitudinem: quædam ab animantis illam corpore accipiunt. Præterea in unoquoque medicamento, permixti similibus sunt alij succi dissimiles, qui partim quidem medicamentosi sunt: partim minimè. Quare ubi purgationem haud assequuntur, quædam in perniciem: quædam in alimentum uertuntur.

CAP. XXVI.

Cæterum ubi purgās pharmacum usque adeo inualuit, ut in uasorum ad uentrem pertinentium osculis mordicationem apertionemque; multam relinquat, assidueque; irritans, conuellensque; corpora, uasorum facultates dissoluat, uacuationes immoderatæ contingunt: ita ut si quod pituitam educit medicamentum

Purgantia medicamenta esse familiaria a purgandis humoribus.

Magnes ferro est specie similis, eo tamē fortior.

Cnicus est pituitæ similis.

Veratrum alit coturnices.

Attractiones fieri substantiarum similitudine. Similitudo differt ab identitate.

Purgantiū medicamentorum differentia

Vacuationes immoderatæ quæ & quomodo accidunt.

Sanguinē va-
cuari omnium
ultimū, ceu na-
turę familiaris-
simum.

exhibitum fuerit, prima quidem omnium ipsa euacue-
tur: dein flaua bilis: mox atra: quarto deniq; loco san-
guis. At si quod flauam bilem detrahat, pituita conse-
quetur, post quam atra bilis: quartus demum reddetur
sanguis. Sin atram bilem purgare sit natum, eam qui-
dem primam elictet: post quam, flauam: dein pituitam,
ac omnium ultimō sanguinem, tanquam ex inanimis
uasis effluentem: ut quæ summa iam imbecillitas occu-
pet, quæq; ad extremam osculorum apertionem perue-
nerint. Ex quibus manifestum est postremum in imo-
dicis purgationibus uacuari humorem qui familia-
rissimus est: aliorum autem singulos, prout crassi exi-
stunt, aut tenues.

C A P. XXVII.

Vasorę referra-
tio, imbecillasq;
vnde accidat.

QUum igitur uascula non amplius in se contine-
re succos possint, & oscula eorum reclusa fue-
rint, neq; irritare medicamētum desinat, nec possit am-
plius familiarem succum attrahere, necessum est reli-
quos quoq; , quo diximus ordine, sequi. Fit autem
orificiorū apertio, ob medicamenti uiolentiā, ob
quam uidelicet mordicatio etiam puenit.

Vasorum autem imbecillitas, tum ob
ingentem defatigationē, tum ob
intemperatiā, quæ imo-
dicas purgationes
præcedit.

Galenī

49

GALENI PERGA

MENI DE SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber IIII.



CONSTAT igitur uniuersas corporis partes perpeti afficiq; ab alternantibus qualitatibus, quemadmodum lingua afficitur: sed passionum sensum non exactè percipere: at linguā ob pfectionē quā habet sensus, posse naturas earū omnium dignoscere: tamen si passionum similitudinem inuenire sit etiam in alijs partibus uniuersis, ac precipuè in exulceratis: Quandoquidem cutis duritas densitasq; prohibet, quo minus foris incidentiū facultates intrò in carnem penetrēt.

CAP. I.

Sic enim & illud ab Hippocrate dictum est: Viceribus frigidum mordax: tamen si cuti prius q̃ exulceraretur, mordax nequaquam esset. Porro quæcunq; frigus contingit, eorum & contrahat, & condenset, & constringat substantiam, primumq; tenues tum excrementa humiditates, sicuti ex oculis lachryma, ex naribus mucus, necesse est: postea uerò etiam mordax appareat, licet alia ratione, q̃ in calido. Nec enim erodendo quod continuum est, sed diuellendo, mollemq; substantiam in arcu contrahendo, ac breuiter ipsius partis continuitatem per diuulsionem soluendo, molestū, ac mordax est frigidū. Caterū ut in his protinus contractionis condensationisq;: sic in illis quæ calore suo mordicant, dissolutionis & fusionis sensus percipitur. Ad hæc in refrigerantibus quidem, utcūq; tardior est atq; cunctantior mordacitas: in excalfacientibus ue-

Viceribus frigidū mordax.

Frigidum quæ ratione sit mordax.

Tomus IIII.

D d d d

Mordicantium
alia sunt facul-
tate calida, alia
frigida.

Cōdensare ma-
teriam frigidi
semper est pro-
prium.

Liquare est p-
prium calidi.

Aer accēsus fit
flamma.

Terra accensa
fit pruna.

Ignis gñā sunt
Flāma & pru-
na.

Aqua esse sic-
ca nō potest.

rō q̄ celerrimē penetrat. Quam ob rem medicamīnū mordicantium, alia sanē calida facultate, alia necessariō sunt frigida. At quæ moderatē calida sunt, quæq; temperata potius q̄ calida dici deberent, ut poculum atq; balneum, dum mediam temperiem sortiuntur, nobis grata & amica existunt. Funditur enim p̄ ea, quod in corporibus nostris constiterat atq; concretum fuerat, unde animantibus uoluptas maxima oritur. At si quis in eis immoretur diutius, sensim quidem et ipsa molesta euadunt, idq; non q̄ mordicatione infestent, sed, quod! substantiam nostram, soluentia digerentiaq; deliquium animi, ac tandem mortem inducant. Quæ autem his calidiora sunt, secāt, distrahuntq; substantiam: quare necessariō mordacia uidentur, ut tum aqua feruens, tum ignis. Igitur subiectam materiā contrahere, condensareq; frigidi semper est proprium; fundere autem atq; liquare, calidi: utriusq; uerō immoderatus aucti, communis est mordicatio. Verūm quæ iā summa frigiditate, aut caliditate absunt, minimē cutē mordicant. Plurimum autem ad id genus affectiones facit essentia medicamētorum uel tenuitas, uel crassitudo. Siquidē frigida quæ tenuium partium sunt, quū magis in profundum transeant, uehementius mordicant. Calida uerō quæ crassarum sunt partium, quoniam plus ulcerant, uehementius iccirco affligunt. Tenuiorum itaq; partium aer est: crassiorum terra: medium eorum tenet aqua. Sed aer accensus fit flamma: terra autem pruna: at aqua, uehementem sanē caliditatem recipit, sed nec flamma nec pruna, propter innatā humiditatem, efficitur. Siquidem flamma & pruna, ignis sunt genera: ignis autē omnis, calidus est & siccus: at aqua sicca ut sit, fieri nequit. Nullum autem est adeō calidum pharmacum, ut flamma, aut pruna, aut aqua ferueat. Procedit tamen usq; ad ustionē ipsa medicamentorum caliditas, ubi in crassa consistit essen-

SIM. MED. FAC. LIB. IIII.

ti. Quæ uerò subtilium partium sunt calida, nonnunquam omnino non mordicant, sed calfaciunt dūtaxat. Est ubi mordicent, non tamen urant.

C A P. II.

Porro quæ celeriter in tenuia soluantur, tenuiū dicuntur partium: quæ id perpeti nequeunt, crassarum. Quod ergo ea soluantur, calor animalis, cui applicantur, est causa: quod in tennes crassas ue partes cōminuantur, id à propria natura obtinent. Quocirca refrigerantium medicaminum ea quæ crassarū sunt partium, mordicare nequeunt, q̄ extimam cutis superficiē penetrare non ualeant. At quæ tenuium sunt partium, maximeq; si inæqualem temperiem sortiantur, ualenter mordicant. Sed supra demonstratum est inæquabilia esse propemodum omnia: ubi ostenderemus & in uino, et in oleo, quatuor reperiri succos diuersos, i summaq; uniuersa medicamēta facultatibus contrarijs cōstare. Enim uerò acetum, tamen si ingenitam uini caliditatem amiserit, ex putredine tamen sibi aliā adeptū est. Quippè uinosę uini partes, dum ipsum in acetū trāsit, refrigerantur: at aqueum recrementum putrescens, ascititiā caliditatem acquirit, ueluti quæ putrescunt omnia: sitq; acetum quiddam ex cōtrarijs facultatibus mistum, partim refrigerantibus, partim calidis, sicuti uistorum lignorū omnes cineres, qui ex adustione nō nullas partes igneas conseruāt, quas macerati postea solent in aquam deponere. Hanc enim aquam marine & muriæ per omnia correspondentem, uulgo Lixiuū appellant. In uniuersum autem, quod tantum est acidum, quicquid id fuerit, planè frigidum est, eoq; uti cōtra omnes calidos affectus commodissimè poteris: ut omphaci succo. Qui quidem quū omnino acidus sit, perfectè etiam refrigerat, uniceq; ardoribus prodest, inimicus affectionibus frigidis, quemadmodum omnia exquisitè refrigerantia. Ea autem quæ quum acida

Tenuiū et crassarū partium, q̄ esse dicantur

Mordicari quæ ualeant.

Medicamenta oīa facultatibus cōstant cōtrarijs.

Acetum ex cōtrarijs facultatibus cōstat.

Lixiuū.

Acida oīa sunt frigida, quare nus acida sunt Omphacii facultas

Dddd ij

Acida frigidi-
tas, tenuiū est
partium.

Astringens fri-
giditas crassa
tenuiū est partiū.

Emplastice
dicamēta quæ
dicantur.

Sensus quo pa-
cio exercet de-
beamus.

Emplastice
dicamēta quæ
dicantur.

Emplastice
natura duplex

Olei partes.

sint, habent etiam saporem quēdam acrem permistū, qualis planē inest aceto, haud dubiē nonnihil calidita-
tis possident. Verū si frigiditati astrictio coniuncta
sit, aliud est frigiditatis genus. Quippē acida frigiditas
tenuiū est partium: at astringens, crassarum.

C A P. III.

Non igitur sola ratione p̄ methodos logicas nos
exerceri oportet, sed exercere etiā sensum in sa-
poribus singulis: quod fiet, si omnia ea sedulo expe-
riamur lingua, quæ unamquāq; qualitatem præ se fe-
runt manifestissimam. Vt si acrimoniam cogitatione
cōplecti uelis, in allio, cæpis, atq; his, simililibus, ea se-
pē gustando, te exerceas oportet. Sin astrictionem, in
galla, rho, & similibus. Si amaritudinem, tum in nitro,
tum felle. Si qualitatem saporis expertem, in aqua im-
muni ab omni qualitate ascititia. Nam hinc exorsus,
promptius ad aliorum obscurorum omnium saporū
cognitionem peruenies.

C A P. IIII.

Sin autem qualem præbet sensum aqua planē om-
nis qualitatis uacua, talem in re aliqua sicca inue-
nia, ea nimirum mediam cōstitutionem sortietur: aut
certē ad frigidius paululum inclinabit. Quod si talis,
quum sit in caloris & frigoris differentia, in super con-
sistentiam nata sit siccam, terrestris sit, ac citra mora-
sum desiccet, est necesse. Atq; huius generis medicamē-
ta omnia medici appellant emplastica.

C A P. V.

Dvplex autem est emplasticorum natura: altera
exactē terrea & sicca: altera uiscosa quidem om-
nino, sed ex aqua & terra, & plerūq; etiam aere, com-
mista, sicuti oleum dulce. Hoc siquidem ex aerea, ter-
rea, aqueaq; essentia conflāt. At oui albumen, ex iisdē
quodāmodo, sed magis terreū est oleo. Quin & quod
lactis est caseosum, emplasticum quoq; est: & suillus,

SIM. MED. FAC. LIB. IIII. 53

adeps. Nam tauri & hirci pinguedo, acrimoniam & multam, & igneam possidet: bouis item, ouisq; adeps acris existit. Porro anseris & gallinacei calidior est pinguitudo, & siccior q̃ suum: necnon subtiliorum partium, & minimū terrestres, sicuti & auium omnium. Quæcunq; ergo pinguedines nondum ullā nactę sunt acrimoniam, emplasticam & illinendi poros possidēt facultatem: eamq; tantō efficaciorē, quātō sicciores, magisq; terrenę fuerint. Huiusmodi enim est cera elota, quæ ex melle tum aquosiore, tum minimē mordaci conficitur.

Adipis differentie.

Cera elota est emplastica.

C A P. VI.

A Stringentia porro terrena sunt & crassa corporis consistentia: qualitate uerō frigida. Acida autem, tenuitate pollent corporis, sed perinde ut astringentia refrigerāt. Etenim arborum fructus, quotq; nobis, ubi maturauerunt, dulces apparent, nuper enati, acerbi sicq; sunt consistentia: progressu uerō tēporis, humidiores redduntur, acquiruntq; ad acerbitatem, aciditatem quādam: quam exuentes sensim, postea dum perficiuntur ac maturescunt, dulces euadunt. Sunt qui non in arboribus, sed postea q̃ repositi aliquandiu fuerint, dulcedinem indipiscantur. Alij non interueniente aciditate, paulatim in dulcedinem transeunt. Omnes tamen coquuntur & maturescunt calido: quod quidem duplex existit: alterum nempe & proprium, & cuiq; ingenitum: alterum externum, à sole uidelicet, sed nature ipsorum conueniens & familiare. Si igitur quī initio acerbi essent, tempore maturescentes dulcescunt, sequitur ex calore ipsis prouenire dulcedinem: acerbitatem uerō, aciditatemq; ex frigore. Ad hæc etiam, initio quidem lignosi quum sint, necnon sicci & acerbi, postea uerō humore adueniente reddantur acidi, palām est, saporem acerbum acido magis terrenum existere. Quin etiam, si ab acerbo sapore manifestē linguam cō-

Astringentium natura.

Acidorum natura.

Fructuum sapor.

Fructuum differentie.

Fructus oēs coquantur, et maturescunt calido. Calidū duplex

Acerbus sapor acido magis terrenus existit

Dddd ij

*Acerbus sapor
est frigidus.*

*Acerbi & aci-
di saporis di-
ferentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*Quid sit acerbum
saporis.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

*De acido saporis
differentia.*

trahi, siccari, asperariq; contingit (quæ unius frigidita-
tis sunt opera) liquet planè frigidum esse saporem acer-
bum. Quoniam uerò inæquabiliter etiam desiccatur (id
enim est quod exasperat) fuerit utiq; omnino etiam ter-
renus: nam aqueus, omnia æquabiliter penetrat. Præ-
terea, uelox quidem acidorum saporū transitus in par-
tibus sit sentientibus: acerborum autem tardus: tum
acida quidem in alto magis agere apparent: in superfi-
cie autem acerba. Quæ omnia, crassarum esse partium
acerba indicant: acida uerò tenuium. Ceterum utraq;
dicuntur astringere, tum quæ acerba sunt, tum quæ au-
stera: sed in maioris minorisq; ratione differunt. In-
sunt autem ipsis medicamentis qualitates complures,
non diuersæ modò, sed pugnantes etiam, atq; interim
subcontrariæ. Quare ubi astringentium, exempli gra-
tia, diligenter explorare actionem contendis, ea tantū
disquiras, quæ gustui exquisitè acerba uidentur, nul-
lamq; saltem manifestam habent qualitatem admistā.
Quæ quidē ubi nactus fueris, tū in optima sanorū cor-
porū constitutiōe, tū in affectibus simplicissimis, de illis
facies periculum. Nam si corpus sanum manifestè cer-
natur refrigerare, & calidis proferat affectibus, intrepidè
sanè poteris, de astrictione ipsa, q; refrigeret, pronuncia-
re. Sin contra appareat, taleq; medicamen acerbum in
illis conspicuam caliditatem inducat, calidum natura
putandū est, in cæterisq; saporibus pari iudicio expe-
riundum. Ego uerò, etsi facultates medicamentorum,
uel citra saponem, sola experientia noscunt, usus tamen
predicta methodo, omne exquisitè astringens, frigidū
perpetuò comperi: nonnullaq; modicè dulcia, aut ama-
ra, aut acria, simul cum astrictione sum expertus etiā
apertè refrigerantia. Item quæ astringunt pariter atq;
acida sunt, ea quoq; manifestè refrigerare experientia
didici. Sola uerò dulcia omnia pro dulcedinis modo,
protinus etiam calorē cōtinent. Quocirca eorum quæ

SIM. MED. FAC. LIB. IIII. 55

admodum dulcia sunt, nullū omnino est frigidum. At amara omnia, calidam possident facultatem.

CAP. VII

Alterus igitur sapor, exolutus acerbus est. Quū autem corpus acerbum, terreum sit atq; frigidū, tripliciter necessariō exoluitur: nempē aut incallescēs, aut humescens, aut utrunq; simul perpetiens. Si ergo incalescat dūtaxat, solidā dulcedinem contrahet, qualis castaneis inest. Sin tātū humescat, si quidē ea crassum sit partium, et aquea humiditas, austerum euadet: sin uerō aëria, acescet. Si pariter humescat et calfiat, humiditate quidem aquea, in dulcedinem: aërea uerō trāsibit in pinguitudinem. Ac sanē secundum propositarum qualitatū misturas, uarias fructus mutationes sortiuntur. Cæterū acerbus ad extremū perseuerat fructus ilicis, arbuti, fagi, & corni. Acribus simul & dulcis, myrti fructus est, piri agrestis, & roboris. Austerus una & dulcis palmarum fructus. Pinguis exactē, tum fructus, tum succus oleæ.

CAP. VIII.

Quicūq; ergo fructus oleosi dūtaxat sunt, edēdo nō sunt, & dulces. Quibus uerō alterascentibus amaror aduenit, nō edi nō possunt. Quippē amarū omne edi nequit, taleq; efficitur à caloris excessu. Verū dulce omne calidū est, nec immodicē calorem nostrū exuperat, sed inter limites se continet fundentis, leuigātis, mollientis. Quum autem qdam sint quę una: quędam quę duabus in sese qualitatibus & agunt & patiuntur: quędam uerō etiā totis substantijs suis: in horum certē numero medicamēta non pauca ponuntur: sicuti & nutrimenta uniuersa: quorum duplex est genus. Siquidem quędā sunt pingua, ut ipsa pinguedo: quędam dulcia, magis minus ue: ut omnia illa quibus nutrimur.

CAP. IX.

Dddd iij

Dulcium esse
nullū frigidū.
Amara omnia
calida.
Acerbum cor-
pus exolui tri-
pliciter.
Acerbitatis in
alias qualita-
tes mutatio.

Saporum diffe-
rentiæ in varijs
fructibus.

Fructuū qui nā
sunt uesci, & q
minime.
Amara edi ne-
queunt.
Dulcis saporis
natura.

Nutrimētorū
duplex genus.

Nutrimētū oē
esse dulce.

Nutrio quid.

Nutrimēta eē
mediocriter
calida.

Iucundum esse
duplex gener.

Dulcedo a mo-
derato calore
prouenit.

Est tamen & pingue ipsum, & quicquid nutrit, dulce. Nam quum nutritio euacuati repletio sit: quod euacuatum autem est, familiare & benignum esset: certè etiam id quod nutrit, familiare, iucundū, & amicum sit est necesse: ac proinde calidum modicè, re spectu illius quod nutrit. Sed in hoc non parua est maioris minorisq; ratio: quandoquidem nec ad cibos accedimus exactè secundum naturam affecti. Corpus siquidem eorum qui cibos appetunt, sit dūtaxat inanitū oportet, si absoluti futuri sint familiaris ipsorum qualitatis cognitores. Nam si præter id calidiores q̃ conueniat, aut frigidiores euaserint, non solūm quæ nutriāt, uerū etiam quæ refrigerent aut calfaciant, postulabūt. Quocirca cibi quoq; illis aliās aliq̃ iucundiores uidentur. Nam quum duplex sit genere iucundum: alterum quod impleat id quod uacuatum est, cuiusmodi est nutrimentum: alterum quod medeatur ei quod alteratū est, id quod medicamentum existit: euenit utiq; cibus, ubi non modò uacuatis exhibētur corporibus, sed etiā qualitate aliqua mutatis, ut duobus nominibus delectent: ut cibi scilicet, et ut medicamenta. Quamobrem nec eduliorum nec medicamentorum una est animantibus oībus species: siquidē p̃ sua unaquæq; familiari substantia simul et affectione, tū delectant, tū iuuant ab utrisq; Sed si hæc sic habent, id qd in cibus minus erit dulce, mirus quoq; erit calidum: quod dulcius, tantò nimirum erit calidius, quantò uidelicet dulcius: sin ad immodicum recidat calorem, nec eiusmodi dulce erit, sed iam apparebit amarum.

C A P. X.

Etenim ut à moderato calore bifariam cuiq; corpori dulcedo prouenit: partim enim sunt proprio & insito calore dulcia, partim uerò ascititia: ad eundem modum amara. Alia nāq; sunt, quæ suapte natura exalfaciunt: alijs autē id accidit ab acquisitio ca-

lore accensis. Porro dulcia omnia proxime accedunt ad naturam eorum quibus apparent dulcia; idque aut proprio calore, ut mel; aut acquisitio, ut sunt omnia quae ab igne preparantur. At mustum non suo modo, sed etiam acquisitio calore dulce esse uidetur. Siquidem haud parum ueluti ardoris ex solari calore tum acinis, tum alijs inest fructibus: à quo id quod illis aqueum ac ueluti semicoctum inest, ad concoctionem ducitur. Nam ex quibuscunque pomis, si succum exprimas, eum protinus non secus atque mustum feruescere deprehendes: tanto tamen feruoris discrimine, quanta erit unius fructus ab alio in calore diuersitas. Cæterum ubi quod semicoctum erat, transmutatum iam fuerit, euanueritque; is qui excitabat feruorem calor, iam tum denique syncera succorum proprietates cernuntur, propriaque uinorum natura agnoscitur. Iam uero, quæ inueterantur uina, omnia calidiora redduntur: ac primum quidem quandam dulcedinem acrimoniamque; asciscunt: quæ uero prius inerat illis astrictio, austeritasque, tempore ipsam deponunt. Dein rursus acrimonia incrementum, dulcedinem indies abijciunt, paulatimque amarescunt. Vnde constat dulce esse calidius austero, sicuti & dulci amarum. Atqui si uerum est dulcedinem puenire à moderatione caloris, pater astrictio à frigido uincente perfici.

CAP. XI.

VT igitur uinum acerbum, tempore dulcius primum: mox acrius amariusque; ultimo uero planè amarum naturaliter redditur: ad eundem modum quod ueluti rigorem præter naturam perpeßsum est, protinus acidius efficitur: ac si prorsus refrigeret, acescit penitus. Præterea quod in uindemia ipsa per assiduam pluuiam, aliena humiditate fuerit imbutum, leui occasione acescit. Contrà uero accidit ijs quæ talia quum sin, igni admouentur: nam & protinus, & progressu temporis dulciora reddunt: tandemque si perdurauerint, alijs

Dulcia proxime accedunt ad naturam eorum quibus talia uidentur.

Mustum.

Succum cuiusvis pomi feruescere, ut mustum.

Vina uetera, calidiora.

Dulce est calidius austero. Amarum esse calidius dulci. Astrictio à frigido oritur.

Vina igni admouita, dulciora reddunt.

Maturatio fru-
ctibus oibus a
solari calore p-
uenit,

Aceti facultas

Omphaciū &
acetum in qui-
bus differant.

Acetū magis
refrigerat q̄
mel calefaciat

Fructus oēs in
primo sui ortu
esse acerbos.

similiter amarescūt. Quum itaq; omphax sit acida, uua
uerò dulcis, ac fructibus omnibus maturatio à sola-
ri calore proueniat, planum est, imperfectius & frigi-
dius esse quod acidū: perfectius uerò & calidius, quod
dulce fuerit. Cæterū diuersis uiribus acetū atq; suc-
cus omphacis constant. Nam acetum proprio quidem
uini calore, est frigidum: ascititio autem, contractoq;
ex putredine calidum. At omphacis succus calorē non
habet: ac proinde nec acrimoniam. Præterea ompha-
cis succo acetum tenuius est. Quamobrem frigiditas q̄
ab aceto infligitur, excellit eam quæ procedit à succo
omphacis, idq; & uehemētia, & mistione. Nam tam-
etsi succo omphacis, ne minima quidem caliditas ille:
aceto autem acrimonia quædam excalfaciens: hæc ta-
men satis non est, ad superandam ab aciditate proue-
nientem frigiditatem: sed potius ueluti sternens uiam,
atq; aperiens meatus, illius celeritatem promouet. Ca-
liditas siquidem quæ à præcedēte aceti acrimonia ori-
tur, protinus à frigore insequētis aciditatis extinguit,
ita ut multò maior ex aceto frigiditas percipiatur. Ad
hæc autem si pari mole acetum melli permisceas, aceti
frigiditas superabit mellis caliditatē: eoq; magis, quo
fuerit maior aceti copia. Quod si multò plus mellis q̄
aceti indideris, parem calorem atq; frigiditatem in ea
mixture comperies. Siquidem multis numeris acetum
plus ab ijs q̄ moderatè sunt calida, ad frigiditatem rece-
scit, q̄ mel ad caliditatem. Porro omphacis succus, qui
& ipse (ut omnes fructus i primo sui ortu) est acerbus,
ad ardentia hypochondria longè pstantior est, q̄ ace-
tum: q̄ nec uiolentam, nec ferientem, nec mordaci ca-
lori iunctam frigiditatem sortiatur.

G A P. XII.

PORRO q̄ uina quædam inualida Vere atq; æstate
acescāt: quodq; uehemētius mota in meridianisq;
locis reposita, idem etiam patiantur: contrà uerò hye-

SIM. MED. FAC. LIB. IIII. 19

me atq; uersus aquilonem defossa, integra & secundū suas uires seruētur, nonnulli à calore nasci aciditatem existimarunt. Se autem ij falsos esse deprehendent, ubi uiderint non calida & uetera uina, sed quæ principio sunt frigidiora, sic per calorē acescere.

CAP. XIII.

Persimile autem quid uinis accidit, quæ natura frigidiora aquosioraq; sunt, quale flāmis exiguis & imbecillis. Quippè si eas ad feruidum solem exponas, prorsus obscurari, aut etiā extingui conspicias. Quod si ualido etiam flatu concutias infirmā, ac paruam flāmam, citius illam extinxis, q̄ inauxeris. Natura enim infirma ualidum nec motum, nec calorem sustinet. Ceterū multis in locis fortiora uina, ex industria cōmouēt & transportant, necnon soli exponunt, & calfaciunt, ac deniq; ad meridiē obuertunt cellas, ut citius sic maturescāt & potui idonea euadant. Nam quod multo tēpore alijs, hoc ijs quæ sic excalfacta sunt, breuissimo accidit. Quemadmodum igitur exercitia ualida et sol, calida & robusta corpora, etiā ualidiora efficiunt; prosterunt autem, digerunt, & refrigerant quæ non sunt eiusmodi: sic uina natura calida, motus ueluti uentilās, sol excalfaciens, flammæq; iuxta ardentes, celerius cōcoquunt; quæ uerò frigidiora & aquosiora existunt, eorum arguūt omnia id genus imbecillitatem, celeriusq; perpeti cogūt, quæ alioqui post passura essent; quum nimirum res quælibet in propria natura seruetur calore proprio: corrūpatur autem ab imoderatione extrinseca, non minus caloris, q̄ frigiditatis.

CAP. XIII.

IN uniuersum autem aciditas nascitur calore quidē mutante, non autem uincente siue alimentum, siue medicamentum: quemadmodum uidere est in acidis ructibus, qui à semicoctis cibis oriūtur. Quod autem opus sit calore alterante, argumēto sunt lac, & prisanæ

Vinorū q̄ nam
accescant.

Flāmulas extingui a feruido sole.

Infirma natura ualidum necq; motū, necq; calorem sustinet.

Vina calida a quibus concoquant celerius

Calore proprio seruant singula, corrūpuntur contrario.

Aciditas unde oriatur.

Acidi sapor
sunt essentia si-
mul tenuis &
frigida.

Acidus sapor
syncerus i oxa-
lide & oxyla-
patho reperiit.

Generationes
omniū corpo-
rū ex quatuor
elementis con-
stare.

Similium faci-
liorem esse tra-
situm in se in-
uicem.

Linguae facul-
tas.

Linguae cur plu-
res nervi tri-
buti.

Dulcedo ē cō-
munis omniū
quæ nutriunt.

succus, quæ tempore æstiuo citius acescunt, quæ hyeme. Quum enim sapor acidus sint essentia simul tenuis & frigida, quemadmodum constitutio Borealis, nasci certe sine calore non possunt: sicuti nec ille ipse aer: ac proinde licet frigidi sint omnes sapor acidus, nullum tamen eorum quæ extremè refrigerando enecant, acidum est. Exploranda porrò acidus saporis natura est, in oxalide & oxylapatho, ut in quibus reperiatur maximè syncerus & simplex. Etenim quod propriè in saporibus appellatur acidum, à sola lingua percipi potest, sicuti & acre: ceterum quod utriusque est commune, nempe mordacitas, etiam à tactu sentitur. Porrò ex quatuor elementis impari mistura coeuntibus particulatim omnium corporum constant generationes. Ex ea autem imparitate perficiuntur proprietates corporum particularium. Quippè ex elementorum inæquali mistura, plantarum: ex plantis autem, animalium proprietates oriuntur. Ac transeunt sanè quædam protinus in se mutuo: nonnulla mediantibus alijs: ueluti terra in triticum, hordeum, & alia id genus: rursus horum singula in carnem humanam: quum tamen ipsa terra caro ut fiat sit impossibile, transfiliendo eam quæ in medio est mutationem. At eorum quæ in sese mutuo transeunt, quædam celerem: quædam diuturnam alterationem obtinent. Verum quæ maximè sunt inter se similia, celerè: quæ dissimiliora, tardior. Lingua igitur exactissimo sensu prædita, omnes qualitates diiudicat, nec non familiaria & similia, ab ijs quæ sunt contraria discernit. Cuius usus gratia in hanc solam particulam complures nervi inferuntur: quum in aliarum singulas inferatur aut unus tantum, aut alter, nec is magnitudine insignis. Quum igitur quædam naturæ nostræ magis sint familiaria: quædam minus: atque hæc quidem temperamento huic: illa autem illi: necessariò plures qualitates ipsius gustus existunt. Ceterum omnium quæ nutriunt communis dulcedo est:

quandoquidem quicquid nutrit, necessario plus aut minus sit dulce oportet. Quæ uerò nō nutriunt, ea, aut non dulcia, aut salsa esse, est dicendum. At uerò id quod cuiq; rerum familiare est, unum est: nam & natura eius est un: aque autem aliena, complura: partim plus, partim minus à substantia eius dissidentia. Porro quæ dulcia simul & acerba sunt, ea crassioris essentia sunt, & temperaturæ frigidæ. Quæ acida simul & dulcia, tenuiora sunt q̃ acerba, refrigerant tñ & ipsa. At amara, calida sunt, sed acria his calidiora. Nutriūt ergo hæc omnia, si iunctam habeant dulcedinem. Per se autem nullum dictorum nutrit: quorum saporum mistiones, minimè quidem fiunt subito, sed in alteratione consistunt. Nam ijs quæ à natura mutantur, sensim fiunt alterationes. Sicuti igitur quod est summè dulce, aptum esui est: quod uerò exquisitè amarum, ineptum esui: ita quæ in medio sunt eorum, nutriunt quidem, uerū minus q̃ dulce. Eadē ratio est in cæteris qualitatibus: si quidem præter dulcem, nulla nutrire potest. At elementa multò sanè etiam minus nutriunt, nullamq; gustui qualitatem offerunt.

CAP. XV.

Sed quemadmodum edulia quæ nutriendorum naturæ quàm simillima sunt, ea & dulcedinem præ se ferunt, nec ullam præparationem requirunt: sic quæ temperaturam nata sunt remotiorem, alia condimentis, alia coctione, alia utroq; indigent. Etenim condimenta, quum ex se edendo non sint, suauitatem tamen ijs quæ per ipsa præparantur, conciliant: quod illa reducant ad medium. Apparet etiam natura calidi, quibus admota fuerit, ea celeriter alterare, atq; in aliam mutare speciem. Quædam tamen suauiora, quædam insuauiora igni applicata redduntur: sicuti & quædam longo tēpore: quædam minimo, ut coquant, indigent. Etenim quæ nutriendorum corporum tēpe-

Familiarē cuiq;
esse unicū, alie
na autē, plura.

Acria amaris
calidiora.

Elementa nec
nutriunt nec ul
lā gustui quali
tate offerunt.

Condimentis
rum usus.

Alimenta intē
perata, quomō
conigenda.

Humorum qui
ī corpore sunt,
sapores.

Mel quibus in
bile vertatur.
Mel plusculū
igni admotum
amaricat.

Mel temporis
spatio amare-
scit.
Lac nūq̄ ama-
rum effici.
Lac ex tribus
substantiis con-
stat.

raturis similia sunt, ea uel citra coctionem, aut præpa-
rationem, iam dulcia apparēt. Quæ uerò dissimilia exi-
stunt, omnia insuauiasunt, anteq̄ præparentur. Atq̄
ea quidē quæ nimis calida sunt, frigido corrigi debent:
quæ uerò impensē frigida, calidorum mistura obsonio-
rum, & igni. Ad eundem modum humiditate, quæ ter-
rea sunt & sicca: siccitate, quæ humidiora sunt q̄ expe-
diat. Maximam eorum, quæ dicta sunt, faciet fidē, quæ
in ore fit transmutatio. Nam qui plusculū sustinuerunt
ieiunium, ihs salua falsa redditur: qui uerò plurimum,
amara. Sic etiā uniuersum corpus biliosum redditur.
Est autem ipsa flaua bilis amara: atra autē, acida: San-
guis qui secundum naturam est, dulcissimus. At pitui-
ta linguam contingens, nunc dulcis, nunc acida, nunc
falsa uidetur.

C A P. XVI.

Nihil igitur mirum, nec cur rerum omnium dulcissi-
mum mel, succum generet amarissimum: nec cur
id maximē ætate florētibus & calidis natura, & febrile-
tibus accidat. Nam ut foris quum plusculum igni ad-
mouetur amarū efficitur, ad eundem modum in animā-
tium corporibus, ubi syncerū ualidumq̄; nactum ca-
lorem fuerit, biliosum succum procreat. At in tempe-
raturis & affectibus frigidioribus, facile in moderatū
sanguinē uertitur. Nec uerò ab alieno tantū calore, sed
à suo etiam proprio, mel amarum temporis spatio red-
ditur. Porro lac, etiā si gustu sit dulce, ex se tamen nūq̄
amarum efficitur. Vincitur enim in eo caliditas à frigi-
ditate: ac proinde acescit repositum. Constat autem ex
tribus substantiis, qualitate diuersis: prima quidē cras-
sa, ex qua caseus conficitur: secunda pingui, ex qua bu-
tyrum: tertia aquea, quam nominamus serum. Ex quib-
us pinguis quidē, maximē temperata est: crassa ue-
rò, paululum ab ea declinat: excrementum autem illud
serosum, frigidum est et humidum. Si igitur gustari lac

posset, ubi in uentre & per uenas concoctum est, ipso melle dulcius inueniretur. Nam quod foris & ex sese mel obtinet, id dum coquitur lac accipit. Et quum admodum ingens calor in animante extiterit, tantam acquirat lac dulcedinem, quantam deperdit mel. Recta quoque id ratione euenit. Etenim quod summè dulce est, ac proinde nihil apponi ad eius dulcedinem potest, id ut in consequentem uerri pergat qualitatem est necesse. At cui quid deest, id per concoctionem acquirit. Verùm lac ubi cruditatē in uentre perpetitur, in frigidiori quidem, acescit: in calidiore nidorosum amarumque efficit: nunquam autem inter coquendum mel aciditatem contrahit. Porro utraque, tum quod acidum est, tum quod amarum, linguam mordicant. Cæterum mordacitas ipsa, à tactu propriè, non à gustu sentitur: tribusque istis saporibus, acido, amaro, & acri, est mordicatio communis: uerùm acido quidem, ut frigidus simul atque subtilis; amaro uerò & acri, ut calidis.

CAP. XVII.

Quod sapor acer sit calidus, non est cur in demon- strando sim anxius: quandoquidem id nemo ad- dubitat: & euidentia sensus, demonstrationis fidem pre- uertit. Porro quæ ex acris idonea sunt esui, dulcem quandam, & si obscuram, necessariò habent qualitatem admistam. Proinde multis ipsorum pro obsonio uti- mur: multis uerò ut condimentis tantum: at ut cibo, ip- sorum omnino nullo, idque ob uirium uehementiam. Eo- rum autem quæ non eduntur, alia mortifera sunt, alia simpliciter medicamenta: omnia * tamen cuti nostræ imposita, celeriter ulcus moliunt. Sunt & quæ ne gu- stare quidem audeas, cuiusmodi sunt cantharides, tha- psia, & ea quæ erosione aut putrefactione interimunt. Multa uerò etiam ipso statim odore pugnantiam cum homine indicant: ueluti, & hæc ipsa quæ nunc diximus: & ex summè refrigerantibus, cicutæ, papaueris, man-

Lac in eisdem in
vetriculi inge-
te calore, tantam
dulcedinem con-
trahit, quātam
amittit mel.
Lac quomodo
in alienas qua-
litates mutetur.

Mordicatio
acido, amaro,
& acri saporibus
est communis.

Acer sapor est
calidus.

Acria esculenta,
necessario ha-
bent admistam
dulcedinem.

Acrium medi-
caminum diffe-
rentia.

Saporū singu-
lorū qualis sit
finis aut termi-
nus.

Amari saporis
facultas.

Amara quibus
morbis conue-
niat.

Staphis agria
colliquat car-
nem.

dragorū, lycopersij, & hyoscyami succus. Terminus autem siue finis saporis amari est abstergere: acris uerò, urere: at dulcis, nutrire: ubi i sua quisque natura absolutus fuerit, hoc est minimè alienis qualitatibus ofuscatus. Porro quod in ulceribus nati sunt præstare amari saporis, id ipsum assumpti in corpus efficiunt. Abstergunt quippe & expurgant: quæque in uenis est crassitiem incidunt. Quamobrem menses mouet; educendoque ex pectore & pulmone tui auxiliatur: comitialique etiam competunt morbo: si modò naturam deleteriam non habeant. Iis tamē qui sanguinem expuunt sunt noxij. Aristolochia autē, iris, & panax, aded amara sunt, ut proximè ad saporem acrem pertingant: ob idque nec abstergant tantum, sed etiam exedant & mordicent. Staphisagria etiam, nihil ab istis amaritudine uincitur, estque iam aded & acris & calida, ut non modò sordem ulceribus auferat, sed ipsam etiam carnem colliquet.

C A P. XVIII.

Acridi saporū
facultas.

Acres saporis
quō ab amaris
differant.

Igitur saporis acres, primū exactè esse calidos dicimus: dein exedentes, urentes, crustam molientes, & colliquantes, si uel ipsi cuti imponantur. Nam, intra corpus assumpti, si quidē tota substantia animanti aduersentur, ipsum putrefaciētes corrumpunt: si uerò caloris imoderatione dūtaxat, si crassæ sint essentia atque terrea, interna exulcerant: si tenuis, urinam atque sudores promouent, in summaque incidendi & digerendi in halitum obtinent facultatem. Ex quo genere quidam, tum expuitionibus ex thorace, tum mensiū motibus auxiliantur. Nec uerò sola uehementi caliditate ab amaris acres saporis differunt: sed quod amari omnes non modò calidam habeant facultatem, sed etiam siccam, & fuligini assimilē: nimirum à dulcibus excalfactis & exiccatis suam suscipiētes generationē: acres autem, quicunque amari non sunt, admistam nullā humidi atem

miditatem sortiantur: quo fit ut eiusmodi corporum à nobis non pauca esitentur. Cæterum astringentibus medicamentis non parum tenuiora sunt medicamēta amara: acribus uerò, crassiora. Quare nec facillè crassos uiscidosq; humores pertanfeunt, ueluti ea quæ tenuiori essentia sunt prædita: nec ad incidendum inepta sunt, pinde ut crassiora. In medio siquidē sint utriusq; excessus oportet, quæ incisura sunt. At uerò ferro lapidiq; ignito ea quæ per erosionem interimunt medicamenta similia sunt: quæ à corporis nimirū calore huc perducuntur: ueluti chalcitis, misy, fori, arsenicum, hydragyros, lithargyros, & alia innumera. Crassarum enim sunt partiū id genus omnia, & potestate calida: proindeq; temporis spatio accensa, per eā quæ ab animante proficiscitur mutationem, non aliterq; lapis ferumq; ignitum, uentrem, tum exulcerāt, tum exurunt: quū scilicet in corpus distribui præ grauitate non possint. His tamen tenuiora sunt, calx, cantharis, lepus marinus: necnon aristolochia, & iris: quæ quidem hæc ultima duo, & magis sunt illis acria, minimeq; deleteria existunt. Cantharis autem modicè sumpta, quibusq; oportet admista, non modò nihil offendit uesicam, sed renes etiam expurgat.

C A P. XIX.

QUod itaq; amarus sapor siccis temperie corporibus insit, hinc colligere est, qd & minimè omnium amara putrescant, minimeq; tum uermes, tum animalcula illa, quæ in radicibus, herbisq; & fructibus putrescentibus oriri solent, producant. Maximè namq; uidemus in humidis nasci corporibus uermes ac putrilaginem. Quam obrem quæ exactè amara sunt, animantibus p̄p̄modum uniuersis sunt esui inepta: quū nimirum aial omne sit humidum. Porro absynthium nō solū amarum est, sed astringit: marina uerò aqua falsa potius est, q̄ amara. At aqua quæ est in lacu Sy-

Tomus IIII.

E e e c

Incidētia q̄lla
esse debeant.
Erodentia me-
dicamenta fer-
ro esse ignito
similia.

Erodentiū spe-
cies variæ.

Cantharis cō-
mode exhibi-
ta, expurgat
renes.

Amara min-
ime omniū pu-
trescere.

Amara cur ani-
malib⁹ uniuersis
sint esui ine-
pta.

Animal omne
esse humidū.

Maris mortui
aqua cuiusmo-
di sit.

Salsuginē eam
ēē ad saliendū
optimā, cui o-
uum innatare
videatur.

Salsa amare-
scere, amplius
excalfacia.

Mare mortuū,
cur nec plantā
nec aīal vllum
alat.

Amara ēē ho-
minibus atq;
plātis aduersa.
Salis vires &
differentiæ.

riæ Palestinæ, quē alij uocant mare mortuum, alij sta-
gnum bituminosum, alij deniq; Sodomenum, gustan-
tibus non salsa modò, sed amara uidef: estq; adeò gra-
uis & corpulenta, respectu aliarū, ut ne si coneris qui-
dem infiliens, in profundum differri possis. Inest enim
ei salis substantia admodum grauis & terrea; ac proin-
de tantò est aqua q̄ in eo lacu est, marina grauior, quā-
tò marina fluuiali. Poteris autem ipse aquam marinā
efficere, colliquato sale in aqua fluuiali: cognoscereq;
simul quanto grauior reddatur aqua eiusmodi, quā-
m sit dulcis. Quin & modū iam inuenerunt moderatam
ad saliendum conficiendi salsuginem, si in ea ouum na-
tare uideatur. Quòd si decoquere salsuginē ipsam ue-
lis, protinus amarior reddetur. Nam quicquid salsum
pluſculum excalfeceris, amarū euadet. Ergo in eo Sy-
riæ lacu, q̄ nimirum aqua quæ in eo est, amaricet, nul-
lum neq; animal, neq; plāta inesse conspicitur. Immo
quum duo in eum longè maximi fluuij confluant, pi-
sciumq; copia scatētes, præcipuē qui pp̄e Ierichontē
fluit, quem Iordanem appellant, nullus omnino pisciū
fluuiorum ostia excedit: et si captos quis in lacum inij-
ciat, celeriter eos mori conspiciat: adeò est omnibus tū
hominibus, tum plantis aduersum, quod amarum exi-
stit. Omni autem sali obscura quedam astringendi uis
inest, qua eas quæ condiunt carnes constringit ac den-
fat: potissimū ubi durus, & minimè fragilis fuerit. Ta-
lis est exactissimus quidem fossilis ferè omnis; minus
autem illo, marinus: tum qui multis in locis aquis leui-
ter salis areſcentibus prouenit, tertium locū obtinet,
abstergere magis q̄ astringere contrahereq; potens.
proximas his vires Sodomiticus habet, æquē atq; ma-
rinus durus.

C A P. XX.

Propinquus est sapor salsus amaro, quum terreni
sint ambo, & calidi: non obscura tamen diuersita-

te diffident: quod uidelicet amarus à calore arido magis sit extenuatus, & elaboratus. Sic in genere salis, qui durior, densior, atque terrestrior est, quilibet ferè est uniuersus fossilis, minus existit calidus, subtiliùque; minus partiù; quod uerò rûpi facilis, laxusque; tenuior simul atque calidior est; in quo genere & subamarus cõsistit, mediã naturã inter salem durum & aphronitrum obtinens. At uerò spuma nitri omnium est iam dictorum tenuissima: ueluti & Asiæ petræ flos: qui aphronitro tamẽ minus est calidus: quare hic excrescentias carniũ minori cruciatu colliquat. Mordicat uerò eas nitri flos siue spuma: mordicat etiam, tum aphronitrum, tum nitrum. Ceterũ quæ sunt crassa essentia, plus rodunt, ubi quendã fuerint calorem nacta.

CAP. XXI.

PLerique odores similiter saporibus nos afficiunt. Si quidem acida omnia, & præcipuè acetum, similiter odoratum gustumque; mouet. Tum acria quoque ueluti, allia, cepæ, & ipsa non minus quàm gustum, odoratum offendunt, mordicantque; Itaque nonnullorum corporũ, etiam non gustantes, qualitatem cognoscimus, ueluti fimi: proinde ne gustare quidem aggredimur, quod maxima fides odoratu habebatur. Quin etiã si qua boni odoris edulia putrilagine corrupta, odore nos suo offendant, ne gustare quidẽ illa dignamur: fereque; in omnibus mutuò consentiunt odoratus & gustus. Attamen in odore suauis fimi, ueluti rosa, plurimum sanè dissident. Tantum enim abest ut gustatibus suauia sint, ut amaritudinem non uulgarẽ exhibeant. Tametsi quod amarum est, nunquam sit odoratum. Siquidem generatio amari saporis ex dulcibus proficiscitur à calore extenuatis: ac proinde amara calidiora simul & tenuiora sunt dulcibus. Porro sensus odoris in cerebri collocatur uentriculis anterioribus: odorabiliũque; uaporosa est substantia. Ea quippè quæ à corporibus defluunt,

Salsi & amari
saporis discrimen.

Salis genera.

Odores plerique
quod similiter saporibus nos
afficiunt.

Amara odorata non esse.

Odoris sensus
in cerebri uentriculis anterioribus collocari

Eeee ij

Odorabilem
est vaporosam
substantiam.

Odoratum oē
nō esse suauē.

aeri ambienti permista, in cerebrumq; per narium in-
spirationem delata, sensum mouent. Recta ergo ratio-
ne odorata omnia eadem & calida sunt quadantenus,
quum uaporum copia à calore excitetur. At non
quicquid odoratum est, suaue continuò erit. Siqui-
dem non omne id spiritui contento in uentriculis cere-
bri, familiare existit. Iam uerò in beneolentia & gra-
ueolentia odorabilem pleraq; reducimus: appellan-
tes beneolentia quidem proportionē quadam ad ea
quæ linguæ sunt dulcia: graueolentia autem, ad ea quæ
omnino insuaui. Cæterum ab ijs quæ exactè, tum sal-
sa, tum acerbæ sunt, aut nihil, aut omnino parum ua-
poris defluit.

CAP. XXII.

Odor nō per-
inde ut sapor
sensibilium tem-
peries indicat.

Rosæ iesse ex-
crementa tria.

Rosæ partium
excrementa.

I Taq; haud solida res est, ex odore de sensibilibus
temperatura conijcere, perindè ut gustu: nimirum
ob substantiarum inæqualitatē & differentiam. Etenim
quæ odore carent, crassam quidem essentiam obtinēt:
cæterum quæ sit eorum in calore & frigore cōstitutio,
id nondum constat. At quæ odorata sunt, tenuia utiq;
sunt quadantenus, calidaq;. Porro quum in rosæ succo
(præter ipsius rosæ corpus durum terreumq;) tria ex-
crementa inueniantur, unum crassum, quale est in ui-
nis fæx: alterum aerium, quod uini flori respondet: ter-
tium aqueum, quod in omnibus bullitionē corruptio-
nemq; molit: certè gustus id genus omnia diiudicat.
Siquidem rosam gustantibus aliud quidem acerbum
est: id quod terreum ut sit, & crassum & frigidū, est ne-
cesse: aliud uerò amarum, quod tenue est & calidum:
tertium deniq; aqueum, necessariò quidem frigidum,
sed in tenuitatis crassitudinisq; oppositione, quodam-
modo extremorum, quorum uires exoluit, mediū. Hec
itaq; omnia de succo rosæ per gustum ipsum discer-
nas: at per odorem, haud æquè: quum non perinde om-
nes eius partes euaporent, nec perinde sensum moue-

ant. Multò minus ex coloribus de uiribus medicamētorum licet ratiocinari: quum in coloribus singulis calida, frigida, humida & sicca reperiās. In particularibus autem seminum, radicum, aut succorū generibus aliquam ex coloribus, licet sumere indicationem. Vt si dicas cepam, scillam, uinum, quātò fuerint albidiora, tantò & minus calida: quæ uerò subflaua fuluaq; calidiora. Idem usu uenit tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri, ieros radici, asphodiliq; & alijs compluribus. In quoq; enim genere in uniuersum fulua, flaua, rubraq; omnia albis sunt calidiora.

Colores ad medicaminū uires dignoscēdas parum cōferunt.

Calidiora sunt albis fulua, flaua, rubraq;

Itaq; etsi hinc quoq; coniectura fieri queat, optimū tamen fuerit per experiētiā discretam facultates inuenire medicamentorū. Siquidem in hac falli nō possis: licet prius q̄ experientia uirtutem agnoscas, gustus pleraq; indicet, pauculū etiam approbātē ipso odore.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E S I M P L I C I V M

Medicamētorum facultatib; us. Lib. V.



SVNT ergo (quatenus dictum est) qualitates primæ, caliditas, frigiditas, humiditas atq; siccitas. Quæ uerò ab illis denominātur corpora, ea sunt tū cōmunia omnium elementa: tum ea quæ per harum excellentiam, calida, aut frigida, aut sicca, aut humida nuncupantur: tum ea quæ ad conueniēs siue symmetrum generis eiusdem, aut speciei conferūtur: quæq; ad quiduis obuium. Diximus præterea nutrimentum uinci ab eo quod nutritur: medicamentum autem uincere, ac superare alteraq; corpus cuius fuerit medicamētum: idq; aut una

Qualitates primæ quæ sunt.

Nutrimentum uinci ab eo quod nutritur. Medicamentū uicit, alteratq;

Eeee ij

corpus cuius
medicamentū
existit.

Simpliciū me-
dicamentorū ple-
raque dissimila-
riū sunt partū

Medicamentis
quorū utan-
tur homines.

Medicamento
rū tāta in agē-
do diuersitas
vnde oriatur.

Idiotarū co-
gnitio quousque
progrediatur.

qualitate, aut coniugatis duabus, aut uniuersa substan-
tia, ut complura letalium medicamentorum, nec pau-
ca etiam amuletorum: tum purgantia omnia, & ple-
raque eorum quæ attrahentia uocantur. Quæ uerò una
duabus uel qualitatibus in uniuersum nostrū corpus
agunt, ea hoc in libro exponemus, hinc sumpta hypo-
thesi, quod simplicium medicamentorū pleraque dissimila-
rium sunt partium, reque uera composita, tamen si appel-
lētur simplicia, quod cuiusmodi sint, talia natura sint, nec
quicquam ex nostra industria assumpserint.

C A P. I.

Medicamentis frequenter utuntur homines, tum ob
alterationem quam qualitatibus primis moluntur,
dum uidelicet calfaciunt, refrigerant, humectant,
& siccant: tum ob eam quæ à secundis perficitur qua-
litatibus, quarum nimirum ratione, alia emollientia di-
cuntur, alia tendentia, alia laxantia, atque alia denique ali-
ter nominantur. Siquidem quum particulatim unum-
quodque medicamentorum non pari modo ex illis pri-
mis qualitatibus suam temperaturam acceperit, inde
fit, ut hoc quidem ex his uim laxandi, tendendi illud, aliud
aliam facultatem sortiatur. De quibus sanè siue secun-
dis, siue tertijs facultatibus agere in hoc quinto com-
mentario est animus. Porro ad simplices intemperies,
facilesque affectus pellendos, sæpe natura duce, ple-
rique idiotarū ipsa remedia inueniunt. At phlegmones,
scirrhi, oedematis, erysipelatisque, nullū ex illis sibi re-
medium ducit peruestigandum: tanquam unumquodque
eorum maius iam sit, quam pro captu hominis plebei, ac
scientiam requirat uenerabiliorem, quam Medicinam
appellant, sicuti & illius professorem, Medicum. Atque
hucusque & ipsi procedunt, ut sciant ulcus cauum imple-
ri carne: sordidum purgari debere: æquabile cicatri-
ce induci: non tamē norunt, quid carne impleat, quid
purget, quid cicatrice inducat: sed ea inuenire, unius

opus est Medici. Ceterum quā ferē numerari nequeāt omnes particulatim vires medicamentorum, si secundum singula quæ ab eis perficiuntur, dum huic aut illi morbo auxiliantur, imponamus ipsis deflexa nomina: multò sanè præclarius uideatur, missa omni, prolixitate cōmodis speciebus compositas definire ipsorū facultates compēdiosissimè, sub quibus cæterę omnes quę dici possunt, comprehendunt. Vt si dixerimus non puris mouendi, aut doloris sedandi in triticę farinę caraplasmate, exempli gratia, facultatem inesse, sed modicè tum humidam, tum calidam.

CAP. II.

Quæ in cōmentario hoc discutienda ueniunt, iis quæ in alijs exposita sunt, magis ad medēdi rationem pertinent. Igitur ab emollientibus & pus mouentibus orsi, dicamus utraq; calida & humida existere: cæterum hæc quidem, ceu simillimū corpori in pus mouendo calorem producere, absq; ulla existentis in eo humiditatis aut consumptione, aut adiectione: illa uerò, ceu maiorem q̄ pro natura accēdentia, nōnihilq; humiditatis contrahentia. Est autem suppuratio idem quod in pus motio.

CAP. III.

Sed nec de emollientibus medicamentis, nec de ipsa emollitione, simpliciter loqui licet, quādoquidē nec de corpore duro, uel molli. Siquidem partim absolute durum dicit, ut terra; partim per excessum, ut unguis: partim ad symmetrum sui generis uel speciei, ut elephas nimirū ad Herculem; partim ad quiduis obuium, ut Diogenes ad Aristotelem: ac de molli pari iudicio. Omisitis tamen significatis cæteris, de mollibus durisq; ut ad cutem hominis temperatissimi, contemplerur, quam sanè regulam & mensuram statuimus, omnium quæ ita dicuntur. In idem autē recidit, si quod per excessum ad totam substantiam dicitur, sic durum

Eeee iij

Medicamentorum vires particulares numerari non posse

Pus motientia ab emollientibus quomodo differant.

Suppuratio quid.

Cutē hominis repperatissimi esse regulā secundū quā omnia diiudicant

Tactus homi-
nis temperari
medius est om-
niū tangibiliū
Durum quid.
Molle quid.

Mollitio quid.

Durius quibus
modis reddat
aliquid.

Molliendi ra-
tiones plures.

Cedentia oīa
nō eē mollia.

Renitentia quē.
Induratore va-
riæ medēdi ra-
tiones.

molleq; appellites, quādoquidem medium quoddam est tactus noster: uti & Aristoteli uisum est, & Plato quoq; sensisse uidetur, ubi ait. Dura quidē, quibus caro nostra cedit: mollia uerò, quæ cedunt carni. Quod uerò in comparatione ad quiduis obuium durum ac molle est, id in eo quod magis minusq; cedat, iudicari uidetur. Porro corporum præter naturam induratorū ad statum naturalem redditus emollitio est.

C A P. IIII.

Verū quum uariē quidq; efficiatur durius, nempe aut siccescens, aut concrescens, aut nimia repletionē, sic ut uehementer tendatur: aut deniq; aliqua coniugatione: sequitur ut & propria suaq; cuiq; emolliendi sit ratio. Cæterū quod in se cedit, molle est, si quidem corpus id simplex fuerit. Nam quod ex pluribus constat, ac sese inuicem contingentibus, ut tritici aceruus: aut inuicem implicatis, ut lana, simul & cedere potest, nec tamen esse molle. Contrā, in ijs quę summe plena sunt, ut utres, neutrum latus in se cedit: nec tamen quod continetur est durum, sicuti neq; id quod continet, q̄ antea durius, etsi sit tensius affectum. Ac talia sanē non dura, sed renitentia appellamus. Vt autē non est una iduratorum natura, ita neq; una medela. Nam quod à siccitate iduratum est, humectari postulat: qđ à congelatione, exalferi: quod à repletionē euacuari: qđ à siccitate simul concretionēq; humectari simul & icalescere, p̄ ea. s. quę tātō sunt calidiora et humidiora, quātō ipsa intēperies fuerit frigidior et siccior: qđ à cōgelatione simul & repletionē, pariter & calferi & uacuari. Siccantur porro corpora citra congelationem, tum in ualidis exercitijs, tum in sole feruenti, tum in ingenti inedia, tum in ardenti febre, & medicamentis quę ita siccant, ut non refrigerent. Congelantur à uehementi duntaxat frigore: sicuti & implentur à largi tantū humoris affluxu. At siccantur simul & congelantur, co-

euntibus quæ simul cōuenire possunt causis: ut si quis supra modum laboret in frigore. Sic quoque replentur simul et congelantur ab influxu frigido ac partis refrigeratione. Frigoris rursus causa triplex est: una, à foris incidentibus; altera est propria particulæ patientis temperies; tertia ab influente in ipsam humore prouenit. At emollientia pharmaca peculiariter congruunt ijs, quæ concretione induruerunt, magis quæ si in eis collectus sit humor præter naturam, ueluti in scirrhis. Nam si à siccitate induruerint, humectanda, non emollienda sunt. Similiter quæ sunt impleta, non molliri, sed euacuari postulant: id quæ aut refrigerantibus, aut calfacientibus, aut resiccantibus. Vacuant siquidem frigida repellendo, simul quæ cum calore exprimendo uaporis plurimum: excalfacientia autem, humorem contentum discutiendo in uaporem: quæ uerò propriè sicca appellantur, in halitus digerendo: id quæ aut ebibendo humores, aut totam alterando particulam. Porro oleum & aqua calida humectant simul & calfaciunt, id quæ multò magis, in unum coeuntia, quæ si singula per se adhibeantur. Idem efficit eduliorum qualitas si similiter habeat. Quæ quidem ob id fami caninæ auxiliatur, quæ affectus is sit frigiditas siccitati coniuncta. Cæterum cataplasma ex farina triticea in temperatis naturis pus mouens, nec naturalem partium humiditatem minuit, nec quicquam illam adauget, sicuti nec calorem intendere potest, nec heberare, sed tantum illius substantiam augere. Id igitur genus medicamentum humida & calida dicimus, ceu similem habentia nobis temperiem, quæ calida existit & humida.

CAP. V.

Medicamenta igitur quæ pus mouent, substantiam simularium particularum secundum naturam se habentium, tueri potius quam alterare sunt nata, quum mirum eis similem temperaturam obtineant: humidi-

Frigoris causa triplex.

Emollientia quibus cōueniāt.

Vacuationum modi diuersi.

Fames canina qualis sit affectus.

Cataplasma- tis e triticea farina vires.

Pus mouentia tueri non imutare substantiam partis sunt nata.

Alteratio in
animalibus tri-
plex.

Alterationi na-
turali, pter na-
turā, & medicā,
quæ insunt.

Cōcoctio quæ
fit ab innato ca-
lore, ab exter-
no calido iuua-
tur.

Pus mouentia
qualia esse de-
beant.

Pus mouēs me-
dicamen equa-
lem habet ca-
lorem, cū corpo-
re, in quo pus
mouetur.

Pus mouentia
esse calida &
humida.

tatem autē ipsam quæ in uacuis hæret, atq; adeo etiā
contusam carnem imutant. Etenim quum tres in ani-
malium corpore fiant alterationes, una planè secundū
naturam est, qua cibi in cremorē nutritioni aptum uer-
tuntur; altera contraria huic, præter naturam, qua cō-
putrescunt omnia; tertia ex utraq; mista, & media est,
partim qdē, cum prima illa cōicans; partim autem cū
hac secūda, quam præter naturam dicimus. Siquidem
alterationi secundū naturam, duo hæc insunt, * ut &
ex familiari materia animantis naturæ alteratio fiat, &
materia ipsa à calore ingenito superetur. Ei uerò quæ
præter naturam est, & ab aliena caliditate mutatio ac-
cidit, & ad nihil utile. At media earū, quæ comitat sup-
purationes, ab ingenito quidem calore fit, sed non pla-
nè uincente. Præterea nec ex materia prorsus benigna
peragitur, nec etiam omnino aliena. Itaq; quemadmo-
dum naturales alterationes, quæ ab innato calore pro-
ueniunt, à simili iuuantur extrinsecus (nam quid æquē
concoctioni uentris conferre nouimus, q̄ illi humanū
corpus admotum; unde nonnulli tum pueros, tum ca-
tellos, per quietem uentri imponūt) pari modo & quæ
in mouendo pure conspiciūt. Cæterū tale esse debet
quod mouendo puri adhibetur medicamētum, qualis
est in naturis temperatis calor natiuus. Quare si iusto
calidior natura fuerit, in eo corpore, medicamen quod
pus mouebit, tantò oportet sit temperato calidius, quā
tò & natura eius tēperatā in caliditate exuperat. Qua-
re cuiusq; singulatim hominis suum proprium est mo-
uendo puri medicamentum. Explorandæ autem sunt,
uniuersę facultates medicamentorum iuxta hominem
optimè temperatum: quo quidem proposito canone,
quæ mouendo sunt puri, calida & humida dicimus, q̄
illius calidæ & humidę tēperatæ sint consimilia; sicuti
calidiora multò, quæ indurata emolliunt.

C A P. VI.

I Nitium autē sumit induratorū affectio ex fluxione uiscida & crassa, paruis particulæ poris impacta. Digesto uerò per halitū quod in ea fluxione est tenue & subtile, ac deinde quod reliquum est refrigerato, ac ueluti concreto, uocata sequitur scirrholis. In qua quidem quoniam cum frigiditate humor redundat superfluus, iccirco etiam cōpositam eius esse oportet medellam: ob refrigerationem scilicet excalfacientia poscente affectu: ob superuacaneam autem humiditatem, uacuantia. Quia uerò quæ immodicè, tum calfaciūt, tum siccant, fluxionem ipsam magis impactam reddūt, manifestum est sola ea quæ nō admodū calfaciunt, quæq; non magnoperè exiccant (uocant enim talia emollientia) eiusmodi affectus posse sanare.

C A P. VII.

Q Vapropter calida sunt id genus medicamenta. nec admodum sicca, à pus mouentibus eo disfidencia, q̃ calidiora sint & sicciora. Illa enim cognatā ac simillimam corporibus nostris caliditatē possident: emollientia uerò, licet ualidiorem habeant, non tātam tamen, ut attractionis uiolentia desiccant reliquū. Preterea, quæ pus mouent, humorem qui præfuit in partibus induratis conseruant: emolliētia autem, paulum quidem eius absumunt. In summa, illa quidem, quantitate potius q̃ qualitate caloris agūt: quæ uerò indurata molliunt, qualitate potius q̃ quātitate. Itaq; si in parte quæ suppurationē indiget assidui impositas liceret seruare manus, celerrimè suppuratio perficeretur. Porro inter emolliētia cōnumeratur bdellium, styrax, galbanum, ammoniacum thymiana, medulla, tum ceruina, tum uitulina, adeps caprinus, taurinus, & quæ eiusdem sunt generis.

C A P. VIII.

Q Vinetiam q̃ emplasticum esse debeat id genus medicamentum, ut exactè puris generatiuum

Scirthus quomodo fiat.

Scirhum tollētia qualia sint.

Emollientia et pus mouentia quō differant.

Pus mouentia humore qui præfuit in partibus induratis cōseruant.

Manibus assidue apposis perfici suppurationem celerrime.

Emollientia.

Pus mouentia debere eē emplastica.

Pueris inesse
plurimū hali-
tuosi spiritus.

Innatū calidū.
Spiritus esse,
aut substantiā
animæ aut pri-
mum illius in-
strumentum.

Puri mouendo
quæ cōgruant.

fit, liquidò constat. Nam si substantiam innati caloris augere, non intendere qualitatem ipsam conueniat, poros corporis obstrui est necesse, quo uidelicet halituosos transpiratus includant. Siquidem ea cataplasmata quæ aut detergētia, aut ualidius excalfacientia halitus diffilari permittunt, exiccant quidem, sed pus non mouēt. Talis est hordeacea, cicerum, scenigræci, fabaceaq; farina: amplius etiam grina, eruina, panici, lupinorum, milij, omniumq; similiter exiccantium. Per detergētia quippè, q̄ meatus referent, particulæ calor euolat: ab immodicè autē calfacientibus, etiā natiui caloris substantia minuitur, sed qualitas ipsa intenditur: quum tamen halituosus quidam exuberansq; spiritus desyderetur, caliditate tamen cōmoderatus. Qui quidem quū in pueris copiosissimus sit (quod nimirū intellexit Hippocrates, crescentia dicens plurimum habere calidi innati) eorum omnes actiones naturales adauget. Verū nihil prohibet, sanguineam substantiam, simulq; aereā, unā cum spiritu, calidum inaudire innatum. Qui spiritus in omnibus animantis cōtensus partibus, licet nō unde quaq; sui similis, si non sit essentia animæ (ut Stoici quidem existimant) at certè primum eius est instrumentum. Continetur autem in spatijs inanibus quædā ueluti spiritus ipsius materiā, etiānum mutationē exposcēs leuiculam, ut spiritus innatus euadat: nihilosecius tamen conducens admodum ad naturalia opera: ex quibus unum est ea quæ in pus fit conuersio: quum in ipsa quædam etiam perficiatur concoctio. Quum igitur aliquid concoquere nobis consilium est, quā plurimum spiritum intus seruare oportet: nō autem discutere, qd faciunt illa quæ nuper cōmemorauimus. Porrò omnium ad puris generationem aptissimum est, ex ijs quidem quæ irrigantur, aqua temperata, aut hydrelæum: ex ijs uerò quæ perfunduntur, oleum temperatum. At ex ijs quæ ex hydrelgo illinunt, farina triticea, & panis ipse,

qui uidelicet modicè est coctus. Nā qui plurimum coctus est, quodāmodo siccior est, aptusq; phlegmonis quæ egrius concoctionem admittunt: qui uerò minus, ijs quæ feruentes sunt. Et sanè quod ex pane cōficitur cataplasma, difficulter coctioni cedētibz phlegmonis idoneum est. Siquidem panī, tum sal, tum fermentum miscetur. Quod uerò ex triticeā farina præparatū est, calidioribus utilius est. Et ipsius etiam triticeæ farinæ quæ pura est, tum panis quoq; qui purus est, puri mouendo congruentior existit: quum furfur & minus sit calidum, & magis desiccet. Farina autem pura, humida est & calida: qualia certè ad pus mouendum conferunt. Itaq; medicamenta quæ phlegmone tentatis imponuntur partibus, si calida sint & humida, ad pus mouendum conducunt, uti adeps suillus & uitulinus. Nam taurinus caprinusq; illis acrior existit: quam ob rem phlegmonis tum frigidioribus, tum durioribus, magis congruit. Est & adeps gallinaceorum phlegmonis coquendis familiarissimus, magisq; etiam asinum: quodammodo tamen ad digerendum potērior. At agrestium omnium animalium adeps multò acrior & siccior est, q̃ domesticorū, maximeq; pardalis, atq; leonis. Quare horū nullus mouendo puri est idoneus. Porro pus mouent & pix, & resina: ad feruentes quidē phlegmonas, ex rosaceo: ad frigidiores uerò, ex calfacientium aliquo oleo liquatq; utputà cicino, raphanino, ueteri, aut sicyoneio. Quum autē cera per se minus sit calida, quā ut pus mouere possit, solis feruētibus phlegmonis apta est, ex calidorum oleorum quopiam liquata. Igitur quæ pus mouent, naturā modicè excalfaciente & humectantem sortiuntur. Cæterū medicamen puri mouendo idoneum, facultate quidē est tale: ubi uerò corpori nostro est admotum, sit actu tale, siue energia. Ergo scirrhum uocant tumore præter naturam, doloris uacuum, sed durum: interdum etiā sen-

Furfuris facultas.

Adipis differentia.

Pus mouentia modice excalfaciunt, humectantq;.

Scirrhus quid, & unde gignatur.

Scirrhus qui gi-
gnant succi.

Emollientia q̄

Cancrofos scir-
rhos ab usu e-
mollientiū ex-
asperari.

Scirrhis a vi-
scida pituita
ortis, q̄lia me-
dicamenta cō-
ueniant.

Emollientia.

Sal emollienti-
bus iniiciendus
non est, q̄ exic-
cet valde.

Emollientia de-
bēt esse etiam
emplastica.

Indurātia sunt
frigida & hu-
mida.
Solani natura.

sus expertem. Oritur scirrhus ex humore crasso & fri-
gido, quales sunt duo duntaxat: bilis uidelicet atra, &
superexiccata pituita. Proinde tumores scirrhosi om-
nino aut pituitosæ substantiæ sunt, aut atrabilariæ, aut
ex utraq; misti. Propriè autem emollientia dicuntur,
quæ medentur scirrhosis tumoribus ex pituita exicca-
ta, crassisq; humoribus ortis. Consueuerūt enim n̄ po-
tissimū in musculorum capitibus gigni. At quæ ab
atrabilario succo duruerunt, cancrofa sunt omnia, &
ab emollientibus medicinis exasperantur. Sed his
quo pacto prospicere oporteat, in commentarijs
methodi medendi docebimus. Quæ uerò à lento cras-
soq; humore concreto indurata sunt, calida in secun-
do aut tertio ordine: sicca autem in primo medicamen-
ta desyderant. Sed quum non exigua sit in corporibus
induratis maioris minorisq; latitudo, necessum est me-
dicamentorum illis medentium non paruam etiam la-
titudinem esse. In uniuersum autem ex emollientibus
medicamentis, præstantiora sunt, quæ recentia existūt.
Siquidem inueterata, ualidius q̄ expediat exiccāt. Por-
rò radix altheæ & cucumeris agrestis, nonnullq; aliæ
plantæ, partim in oleo, partim in aqua decoctæ, emol-
liunt: sicuti maluæ agrestis folia, tum cruda, tū cocta.
Atq; hoc simplex medicamentum est, sicut porcinus
adeps inueteratus, cui salis nihil indere oportet, sicuti
nec emollientiū ulli. Valde siquidē sal exiccat. In sum-
ma uerò, quæcunq; alia emollire possunt, calida sunt
ex secundo, & interdū ex tertio ordine: leuiter uerò sic-
ca. Sed & his etiā emplastica uis insit oportet, non se-
cus q̄ pus mouentibus: at quæ nō perinde meatus ob-
struat: q̄ magis, q̄ illa, euacuare sint nata.

C A P. IX.

AT indurantia frigida sunt, & humida, ut semper-
uiuum, portulaca, psyllium, lenticula palustris,
solanum: quanquam hoc, in medio exiccantium &

humectantium consistit, duplicē in se habens substantiam, nempe terrenā & aqueam. At uerò si quid simul & refrigeret & desiccet, sanē & ipsum idurabit omnino: impropriē tamen, quum concretionē potius q̄ euacuatione indurēt corpus. Illa siquidem potius siccitas est, ac proinde non emolitione, sed humectatione curatur: quemadmodum tensio relaxatione, & relaxatio tensione.

CAP. X.

Porrò laxatio in articulis fit, humectatis immodicē quę circa eos sunt ligamentis, pariter & tendinibus: tensio uerò, non etiam simpliciter: sed aut plusculum exiccatis, aut refrigeratis, aut phlegmone affectis, aut scirrho. In cute autem non tantū ita, sed musculis quoq; subditis quoquo modo in tumorē sublatis: quēadmodum etiam in inflammationibus accidit. Quā obrem non simpliciter una est species remediorum laxantium: utpotē quum alia humectando, alia calfaciendo, alia emolliendo, quædā uacuando, nonnulla tumores præter naturam purgando, alia etiam per coniugationem, horum quippiam agendo, laxare assolent. Est autem emplasticum medicamentum, quod terrena uiscidaq; substantia, minimeq; mordaci præditum, illitū meatibus corporis tenaciter hæret.

CAP. XI.

Quod emplastico contrarium est, dici queat poros repurgans, & infarctū liberans: estq; nec uiscidu, nec mordacitatis expers, sed subtile et nitrosum. Nam in ratione tantū maioris, ac minoris differunt, tū emplastica ab ijs quæ sordes nutriunt, tum repurgantia ab extergentibus. Nam quæ poros obstructos referāt, subtiliora extergentibus sunt, emplasticisq; cōtraria. Sunt autem hæc, tum nitrosa, tum amara. Cæterū ad extergenda ea quæ in superficie sunt, requiritur ut cuti extimē imposita medicamēta ipsa, solā exactamq;

Laxatio ubi fit & quomō. Tensionis cāg.

Laxantiū species variz.

Emplasticonū essentia qualis

Emplastici oppositum quale

Extergētia cu-
tim quidē, de-
bent esse exa-
cte nitrosa, uis-
cera autē, uel si
aliquid astrictio-
nis fortiant, ni-
hil nocuerint.

Absynthium
intus repurgat
meatus, foris
nequaquā.

Medicamenta
ad crassos vi-
scidosq; humo-
res expectorā-
dos cōmoda.

Obstructiones
iecoris et liēis,
quę potissimū,
tollant.

nitrosam qualitatem possideāt. At intrò in corpus as-
sumpta, etiam si adiuncta sit quędam astrictio, possint
tamē sic quoq; magnos purgare abstergereq; meatus,
cuiusmodi in uasis consistūt. Nam foris meatuum exi-
guitas prius ab astrictione occlusa, q̄ probè queat ex-
purgari, non etiam inde in altum abstergentem sub-
stantiam recipit, nec expurgatur. At quę circa uen-
trem uisceraq; sunt partes omnes, quum maximos
in se habeant meatus, maius accipiunt et commodum
ex uasorum corroboracione, quàm propter osculo-
rum exiguitatem ledantur. Proinde intus absynthium
repurgare potest, foris nō potest: quippè quod ex ama-
ra acerbaq; facultate est compositum. Quęcunq; igit
repereris nitrosa et amara, ea ad purgādos meatus om-
nes, ualere noueris. At cutis & ulcerum sordes, non
hęc tantū, sed & uiribus minora possunt auferre, qua-
lia sunt dulcīa quę tenuium sunt partium. Porrò scilla,
iris, nitrum per se, aphronitrum, spuma nitri, seriphon,
abrotonū, cū cibo potuq; assumpta, crassos uiscidosq;
humores extenuandi uim obtinent. Quam ob rem len-
tis ac pituitosis thoracis pulmonisq; humoribus, aut
purulētis & incidendis, et extenuandis, & educendis,
aptiora inuenire alia prę istis medicamenta non pos-
sis. His ipsis & iecinoris obstructiones expurges, &
modicas etiam lienis. Nam quę maiores sunt, uehemē-
tiora desyderant: nempe capparis corticem, radices ta-
marices, scolopendrion, & scillam, & asplenon. Sed ta-
men istis utendum est ad iecur quidē, ipsis per sese dū-
taxat: ad lienem uerò, mistis aceto, aut ei incoctis: ad
thoracem pulmonemq; melicrato, ptisang, oxymeliti,
aut dulcium uinorum cuipiam.

CAP. XII.

Quam autem plurimam urinam mouere est cō-
siliū, non admodum dictis utendum est phar-
macis, sed quę acriora sunt, & magis excalfaciūt. Est
enim

enim omne acre calidū: cuius generis sunt semen apij, petroselini, fœniculi, dauci, agrioselini, smyrnij, ipsumq; seseli, ammi, phu, meon, asaron, & cum his acorron: à quibus sanguis non extenuatur duntaxat, sed & funditur & secernitur: nempe seroso & tenui seorsum segregato ad renes, crasso uerò in sese coeunte. Quam obrem puris ex thorace expuitioni ea omnia aduersantur: quum nimirum excafactoria exiccatoriaq; sint, necnon secretoria & coactoria. At quæ expui debent, mediocrem caliditatem desyderant; ne uidelicet impē se exiccentur: ac proinde medicamenta illis congruentia, eiusdem utilitatis gratia, cum sorbitiunculis potionibusq; exhibentur. Quæ uerò renes expurgant, & ipsa incidendi uim possidentia, larga humiditate non indigent. Porro quæ callosas consistentias sunt incidere idonea, admodum quidem incidunt, sed minimū sanè caloris possident. Caliditas quippè callum pœron ue ginit: non incidit, nec diuidit. Cæterum quæ & incidunt & mediocriter calida sunt, meliora existunt; ut radices regionum asparagorum, & rubi, & betonica, & polium, tum ochra, & uitrum ustum, & ex scilla confectum acetum, & consimilia.

C A P. XIII.

Quæ cutis meatus referant, ea rarefacientia dicimus: quæ uerò uasorū oscula, aperientia. Quin & illis contrariorū, quod poros contrahit, condensans dicunt: quod autem osculum claudit, occludēs siue obstruens nominant. Cæterum rarefacientium quidē natura modicè calida est, ac tum minimè siccans, tum tenuium partium: aperientium uerò, tum crassarum partium, tum acris ac mordax. His porro contrariorum, condensantium quidem, frigida sanè & aquea; occludentium autem, tum frigida, tum partium crassarum. Rarefacit igitur chamæmelum, & althea, quodq; ex ipsis conficitur oleum: nec minus quod ex agrestibus cu

Tomus II II.

F f f f

Acria oīa esse calida.

Diuretica medicamenta quæ.

Diuretica puri ex thorace expuendo aduersantur.

Expuitionibus quæ sunt idonea.

Callis incidendis discutientia, quæ congruentia, qualia esse debeant.

Rarefacientia,

Aperientia,

Condensantia, Occludentia,

Hæmorrhoidas aperiētia.

cumeribus. Quin & uetus, & cicinum, & raphaninū, ex eadem sunt nota. Aperiūt autem cyclaminus, allia, cæpæ, fel taurinum, unguentumq; irinum & amaricinum, quæ & occæcatas hæmorrhoidas aperiūt. At cōdensantia sunt aqua frigida, semperuium, portulaca, tribolus uiridis, psyllium, auricula muris, lenticula palustris, ac denicq; quæcunq; refrigerant, sed non astringunt. Proinde mandragora, cicuta, altercū, papauer, si eis quis modicè utatur, condensandi uim obtinent: si liberalius, non modò condensandi, sed stupefaciendi, & necandi. Occludunt porrò meatus omnia quæ ualidè astringunt, nec tamen acrimoniā habent adiunctā: quum nimirum essentia talium sit simul terrena & frigida. Medicamenta uerò quæ frigida quidem sunt aut æquè, aut amplius: sed substantiam fortiuntur aqueā, ea inquā debiliter & contrahunt & constringūt: uide, licet propter ipsam molliciem: quare condensantia potius q̃ obstructiua dicuntur. Quippè quicquid ualenter tum constipare, tum constringere debet, robur q̃dam renitens, & durum, habeat oportet.

C A P. XIII.

Rarefacientia.

Colliquantia.

Anastomotica.

QUæ itaq; citra molestiā excalfaciunt, ea sola omnium sunt rarefacientia. Si uerò non modò calida fuerint, sed etiam consistentia crassa, si quidem uehementia sint, & caustica, hoc est urentia, ignis instar corpus colliquant, & sæpe escharas ritu cauterij inducunt. At si debilius q̃ ut urere possint, excalfaciant, anastomoticam, siue aperiendi uim obtinēt. Quod autem causticū, non tamen uehemēter, est, præterea essentia tenuioris, id prorsus ab omni mordacitate aberit: aut cum exiguo, tum dolore, tum morsu eliquabit partes carnosas. Nam q̃d nō confertim alterat, ut quæ uehementer sunt calida, q̃d q; non ægrè penetrat, ut quæ crassæ sunt essentia, ea latentem actionē obtinent. Porro alterationem subitæ confertæq; mutationes, sicuti

& penetrationū que uiolentæ sunt, quales proficiſcun-
tur à causticis, & escharoticis, maxime sensibiles sunt.
Cæterū de quibus nūc agimus, minimè faciunt es-
charas, uocanturq; putrefacientia, licet improprie, atq;
ob symptomatis tantū similitudinem: quā ab utrisq;
nullo doloris sensu corruptio fiat. Nā que uerè putrefa-
cientia sunt, humectant simul & calfaciūt. Multis autē
modis corrūpi quid potest. Corrūpūtur siquidem plus
nimio refrigerata, aut excalfacta, aut humectata, aut
exiccata. Non tamē quicquid corrumpitur computre-
ſcit, sed quibus id cum foetore accidit. At medicamēta
de quibus nūc sermo est, putrefaciētia, q̄lia, sunt auripig-
mētum (q̄d arsenicum uocāt) sandaraca, chrysocola,
dryopteris, pityocāpe, & aconitum, omnia colliqua-
re sunt nata, & potissimum carnē tenellam, idq; absq;
dolore. Ex quibus quidem nōnulla imbecilliora cate-
ris ut ustæ petræ flos, extimā tantū superficiem, quā
contigerint, exedendo, ulceribus excreſcentibus cica-
tricem inducunt: quāquam medicamēta quæ uerè ad
cicatricem perducūt, nec detrahare, nec liquare carnē,
sed durare, & ficare sunt nata: ut alumē, galla ompha-
citis, æs uſtum, ac maximè lotū, cum eisq; fructus spi-
næ Ægyptiæ, siccaq; mali granati putamina.

C A P. XV.

Digitur est in planis ulceribus ad cicatricem du-
cendis consilium, ut caro alteretur, fiatq; cutis: id
quod perficitur per ea quæ illam contrahere, constrin-
gere, constipare, densare, ficare, & in callū cogere ua-
leant: quum nimirum cutis, uelut in callū durata caro
sit. Ea ergo medicamenta quæ sic agere possunt, pri-
mariō proprieq; dicūtur epulotica, siue ad cicatricem
ducentia: cætera uerō quæ exedunt carnē, secundariō,
& per accidens: sicuti & ea quæ absq; aſtrictione de-
ſiccandi uim habent mordacitatis expertem. Nam &
hec quoq; ex accidēti cicatricem inducunt: cuiusmodi

Corruptionis
modi diuerſi.

Putrefactionē
foetor necessa-
rio accedit.
Putrefacientia
q̄ carnē absq;
dolore liquant

Cicatricē indu-
centia medica-
menta que.

Epulotica que
dicūtur primo
& quæ secun-
dario.

F f f f ij

utiq; medicamentum est, myrrha, lithargyrus, ostreū,
& diphryges combusta: quandoquidem & ipsa cicat-
ricem sæpe inducunt illita. At uerò medicamenta ci-
tra morsum mediocriterq; abstergentia, cavitates ul-
cerum implent.

CAP. XVI.

PORRò attrahentes facultates sunt quæ ex alto uehe-
mentius extrahunt:repercutientes uerò, quæ in al-
tum occurrentes sibi succos repellunt. At essentia illis
quidem calida est & tenuium partium:his uerò frigi-
da, & crassarum. Attrahit enim perpetuò calidum: re-
pellit uerò frigidum. Verùm quod calori iunctam par-
tium tenuitatem sortitur, trahit uehementius: quod au-
tem crassitudinē frigori, uiolentius repellit. Atq; astrin-
gentium quidem nota est essentia. Attrahētium autē,
alia spōte est nata, ut dictamni, propoleos, thapsiæ, sa-
gapeni, succiq; cyrenaici & Medici essentia: alia uerò
* à putredine exasperante suam ducit eriginem: qua-
lis tum fermēto, tū pforico inest. Quòd si fimis quoq;
ex putrefactione generatio constat, utiq; omnes attra-
hendi facultate pollebunt: sed non parua illis differētia
inest. Nam columbinus admodū attrahit. Ex æquo au-
tem utrinq; ab eo recesserunt, ad calidius quidem anse-
rinus: ad frigidius uerò gallinaceus. Hoc etiam magis
uincuntur humanus & suillus. At canum stercus simi-
le est medicamentis extergentibus, maximè si uescantē
ossibus. Crocodilorum autem stercus magis etiam id
perficit. Est & aliud attrahentium medicamentorū ge-
nus, quod qualitatē familiaritate attrahit: id qd aliud
est nihil, q̃ totius essentiaē similitudine: ceu quæ nutriū-
tur, familiaria nutrimenta attrahunt. Talium enim me-
dicamentorum sunt purgantia omnia, & amuletorum
nonnulla. Cæterum calida ut sint id genus omnia est
necesse. Quinetiam, inter ea quæ essentijis similia sunt,
quod calidius fuerit, id potentius attrahet.

Attrahit calid.
Repellit frigi-
dum.

Attrahētium es-
sentia duplex.

Fimus omnis
attrahit.

Stercorū diffe-
rentia.

Attrahentia si-
militudine es-
sentia.

Calidiora tra-
here potētius.

IAm uerò facultatum alexipharmacarum natura est duplex. Quædam siquidem alterant: quædam euacuant uenenum lædens, aut deleterium medicamentum. Alterant igitur una qualitate, idque ratione contrarietatis: aut duarum coniugatione: aut denique tota substantia. Euacuant totius substantiæ similitudine, & caliditate subtilium partium. Cæterum alexipharmaca medicamenta, sanè facultate sunt media inter corpora quæ oblæduntur, & medicamenta lædentiæ: ut uidelicet eadem sit proportio corporis, ad facultatem alexiteriam, quæ illius ad deleteriam. Quamobrem omnia propere dum quæ deleterijs aduersantur medicamentis, si largius sumpta fuerint, grauer animantis corpus offendent. Quapropter ea exhibeantur moderatione, ut nec copia nimia corpus oblædât, nec exiguitate sua à deleterijs uincant. Euacuatur autem omne deleterium uenenum à foris impositis medicamentis, nempe aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantiæ similitudine. Quum igitur omnia deleteria medicamenta aduersissima secundum temperiem sint corporibus quæ ab ipsis læduntur, certè si à similibus temperie medicamentis uacuentur, erunt utique & hæc corporum naturis contraria: ut sunt haud dubie aliqua ex parte contraria, non tamen adeo ut interimant, sed in corporis perperientis, & medicamenti lædenti medio librent.

CAP. XVIII.

AT facultas quæ uerè & est & dicitur anodyna, eorum est, quæ primo ordine excalfaciunt, tenuemque essentiam sortiunt. Quæ uerò improprie anodyna uocatur, ijs medicamentis inest, quæ suo ingenti frigore partem stupefaciunt. Est autem stupor paulò minus quam insensibilitas, ac sensus priuatio. Cæterum quæ affectum sanando dolorem sedant, nec merito dici anodyna possunt: nam id est omnium curantium commune.

Ffff ij

Alexipharmacarum facultatum natura duplex.

Alexipharmaca esse media inter oblata corpora, & lædentiæ medicamenta.

Anodynæ facultatis natura

Stupor quid.

Anodynorum
opera.

Anodynis ni-
hil debere in-
esse astrictiōis

Anodynorum
differentia du-
plex.

Deleteria tota
substantia que

Deleteria quā
titate q̄ sint.

Quæ itaq; re uera sunt anodyna, partium sint tenuiū,
& calidiora q̄ quæ symmetra sunt, est necesse: ut sci-
licet euacuent, digerant, rarefaciant, extenuent, conco-
quant, & equabile reddant, quicquid partibus doloris
est causa. Quare nihil prorsus astrictiōis habeant oportet,
ne si pars quidem aut affectus exposcāt. Ex quibus
liquet, q̄ interdum affectionem non iuuabunt, sed tan-
tūmodo mitigabunt dolorē: quando uidelicet uerē ano-
dyna dicentur. Interdum adiuuabunt affectum, dicen-
turq; simul anodyna, & salubria. Igitur medicaminū
anodynorum quædam ex primo sunt calfacientiū or-
dine, quæ propriē anodyna dicunt, ut anethinum oleū;
quædam similiter ut corpus nostrum, qualia sanē pus
mouentia. Quæ uerō soporem epota inducunt, tempe-
riem sortiuntur uel summē aduersam n̄s quæ reuera
sunt anodyna. Refrigerant siquidem omnia corpus, &
sensum eousq; stupefaciunt, ut si paulō liberalius bi-
bantur, mortem afferant. Ceterū ad usum propositū
optima sunt quæ desiccant. Quæ uerō existentia frigi-
da, humiditatis etiam copiam obtinēt, ut cicuta, ea po-
tui non sunt utilia. Talis est mandragora, excepto eius
cortice sicco: & altercū præter semen. Sunt tñ & quæ
nobis tota essentia aduersent. Proinde si uel minimū
eorum assumptū fuerit, oīno lædat necesse ē: ceu dryo-
pteris, pityocampe, thapsia, solanū manicum, hydrar-
gyros: & fungorum nōnulli: præterea salua & fel ani-
malium uenicatorū. Nam talia omnia genere sunt de-
leteria, non quantitate. Ac proinde nihil eorum in ale-
xiterias antidotos indiē, ut solet papaueris succus, myr-
ra, styrax, & crocus. Nam tamen si quædam horū de-
mentent largius bibita, quædam mortem inferant, mē-
sura tamen conuenienti permista alijs, adiuuant. Eo-
rum porrō quæ mentem lædunt, pleraq; etiam caput
degrauant, uaporibus ipsum implētia: Sunt quæ id af-
fligant, oblædentia uentriculum. Cōmuniter uerō ce

rebrū uniuerſa duobus modis infeſtant, aut totius ſubſtantix contrarietate: aut quum una duabus ue quali-
tatibus illius temperaturam immutant.

C A P. XIX.

Vocabulum hoc purgans, una quidem, eaq; cōmu-
ni ratione, de ijs omnibus dicitur, quę quouis mo-
do animalis excrementa expurgant: alia uerò de ijs tan-
tū enunciat per excellentiam, quę aut per uomitū,
aut peralui deiectionem, purgationem moliuntur: ita
ut ab his diuerſi gñis ſint ea quę tum p nares, tum per
os à capite humores eliciunt. Eiuſdem cum iſtis ſunt
generis, quę uuluæ admota, ui quadam attractrice il-
lius excrementa repurgant. Quęcunq; ſiquidem pur-
gare animaduertimus, ea trahendi uim poſſident, alia
unum quempiam ſuccum: alia duos, aut etiam plures,
idq; illis inter ſeſe cōmune exiſtit. Nam quę craſſos hu-
mores extenuando, aut urinam ciere poſſunt, aut expe-
ctore pulmoneq; eiſciendis excreationibus auxiliari,
aut menſtruas purgationes ciere, purgant ſanè & ea
aliquo pacto, uerū antedictis non ſimiliter nuncu-
panť, ſed alia dicuntur diuretica, alia bechica, alia mēſes
mouētia, hac re à ſuperioribus diuerſa, q̄ non habeāt
uim familiarium ſuccorum attractricem, ut illa. Biſa-
riam autem dicuntur bechica: partim q̄ tuſſim prouo-
cent: partim q̄ eandem ſedent. Atqui contrarię horū
ſunt facultates. Alia enim extenuandi naturam habēt:
alia incrāſſandi. Atq; extenuandi quidem facultas, in
calidis & tenuium partium ſubſtantijs ſita eſt: incrāſ-
ſandi uerò, frigidis, & craſſarū partiū eſſentijs ineſt.

C A P. XX.

LActis & ſeminis effectrices facultates ſunt, par-
tim in medicamentis tantū: partim in alimētis.
In medicamētis quidem, quum ſuccos pituitoſos ex-
calfacientes in ſanguinem uertimus: in alimentis autē,
ſecundū ſubſtantix totius ſimilitudinē: ubi uidelicet

Purgās medi-
camentū multi-
plex habet ſi-
gnificatum.

Purgatiū alia
vnū alia duos
trahunt humo-
res.

Bechica dici-
biſariam.

humorū corpo-
ris humani te-
peries,

Ffff iij

Lactis temperies, dicitur

Lactis gignendi ratio.

Lactis generationem quæ prohibeant.

Sanguis est materia mensium & lactis,

Venas esse communes vberibus & matrici

Lacti mensibus quæ gignendis, eadē victus & medicinae ratione desyderari.

boni sunt succi, & humida, & tepidè calida, ceu ipsum lac. Siquidem sanguis est caloris mediocris particeps: plus uerò quàm mediocris, bilis: sicuti pituita frigiditatis. In medio autem pituitæ & sanguinis lac ipsum consistit: propius tamen sanguinē uersus inclinans. Vbi igitur ob penuriam sanguinis parum lactis in mammis cōficiē, humectatē simul & calfaciente uictus ratione est opus. Si uerò quod biliosus fuerit, in primis purgationem ipse sanguis desyderat: mox uictum quem nuper diximus. At si quod pituitosus, medicamenta requirit ex calfacientia aut primo, aut secundo ordine, non tamen exiccantia. Verū inter ea potiora sunt quæ non tantū medicamēta sunt, sed & nutrimēta, ueluti eruca, foeniculū, anethū. Intellego enim ipsas herbas etiamnum uirentes & humidæ: nam quæ siccæ sunt, plus quàm par sit & excalfaciunt & desiccant. Huius generis est smyrniō, apium, sion, polion, ea quæ prius quàm exiccentur. In summa uerò quæcunquæ calfaciunt plus quàm expediat, quæquæ desiccant aut refrigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis uitiantia, partim ipsum minorem reddētia, lactis prohibent generationem.

C A P. XXI.

Porrò dictis ad similem facultatem obtinent, quæcunquæ prouocare aut sedare menses possunt. Vtrotūquæ enim cōmunis materia est, nempe sanguis in uenis contentus. Quare ubi hic fluxilis fuerit, & qualitate contemperatus, utriusque abundantem copiam suppeditat. Cōmunes præterea uberibus uteroque uenæ sunt non exigue: Itaque ubi ad alterutram partē sanguis defertur, altera siccescit. Proinde quibus menses mediocriter deferuntur, ipsi lac minimè in mamillis colligitur, Quibus uerò hoc largè suppetit, ipsi planè menses cōhibentur. Quocirca mirandum non est, si tum uictus, tum medicamenta similia sint, nempe & ea quæ gignunt, et sedant menstruas uteri purgationes: et ea per lactis in

uberibus generationem, tum procurant, tum supprimunt: quāq̃ hactenus differant, q̃ & calidioribus, & magis incidentibus nonnunquam menstrua purgatio indigeat: quum nimirum ea in parte sitæ uenæ magis aperiri debeant, q̃ quæ tendunt in mamas, & sanguinem fluxilem magis requirant, utero ad delationē eius nihil conferente. Mittuntur enim in uenas quæ comitantur illi, non attrahunt menses. At sanguis in ubera non tantum mittitur, sed etiam trahitur: ac proinde leuiori subsidio medicaminum opus habet, quum non abunde in mamas is confluit. Medicamenta etiam quæ iuuat ut sanguis in mamillas serat, imperfectas etiam purgationes promouent. Sin autem nimis oblesæ sint, aut planè retentæ, nullum eiusmodi eas sanare potest: uerū sabina, meion, iris, calamintha, pulegium, dictamnū, asarum, costus, casia, cinnamomum, amomum, aristolochia, buniū, & eius gñis reliqua, exactas uteri purgationum retentiones persanant: taliaq̃ etiā urinas promouent. Sed ab ijs quæ diuretica tantum dicuntur, hoc quidem differunt, q̃ non uehementer desiccant. Etenim quæ non desiccant, & modicè calfaciunt, lacti sunt generando utilia: quæ uerò plus excalfaciunt, non tamen ualenter desiccant, mensibus eliciendis sunt congrua. Verum & utraq̃ hæc urinas prouocant, necnon in primis ea quæ desiccantia, etiam calfaciunt. At præter alia & reddendis ex pectore pulmoneq̃ excreationibus incōmoda sunt desiccantia. Poscunt quippè & ipsæ incidi quidem, non tamen exiccari: ceu & renum uesicæq̃ calculi.

CAP. XXII.

Semen generant cibi qui probè nutriunt, & flatulenti sunt, familiaresq̃ totis substantijs: medicamenta uerò flatulenta etiam & calida. Extinguunt autem desiccantia & refrigerantia omnia, quæq̃ totis substantijs cōtraria sunt. Porro prouocant quæcunq̃ calida sunt

Menses demittunt in uterū, nō ab illo attrahunt.

Menses & urinas quæ eliciant Menses ducuntia a diureticis quo differant.

Semen quæ generant, extinguuntq̃.

Semē prouocā
tia supprimen
tiāq.

Semen suppri
munt oia refri
gerantia.

Semen ne esse
quidē pmittūt,
quæ siccant.

Ocularia me
dicamenta.

& flatuosa absq; desiccatione: supprimunt uerò cōtra-
tia. Etenim quum seminis substantia ex bona superflui-
tate generationem sortiatur, sitq; etiam flatuosa: bene
nutriant & flatulēta sint, necesse est, quæcūq; semē aut
procreare, aut prouocare possunt. Quare bulbi, cicer,
fabæ, polypodes, cornus, edulia multi seminis & dicū-
tur & sunt. At scincus & satyrion medicamenta ad id
apta existūt. Porro simul cibi & medicamina multi se-
minis sunt lini semen, & eruca. Cæterum quæ refrige-
rare sunt nata, tam edulia, q̃ medicamenta, semen co-
gentia, incrassantia, & stabile reddentia, uim habent ip-
sum supprimentem, non autem corrumpentem: ut la-
ctuca, blitū, atriplex, cucurbita, mora, melopepones,
cucumeres, siue maturi, siue immaturi. Iam uerò quæ
desiccant, ne esse quidem semen permittūt, etiam si na-
tura calida sint, ut ruta. Quod si etiam non calfaciant,
multò minus: ut nymphæa. Eandem proportionem tū
esculentorum, tum medicamentorum est inuenire, cir-
ca lac & menstrua. Sub idem genus cadūt, quāuis alio
modo, quæ respirantium instrumentorum reijciendis
excreationibus auxiliantur: quæq; urinā ciere possunt.
Hæc enim omnia extenuandi facultatem obtinent, uti
contraria incrassandi.

C A P. XXIII.

T Ametfi collyrio diarodon, & diapompholygos,
& cygnio, & thure, uti possimus ad aures, aut os,
aut nares affectas, necnon ad pudēdum & anum, quia
tamen frequētius ad oculorum morbos ijs utimur, ob
id nimirum ocularia medicamenta uocantur: sicuti
alia hepatica, alia splenetica, stomachica ue, secun-
dum differentiam particularum quibus solent auxi-
liari creberrimè.

C A P. XXIII.

D Vm autem ij qui Methodici nominantur, meta-
syncriticas quasdam materias & facultates appellāt,

præterq̃ q̃ obscura & falsa loquuntur, etiam suæ ipso-
rum hæresi maximè repugnantia astruunt.

CAP. XXV.

EX operibus autem contrarias iudicare facultates
oportet: dicentes quasdam esse facultates empla-
sticas, & his contrarias, tum extergentes, tum farctuli-
berantes: prætera emollientes, indurantes, laxantes, &
contendentes. Nam astringentes, acres, amaras, acidas,
atq; dulces, non facultates medicamentorū, sed gustus
esse qualitates monstrauius. Quamquam & harum
etiam tum actiones, tum temperaturæ nobis ueniunt
inuestigandæ. Etenim astringens, terrestre est & frigi-
dum: acidum, subtile & frigidum: amarum terrestre &
subtile: quod insignis qualitatis expers, frigidum simul
& aqueum: acre, igneum: salsum terrestre & calidum:
nondum tamen igneum: similiter dulce, calidū, sed nō-
dum urens: quæ deniq; oleosa sunt, omnia aquea sunt
& aerea. Sequuta sanè sunt temperaturas eorū, & ope-
ra. Nam astringens contrahere, constringere, densare,
repellere, incrassare, omniaq; refrigerare, exiccareq; est
natum: acidū uerò incidere, extenuare, farctu libera-
re, & ppurgare citra calfactionē & cum aliquantula re-
percussione potest. At acre similiter ut acidum exte-
nuatq; & perpurgat, necnō perrumpit, attrahit, & es-
charam inducit: cæterū calfaciens, & digerens. Sic
amarū quoq; meatus perpurgat, abstergit, extenuat,
icidit humorum crassitiē absq; manifesta excalfactio-
ne. Quod qualitatis est expers incrassat, cogit, contra-
hit, extinguit, stupefacitq; Porro salsum contrahit, con-
stringit, condiendo seruat, desiccatur citra apertā aut fri-
giditatem, aut caliditatem. Dulce uerò concoquit, laxat,
rarefacit: oleosum deniq; humectat, emollitq; et laxat.
Ex quibus sanè facile inuenire licebit, qui nā sapes
temperie, & qui sint contrarij operibus.

CAP. XXVI.

Gustus qualita-
tes quæ sint.

Saporum tem-
peraturæ.

Gustatiliū qua-
litatū faculta-
tes & opera.

Symmetrum
quid dicatur.

Ordines, siue
gradus excessus
sui, quatuor.

Exiccantia
quarto ordine,
etiam viuunt.

Symmetrum appellare medicamentum conuenit,
quod nec exalfacit, nec deficcet, nec refrigerat,
nec humectat: nec calidū, frigidū, humidū, siccū uē
existit. Quod uerò aut calidius, aut humidius, aut frigi
dius, aut siccus est, à uincente, seu excedente facultate
cognominatur. Porro per unumquēq; excessum qua
tuor posuisse ordines, quod ad usum spectat, sufficit:
calidum quidem exempli gratia nominantes primi or
dinis, quod nos exalfacit, non tamē euidenter, sed ita
ut opus sit rationali demonstratione. Quæ uerò mani
festē calfacere nos dicuntur, ea secundi ordinis esse di
centur. At quæ iam uehementer quidē, non tamē sum
mē, tertij. Quæ autem adēd exalfacere possunt, ut es
charam moliantur & urant, quarti: similiterq; in alijs
exuperantijs existimandum. Nam quæ adēd uehemen
ter refrigerant, ut extinguant, & ipsa quarti sunt ordi
nis. Cæterū nullū inuenire est, qd quarto deficcet ordi
ne, quod non etiam urat. At tertij ordinis exiccantium
quippiam eē possit, quod minimē urat, ceu omnia quæ
uehementer astringunt: ex quibus est omphaciū, rhus,
alumē, balauſtia, galla omphacitis. In his autem ipsis
quædam uicina sunt adurentibus, ut squama æris, &
æs uſtum, quasi inter tertium quartumq; ordinem he
reant. In medio tertij est æs uſtum, si lotum sit: in
principio tertij hypocystis. Sic in secūdo &
quarto differentias licet cōstituere tri
plices: quū non perinde urāt cau
terium & napy, licet ambo
quarti sint ordinis.

93
GALENI PERGA

MENI DE SIMPLICIUM
MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber VI.



GENERALIS igitur sermo de facultate medicamentorum simplicium, uniuersus iam superioribus libris finem suum consequutus uidetur. Tempus uero iam est ad sermones particulares, siue speciales transire: hoc solummodo repetentes, primum quidem, in natura temperatissima; secundo in intemperata: postea deinceps in simplicibus morbis, faciendum esse periculum de facultate ipsorum medicamentorum. Cæterum quoniam medicamenta omnia, partim quidem sunt animalium partes, aut plantarum, aut fructuum, aut horum liquores, aut succi: partim autem ex metallis sumuntur: optimum mihi uisum est de plantis ante omnia differere: dein, de metallicis pertractare: ac ultimo ad animalium partes transire, idque obseruato literarum Græcarum ordine. Curabimus autem semper, ut (quod monuit primo oraculo Hippocrates, uitam pronuncians breuem, & artem longam) festinantes quam maximo studio, uiam incedamus compendiosissimam, per ea nepe quæ sunt in arte utilissima. Inter omnes porro Dioscorides perfectissimè mihi uidetur confecisse tractatum de medicamentorum materia. At qui aggrediuntur figuras herbarum describere, quas ne per somnium quidem uiderunt, non certè uident præconibus similes, qui notas ab alijs acceptas fugitiui mancipij publicant, quem ipsi nunquam uiderunt: imò quem ne agnoscere quidem possint, si propè assisteret. Illos etiam non possum non accusare,

Medicamenta
in quibus experi-
ri debeamus

Vita breuis,
Ars longa.

Dioscoridē ex
actissime tradi-
disse historiam
plantarum.

Herbarum formas
non esse ex
libris discendas

qui primi herbarum formas, scriptis docere conati sunt, quum melius existimem ab ipso præceptore oculis discere, ac non assimilari istis, qui ex libris prodeunt gubernatores.

Abrotoni tem-
peratura & es-
sentia.

Abrotonum.

Abrotono si quis
perfricat ante
invasionem, mi-
nus a febrili ri-
gore infestabi-
tur.

Abrotonum ver-
mes perimit.

Abrotonum ini-
micum ventri-
culo.

Absynthium ven-
triculo gratum.

Astringentia sunt
amica ventri-
culo.

Absynthii
tres species.
Santonicum
Seriphum.

A Brotonum calidum & siccum est facultate, in ter-
tio recessu, aut ordine, qui ad temperatam natu-
ram expenditur, situm. Valde siquidem est amarum: qui
sapor, quum essentiae terrene sit, à largo est calore exte-
nuatus. Porro si quibus per circuitus redeunt rigores,
ante invasionem rigorum eos abrotono confrices, mi-
nus utique concutientur, subitoque sensum caloris perci-
pient. Quod abrotonum etiam lubricos perimat, par-
quidem est, quum sit amarum. Cæterum & digerendi
& incidendi quædam vim habet, ipsoque absynthio ma-
iorem: quandoquidem paucis sine acerbitatis particeps
est abrotonum: haud autem exiguae absynthium. Un-
de inimicum sanè est ventriculo abrotonum, veluti etiã
seriphum: gratum uerò et amicum absynthium. Per se
quippe amarum omnifariam est insensum ventriculo:
austerum uerò, aut acerbum, aut in summa astringens,
amicum & familiare. Abrotoni duæ sunt species: qua-
rum alteram sanè marem, alteram foeminam uocant.
Similiter & absynthii tres species, aut differentiae assi-
gnantur. Quarum unam eodem cum genere ipso no-
mine appellant absynthium: cuiusmodi est Ponticum.
Secundam autem Santonicum: ac tertiam, denique Se-
riphum. Quibus omnibus absynthium quidem minus
est calidum, nempe plurimam astrictionem obtinens.
Non tamen minus desiccatorium existit. Cæterorum au-
tem, Santonicum à Santonia regione, in qua nascitur,
nomine sortitum, proximam habet facultatem, Seripho
paulò imbecillius in extenuando, calfaciendo, desiccân-
doque. Porro ipsum Seriphum Abrotono minus est ca-
lidum, uerum calidius absynthio, stomacho impendio

inimicum, nempe cum amaritudine, præ se etiam quādam ferens falsedinem. Sed nonnullam tamē, & si minimam, astrictionem fortitur. Sic abrotonum & santonicum admodū sunt infesta uētriculo. Solum enim inter ea absynthium, & maximè ponticum, gratū stomacho existit. Abrotonum ustum, calidū siccūq; facultate est, magis etiam q̄ cucurbita sicca usta, & anethi radix. Illa enim ulceribus humidis simul & citraphlegmonē callo induratis conueniunt; ac proinde maximè præputij ulceribus congruunt. At cinis abrotoni ulceribus omnibus mordax est: atq; iccirco ex oleo aliquo tenui, cicino scilicet, aut raphanino, aut ficyonio, aut ueteri, & maximè Sabino, ad alopecias accommodatur. Tum barbam tardius nascētem, in eorum aliquo, nec minus lentiscino maceratum, elicit.

Agnos. Vitex.

Agnos, aut uitex, fruticosa illa plāta, calidus quidem & siccus est, tertio ordine, uerū multū tenuis substantiæ, tum gustu acris simul & astringens; ipse tamen uitices ad medicinam habet inutiles. Cæterum folia, semenq; et flos, calida siccaq; sunt facultate, necnon tenui substantia, quare sæpe nobis sunt usui. Porro semen edendo est: tam perspicuè tamen calfacit, ut capiti dolorem hoc nomine pariat: quāquam si id frigatur minus caput tentat. Vtuncq; autem sumat, flatus uentris discutit. Præterea tum semen, tum flos, tum folia, uenereas intemperantias compescunt. Quare non tantū esā potaq; conferre ad castitatem uidentur, uerū etiam substrata, unde plāta ipsa, agnos, hoc est casta uocatur. At ruta q̄ agnos, magis quidem ex calfactoria & exiccatoria existit. Adhæc, agni quidem semen ac germina, modicā astrictionem ferunt: at ruta ubi aruerit, exactè amara est & acris: quādiu uerò humida fuerit, subamara. Nulla tamen austeritas aut acerbitas illi inest: aut illa certè obscurissima Quocirca &

Cucurbita usta
præputij vlce-
ribus cōgruit.

Abrotoni cinis
ex aliquo oleo
calido barbā
tardius nascentem elicit.

Agnos.
Vitex.

Viticis semen
capitis graui-
tatem parit.

Vitex vene-
reas intēperan-
tias cōpescit.

Rutæ facultas

Vitex obstru-
ctis cōfert, mē-
sesq; pmouet.

ad iecur & lienem indurata & obstructa, agni semen
potius q̄ rutæ competit. Præter dicta autem agnus &
mēses mouet, & indurata digerit, & lassitudinē tollit.

Agrostis. Gramen.

Agrostis.
Gramen.

GRaminis radix, modicè frigida est et sicca, morda-
citatem quandam exiguam, & partium tenuitatē
obtinens. At herba ipsa primo quidem recessu refrige-
rat, in humiditate uerò & siccitate existēs q̄ moderata.

Gramen esculentum.

Graminis escu-
lenti radix cruē-
ta vulnera glu-
tinat, fragitq;
lapides.

EIus radix est modicè frigida et sicca, p̄indeq; eruē-
ta ulcera glutinat. Ipsa autem herba illita non ue-
hementer refrigerat, in medio cōstituta humiditatis &
siccitatis. Radici porrò mordacitas & tenuitas quædā
exigua inest, qua nimirum lapides frangit, si quis eam
decoctam bibat. At semen alterius quidem, imbecillū
est; eius uerò quæ in Parnaso nascitur, urinam ciet, ac
fluxus uentris & stomachi resiccat. Vis enim eius est
exiccatoria, tenuium partium, & subacerba.

De quatuor Anchusis.

Anchusæ qua-
tuor species.

Onoclea qui-
bus morbis cō-
ueniat.

Lycopsos.

Onochilos.

ONoclea quam uocant, radicem habet admodum
refrigerantem, desiccantem, astringentem, & sub-
amaram, corporibus condensandis & modicè extenu-
andis idoneam; tum abstergendis quoq; & abluendis
biliosis & salsis succis. Quare aurigini & lienosis est
utilis. Præterea cum polenta illita, iuuat erysipelata, &
abstergit non modò epota, sed etiam admota extrinse-
cus: proinde aceto macerata uirilgines et lepras sanat.
At folia ipsius herbæ imbecilliora radice sunt, non ta-
men à resiccatione & astrictione aliena. Itaq; p̄fluuiū
sanant cum uino pota. Lycopsos nominata, refrigerās
etiam & siccans, similiter erysipelatis congruit. Cæte-
rūm radicem q̄ onoclea magis astringentem sortitur.
Onochilo cognominatæ uis & calidior & medicamē-
tosior inest. Quare eos qui à uiperis morfi sunt, admo-
dum iuuat, tum illita, tum suspensa, tum esa. Reliqua
uerò

uerò quæ quarta est, & parua, cæteris est calidior, amarior, & medicatior: ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mēsurā cū nasturtio & hyssopo epota.

Agarici radix.

Primò quidē gustu dulcis, sed paulò post subamara apparet, acrimoniæq; & alstrictionis leuiculæ quandam speciem temporis spatio inducit: estq; consistētia laxa. Quare composita hæc radix est ex substantia aerea & terrea, à calore extenuata. Minimum autē habet essentiæ aqueæ. Hac rōne & digerēdi uim possidet, & crassitudinem incidendi, tum anfractus uiscerum expurgandi. Idcirco regio morbo laborantes ex obstructione iecinoris, necnon morbo comitiali obnoxios, sanat: tum rigores per circuitus recurrentes, ex crassis uiscidīs q; humoribus ortos exterminat. Iuuat & morsos à bestijs frigore lædentibus, aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum: tum intrò in corpus assumptum, pondere drachmæ unius cū uino diluto. Est etiam & purgatorium.

Ageranton.

Facultatē digerendi habet, & leuiter quadantenus phlegmone liberandi,

Adiantum, Polytrichum, Callitrichum.

Vulgo capilli Veneris.

In calore & frigore symmetrum est, siccatur tamen, & extenuatur, et digerit. Caput ex alopecia glabrū, capillis uestit; strumas & abscessus digerit: epotum lapides frangit; uiscidorū crassorumq; è pectore pulmoneq; excreationibus; nō mediocriter cōfert: ac deniq; uentris profluuium sistit.

Æizoon. Semperuiuum.

Æizoon utrunq; tum maius, tum minus, desiccatur quidem leuiter, utpote astringens modicè: est tamen ex tertio ordine refrigerantium, in eoq; aquea essentia præpollēt. Quare ad erysipelata, herpes, &

Tomus IIII.

Gggg

Anchusæ quanta species anonyms, latos lumbricos perimit.

Agaricū radicem eē credit Galenus.

Agarici facultates insignes.

Ageranton.

Adianton.
Polytrichon.
Capill. Ven.

Æizoon.
Semperuiuum

phlegmonas à fluxione ortas accōmodatur.

Ægilops. Avena.

Ægilops.
Avena.

DIgerendi uim obtinet, existens leuiter acris. Vnde de phlegmonas induratas, & ægilopas sanat.

Æra. Lolium.

Æra.
Lolium.

IN principio tertij ordinis excafacientium, secundi uerò extremo exiccantium consistit, sic ut accedere magis quàm iris, naturæ acrium uideatur: à qua tamē essentiæ tenuitate relinquitur.

Ægyrus, siue populus alba.

Ægyrus.
Populus alba.

POpuli flores calidi sunt in primo recessu, paulūq; ad siccius declinant, subtiliorumq; potius q̃ crassiorum sunt partiū. Floribus similia sunt folia, licet imbecilliora. Resina etiam floribus similem facultatem, sed calidiorem obtinet. At semen, tum resina, tum floribus subtiliorum est partium, & exiccantius: non tamen multò calidius.

Acacia.

Acaciæ facul.

ACacia & planta ipsa acerbata est, & fructus, & succus: qui lotus acrimoniā deponit. Porro si parti illinatur, protinus eam sicciorem atq; contractā reddit: estq; tertij ordinis exiccantium, & secundi refrigerantium, ubi quidem elotus fuerit: alioqui si illotus sit, primi. Est autē consistentia terreus, habetq; in se partes quasdam aqueas, necnon alias tenues & calidas.

Acalephe. Vrtica.

Acalephe.

Vrtica extimulat uenerem.

Vrtica subducit aluum titillatione magis q̃ purgatione.

HVius herbe, tum fructus, tum folia, admodum digerentis sunt facultatis: adeò ut phymata & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuosum exhibent, dum coquuntur quo extimulant uenerem, & maxime ubi semen cum musto bibitur. Quòd non calfaciat uehementer, sed nimis tenuium sit partium, testimonio est crassiorum ex pectoreeductio: tum pruritus quem in partibus excitat. Porro subducit uentrem titillatione magis q̃ purgatione. In uniuersum, q̃ exiccari citra mor-

dicationem postulant ea conuenienter persanat.

Acanthos. Spina uulgaris.

Folia quidem mediocriter digerentem facultatem obtinent: at radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium.

Acanthos.
Spina.

Acanthium.

Radix huius & folia facultatis sunt excalfactoriæ, ut & ijs qui conuelluntur auxilietur.

Acanthion.

Acanthe leuce. Spina alba.

Radix eius desiccatoria est & modicè astringens: quamobrè & coeliacos et dysentericos iuuat, et sanguinis reiectiones cohibet, oedemataq; illitu contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluatur. Semen tenuis essentie & calidæ facultatis est: itaq; potui dari ijs qui conuelluntur conuenit.

Acanthe leuce
Spinæ albæ facultas.

Spina Ægyptia.

Validius q̃ spina alba, tum astringit, tum siccatur. Quare p̃fluuium muliebri radix eius supprimit. Fructus uerò & columellæ prodest, & ijs quæ in sede inflata sunt: ulceraq; ad cicatricem perducit.

Spinæ Ægyptiæ facultas.

Acoron.

Huius radice utimur, quæ gustu modicè amara est, odoreq; non iniucundo. Itaq; facultatis calidæ est, & consistentie tenuis. Quare & urinam mouet, et lienes induratos discutit, ceratoidisq; crassitiem detergit, extenuatq; Ad quod succus præstantior existit. Calfacit enim & siccatur in tertio ordine.

Aconi facultates.

Aconitum Pardalianches.

Hoc putrefacientis & deleteriæ facultatis existit: quare in cibo potuq; fugiendum.

Aconitum pardalianches.

Aconitum lycoctonum.

Est & hoc similis alteri facultatis: sed peculiariter lupos interficit, ut illud pardos.

Aconitum lycoctonum.

Acte, quam sabucum: Chamæacte, quam Ebulum uocant.

G g g g ij

Aste.
Sabucus.
Chameacte.
Ebulus.
Alinum,

VTracq; potentiam habet & desiccandi, & conglutinand, necnon digerendi modicum.

Alinum.

SEmen simul & lac hæc planta gignit, lestq; gustus acris & substringentis; ex qbus constat ipsam esse dissimilarem. Maior tamen pars eius temperatè est calida, cum humiditate inconfecta, & leuiter flatuosa.

Aloe.

Aloes facultas.

Hæc herba, optima in India nascitur, cuius liquor est id quod ad nos importatur cognominatum aloë, medicamentum ad plurimas res, propter siccitatem mordicationis expertem, utile. Quod quidè astringit modicè, sed fortiter amarum est; ac proinde subducit uentrem. Est autem tertij ordinis exiccantium; calfacientium autem, aut primi intensi, aut secundi remisii. Ad hæc uerò, gratum est uentriculo medicamen, ut si quid aliud; & sinus glutinat. Sanat ulcera quæ agrè ad cicatricè perducì possunt; & maximè quæ in ano sunt & pudèdo. Confert similiter si maceretur aqua, ad eorum phlegmonas, necnon eas quæ in ore, naribus, oculisq; oboriuntur. In summa, repellere & digerere simul potest, cum hoc ut paulum extergeat, quantum uidelicet ulceribus puris non sit molestum.

Alysson.

Alysson morfos a cane rabido, rabientem ipsum sanat.

NVncupata est hæc herba Alysson, q mirificè iuuat morfos à cane rabido. Sed rabièti quoq; data, sæpe in totum sanauit, ob totius substantiæ similitudinem. Siccatur autem digeritq; mediocriter; ac præterea detergit nonnihil. Qua ratione uiriliginem, & ephelim purgat.

Alfine. Auricula muris.

Alfine.
Auricula muris.

Hæc quum essentia sit aqueæ, citra astrictionem, tum refrigerat, tum humectat. Quare ad feruètes phlegmonas & mediocria erysipelata confert.

Amaracon. Maiorana.

C Alfacit quidem in tertio ordine: in secundo autem siccatur.

Amaracoma.
Maiorana.

I Lita uim habet astringentem, ac repellentem.

Ambrosia.

Ambrosia.

E Ius semē est admodum utile. Quum enim sit subamarum & acre, constat ipsum & digerere, & prouocare urinas. Calfacit autem, resiccatq; in tertio ordine intenso.

Ami.

Amarantum.

F Acultatis est incidentis & extenuantis. Quare comma eius cum uino pota, menses educit: omnesq; pota fluxiones desiccatur: stomacho infesta. Grumos etiā sanguinis dissoluere creditur.

Amarantum.

Amurca.

E X secundo est ordine calfacientium: at siccantium, intenso quodāmodo magis, terrestres substantiæ quum sit. Sic et ulcera corporum temperatura siccorū, curatur: quæ uerò in alijs omnibus sunt, exasperat, perinde ut resina, pix sicca, & bitumen.

Amurcæ vires.

Ampeloprason. Porrum agreste.

E St enim herba hæc porrū agreste: ob idq; acrius eo, atq; siccus: ut agrestia oia hortensibus. Proinde stomacho q̃ illud, nocētius. At crassos & lentos humores potentius incidit, ualentiusq; infarcta organis obstructione liberat. Hac quoq; rōne sæpe prouocauit urinas, ubi à crassis & lentis retinebantur humoribus. Adeo uerè est calidum, ut illitum cataplasmaris ritu, exulceret.

Ampelopraso
Agrestia oia esse acriora hortensibus.

Ampelos agria uitis agrestis.

R Acemi eius extergēdi uim possident: ac proinde cutis extimæ ulcera purgare possunt. Sed astringentem quandam sortiuntur extrema germina: quæ & sale condiri assolent.

Ampelos agria
Vitis agrestis.

Ampelos hemeros. Vitis satiuā.

Gggg ij

Ampelos.
Vitis.

Vitis cultæ assimilis facultas est agresti, sed ad omnia imbecillior.

Ampelos leuce, Vitis alba, Bryonia.

Ampelos leu-
ce.
Vitis alba.
Bryonia.

Prima huius germina Vere edi solent, edulium ueritriculo propter astrictionem acceptum. Ceterum subamaram, & modicè acrem astrictionem possident. Quare & urinam modicè cient. At radix & abstergentem, & desiccantem uim habet, & moderatè calidam. Quam ob rem & lienes iduratos liquat epota: cū ficubusq; foris imposita, pforam & lepram sanat. Porro fructus eius, racemi speciem præferens, ijs qui coria depfant est utilis.

Ampelos melæna. Vitis nigra.

Vitis nigra.

Vocatur autem hæc propriè bryonia, prædictæ ad omnia similis, nisi q̃ imbecillior.

Amygdala.

Amygdalorū
vires.

Quæ quidem palēm amara sunt, omnino extenuandi uim possident. Siquidem ephelim purgant, & excreationibus ex pectore pulmoneq; crassorum lentorumq; humorum mirè auxiliantur. Obstructiones præterea iecinoris à crassis & uiscidis succis ortas expediunt. Quin & lateris & lienis, & coli, & renum dolores, ab huiusmodi causa natos persanant. Ipsius arboris etiam radices coctæ, illitæq; ephes purgant. Porro amygdala dulcia, quæ & ipsa nonnihil fortiuntur amaritudinis, moderatè sunt calida.

Ammoniacum.

Ammoniacū.

Cuiusdam ferulæ est lachryma, intensam emolliēdi uim possidēs, adēd ut articulorum tophos dissoluat, & lienes induratos sanet, & choëradas per halitum digerat.

Amomum.

Amomum.

Acoro similem facultatem obtinet, nisi quòd acorum siccus sit, maiore autem concoquendi ui amomum.

Anagallis.

A Nagallis utraq; & quæ cœruleum, & quæ purpureum fert florem, extergentis est facultatis. Habet uerò nonnihil etiam caloris, & quandam trahendi uim, qua corpori infixæ extrahunt. Succus earū ex naribus purgat eadem de causa. In summa, desiccandi uim habent citra mordicationem. Quam ob rem uulnera glutinant, & putrida corrigunt.

Anagallis vtri
usq; facultates

Anagyris.

F Rutex est grauiter olens, et digerentis, excalfacientisq; facultatis. Cuius folia uiridia tumores reprimunt: at resiccata, incidētis sunt, exiccātisq; potentiæ. Similem ferè uim habet eius radice cortex. Semen autem subtiliorum est partium: uomitū tamen puocat.

Anagyrī facul-
tas.

Androsæmum. Officinis Milleperforata. Hispanis coraconcillo, hoc est corculum.

P Lanta est fruticosa, natura duplex. Vnum enim dicitur Ascyrō, species hyperici: alterum à quibusdam appellatur Dionysias. Est autem semen eorum purgatorium: foliorum uerò facultas modicè extergēs & desiccans, ut & ambusta curare credantur. Cæterum in uino austero decocta, uinum ipsum uulnerum grandium glutinatorium efficiunt.

Androsæmon
Milleperforata.

Androsaces.

A Mara & acris est herba. Potest autē resiccata ebibitaq; tum ipsa, tū fructus eius, magnopere prouocare urinam, & nimirū etiam digerere & desiccare.

Androsaces.

Andrachne. Portulaca.

F Rigida & aquea est temperie, paucæ particeps austeritatis: proinde fluxiones repellit, maximeq; biliosas & calidas. Estq; tertij ordinis refrigerātium: humectantium autem secundi. Quare maximè æstuātes adiuuat, tum uentris osculo imposita, tum hyponchondrijs: ac præcipuè in febribus hecticis. Præterea dentium stuporem lenit. Quoniam autem restringit, utili-

Andrachne.
Portulaca den-
tium stuporem
lenit.

Gggg iiij

ter dysentericis editur, & muliebri profluio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc sanè multò est quàm herba succus ipsius efficacior.

Anemone.

Anemone.

R Adix cōmansa pituitam euocat: succus è naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper fordida ulcerum anemone expurgant, & lepras detrahunt, menses q̄; appositæ eliciunt, & lac trahunt.

Anethum.

Anethi facultates.

A Deò excalfacit anethum, ut habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exiccantis uerò ordinis est secundi incipientis, aut primi finietis. Itaq; meritò in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnū conciliat, crudos humores cōcoquit. Vstū autem, tertij ordinis, tum calfaciētium, tum exiccātiū fit. Proinde ulceribus nimis humidis prodest: potissimum ijs quæ in pudendis consistunt. At quæ in præputio sunt inueterata, ea probè cicatrice inducit. Cæterum uiride humidius & minus calidum est. Itaq; magis concoquit, & somnū conciliat, sed minus discutit.

Anthillis.

Anthillis utraq; tractat.

A Nthillis utraq; modicè desiccat, ut & ulcera glutinet. At quæ chamæpityi assimilis est, subtiliorum est partium, magis q̄; detergit: præterea comitialibus competit.

Anthemis. Chamæmelum.

Anthemis. Chamæmelū.

C Alfacit, & desiccat in primo ordine, est q̄; tenuiū partium, ac proinde digerendi, laxandi, & rarefaciendi uim obrinet.

Anisi semen.

Anisi semen.

C Alfacit & siccat in tertio ordine. Proinde urinam mouet, ac digerit, flatu q̄; uentris reprimat.

Antirinum. Anarinum.

Antirinum.

S Emen habet inutile, est q̄; cum bubonio similis facultatis.

Aparine. Philanthropos.

MOdicè extergit et deficcatur, habetq; nonnihil sub-
tilium partium.

Aparine.
Philanthropos

Apios. Pirus,

Piri folia pariter & turiones, austera sunt. Ex fructu
autem, pars una terrea est, alia aquea. Cæterum
utraq; frigida; necnō alia temperata. Proinde esu pira
stomacho grata sunt, & sitim prohibent. Illita autē de-
ficcāt, modicè refrigerāt. Vnde etiā uulnera glutināt.

Apios.
Pirus.

Achrades. Pira syluestria.

MAgis q̄ pira reliquā astringunt & deficcant: ob
idq; maiora uulnera glutināt, fluxusq; reprimūt.

Achrades.
Pira syluestria

Apocynum. Cynocrambe. Cynomorum,

Syluestris mercurialis.

CAnibus iuxta & hominibus est uenenum, herba
grauiter olens, ob idq; uehementer calida; non ta-
men proportionē deficcāt. Itaq; illita admodum dige-
rentis est facultatis.

Apocynum.
Cynocrambe.
Cynomoron.

Argemone.

EThuius herbæ facultas abstersoria est & digerēs.

Argemone.

Arisaron.

Multò minus est aro. Radicē habet oliuæ magni-
tudine, sed multò est ipsa acrius.

Arisaron.

Aristolochia.

Radix eius est amara & subacris. Sed ex illis om-
nium subtilissima est, quæ rotunda. Aliarum ue-
rò duarum, quæ clematitis appellatur, fragrantior est,
infirmior tamen. At longā, tenuitate quidem à rotun-
da uincitur: abstergerendi tamen calfaciendiq; & ipsa
potentiam obtinet: minus sanè q̄ rotunda abstergens
& digerens, sed non minus calfaciēs: imò forsan plus.
Itaq; in qbus usus est modicè abstersionis, cōmodior
est longa: utputa in ulceribus carne implendis. At in
quibus crassum humorem ualidius extenuare oportet,
illic usus est rotundæ. Proinde dolores à crasso spiritu

Aristolochia
triplex.

Aristolochiæ
rotundę admi-
randa opera.

inductos, rotunda exactius persanat: extrahit spicula: putredines corrigit: ulcera sordida purgat: dentes & gingiuas splēdidas facit: auxilio est asthmaticis, singul-
tientibus, comitialibus, podagricisq; si cum aqua bi-
batur Tum ruptis & conuulsis, ut si quid aliud, medi-
camentum idoneum est.

Arceuthus.
Iuniperus.

Arceuthus. Iuniperus.

C Alida et sicca est tertij ordinis. At fructus, simili-
ter calidus est: siccus tamen in primo ordine.

Arctium.

Arctium.

Quod Thapso Verbasco est simile, radice tene-
ra, candida, dulci, caule oblongo et molli, semi-
ne cymino simili, tenuium est partium: ob idq; facul-
tatis modicē exiccantis & extergentis. Quam ob rem
radix ac semen eius in uino cocta, quadantenus dentium
dolores mitigant. Porro ambusta & chimethla non
horum modō decoctum, sed & caules teneriores sana-
re possunt.

Arctium aliud Lappa maior. Bardana.

Lappa maior.
Bardana.

D Igerit simul & desiccatur: astringit tamen non nihil:
unde folia eius antiquis ulceribus profunt.

Arnaglosson. Plantago.

Arnaglosson.
Plantago.

Refrigerantia
simul & astringentia quibus
morbis conue-
niant.

Refrigerat pariter & siccatur in secundo gradu: ha-
betq; non nihil austerum, ratione terrearum par-
tium. Porro medicamenta, quæ cum hoc q̄ refrigerant,
unā etiam astringunt, ea et ad ulcera rebellia omnia, et
ad fluxiones & putredines cōueniunt, ac p̄inde & ad
dysenterias. Nam & sanguinis profluvia sistunt, & si
quid aduratur, refrigerant. Tum sinus quoq; glutināt,
& alia ulcera recētia simul & uetera. Atq; in omnibus
ferē id genus medicamentis primas tenet, aut certē nul-
li secundum est arnaglossum, ob temperaturæ symme-
triam & conuenientiam. Nam siccitatem obtinet mor-
sus expertem, & frigiditatem quæ nōdum stupefaciat.
Fructus etiā & radix similis sunt facultatis, nisi q̄ tum

ficcoris, tum minus frigida. Quin & semē subtilium est partium: radices uerò crassiorū. At herbg folia exiccata, subrilium partium existūt, & minus frigida facultatis. Radicibus utuntur ad dentium dolores, tum mandentes, tum collutionibus incoquētes: præterea ad iecinoris renumq; obstructiones nō has tantū adhibēt, sed folia quoq; & multò magis semina.

Plantaginis radicibus ad dolores dentium utuntur.

Arum.

Mediocrem extergēdi uim possidet, estq; primū ordinis calfacientium & exiccantium. Radices eius comesæ mediocriter humorum crassitiem incidunt, ita ut sint excreationibus ex pectore idoneæ.

Arum.

Artemisia.

Dvplex est, utraq; tamen calfacit secūdo ordine, intenso autem primo, aut secundo remisso desiccatur: estq; tenuium partium: unde calculis renū, uteriq; fomentationibus haud mediocriter congruunt.

Artemisia utraq;.

Asarum.

Radices eius facultate similes radicibus acori sunt: intensiores tamen.

Asarum.

Asclepias.

Huius nondum nos periculum fecimus,

Asclepias.

Aspalathos.

Acris simul & astringēs est. Quare partibus quidē suis acribus excalfacit: austeris uerò refrigerat. Itaq; utriusq; ratione desiccatur, unde ad putredines & fluxiones est utilis.

Aspalathos.

Asparagus petræus.

Abstergendi uim habet citra manifestam caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes ac iecur infartu liberat, & maximè radices eius, & semen: quia & dentium dolores sanat.

Asparagus petræus.

Asplenum.

Tenuium quidē partiū, non tamē calida est herba. Hac utiq; rōne lapides frangit, & lienes liquat.

Asplenum.

Astragalos.

Astragalos.

R Adices astrictorias sortitur: quare non instrenue
ficcatur, Nam & ulcera glutinat, et alium fluentem
sistit, si quis in uino decoctam radicem bibat.

Aster atticus. Bubonium.

Aster atticus.
Bubonium.

P Artim quidem digerens est, partim autem refrige-
rans, uerum id non astringit.

Astaphis. Vua passa.

Astaphis.
Vua passa.

C Vltia quidem, concoquendi, astringendi, & leui-
ter digerendi, facultatem obtinet. At agrestis, ue-
hementer acris existit, adeo ut ex capite purget, abster-
gatq; ualenter. Itaq; ad pforam accommodata est. Sed &
urendi uim habet.

Asphodelus.

Asphodelus.

H Vius radix extergētis est facultatis. Vltæ autem
cinis, calidior, exiccantior, subtilior, ac digerere
potentior existit: ac proinde alopecias sanat.

Attractilis. Cnicus agrestis.

Attractilis.
Cnicus agrestis.

F Acultatem habet desiccandi, & modicè digeren-
di: exq; spinarum est genere.

Atraphaxys. Atriplex.

Atraphaxys.
Atriplex.

H Vmida quidem est in secundo ordine: frigida ue-
rò in primo: estq; aquea similiter malua. Quin et
uentrē celeriter permeat, ut illa, ob lubricitatē. Horten-
ses autē attriplex & malua, q̃ agrestes, tū humidiores
sunt, tum frigidiores: p̃inde phlegmonis & phygethli-
s incipientibus, hortenses: uigentibus autem & declinā-
tibus, agrestes magis conueniunt. Semen eius abster-
gendi uim habet. Itaq; icteritiæ ab obstructione ieci-
noris ortæ auxiliatur.

Aphace.

Aphace.

A Stringit, editurq; ut ipsa lenticula: ægrius tamen
concoquitur. Caterū ualentius desiccatur, & mo-
derati calor est.

Ab synthium.

A Strictoriam, amaram, & acrem qualitatem sortitur, excalfaciens, extergens, roborans, & exicans. Proinde biliosos uentris humores deſcit, ac per urinas euacuat. Verū contentam in uentre pituitam nihil adiuuat ſumptū. Sic nec ſi in thorace aut pulmone contineatur; nam astringens in eo facultas, q̄ amara, ualentior eſt. Eſt autē calidū in exceſſu primo; ſiccū uerò, in tertio. At ſuccus longē q̄ herba eſt calidior.

Balanus Mirepſica. Glans unguentaria.

S Vcco eius, qui calidus eſt, unguentarij utuntur. Reliquiæ autem unde expreſſus eſt ſuccus, uincētem habent qualitatem amaram: cui admixta eſt quædam aſtrictio. Proinde extergentem, incidentē, contrahentem, & ſtipantem effectū poſſident. Quòd ſi quis carnem eius drachmę pondere, cum melicrato bibat, medicamen experietur uomitorium. Sepe etiam per infernam aluū ſubducit largiter. Sed lienes liquat, iecurq̄, indureſcētia; ad quorum uiſcerum expurgationem, ex exocrato ipſam exhibere cōſueuimus. Ex aceto etiam lepras, pſoras, lētes, uirilignes, ionthos, ephelim, exanthemata, achoras, aliosq̄; id genus cutis affectus exterrit. Abſtergentem itaq̄ & incidentem cum aſtrictione obtinet facultatem. Cortex autem eius, admodum aſtrictorius exiſtit.

Balsamum.

B Alſamū deſiccāt & excalfacit ſecundo exceſſu: eſt autem & tenuium partium, adēd ut odoratum ſit. Eius lachryma ſubtiliorum eſt partium q̄ ipſa plāta: non tamen adēd calida ut nonnulli exiſtimant. Fructus eius perſimilis facultatis eſt, longē tamen in ſubtilitate partium inferior.

Balaustiū.

F Los eſt agreſtis punice, ſicuti domeſticarum cytinus. Valenter guſtum astringit. At uerò ſi omne astringens terreſtre eſt & frigidum, meritò quis dixe-

Absynthium

Balanus myrepſica.
Glans unguentaria.

Balsamum.

Opobalsamū.
Carpobalsamum.

Balaustiū.
Cytinus.

rit ipsum ualenter & exiccare, & refrigerare. Quo nomine ulcera ad cicatricē perducit. Quin etiam ad sanguinis reiectiones, dysenterias, necnon uētris uteriq; profluuia, nemo est qui non hoc medicamento utatur.

Batus. Rubus.

Batus.
Rubus.

R Vbi folia, germina, flos, fructus, & radix, qualitate astringente, neq; obscura, participant. Sed folia germinaq; recens nata plurimū in se habent substantiā aqueæ, parū uerò astrictiōis. Quare uulnera glutinant. At fructus maturus, non parum habet succi calidi temperati, qui existit dulcis: ob idq; & ob modicā astrictiōem non est insuauis gustui. At immaturus, acerbus est & ualidē exiccatorius. Ac sanē uterq; recōditur, ualidius q̄ recens desiccans. Flos eandē uim fructui immaturo possidet. Vtraq; ad dysenterias, uētris profluuium, robur deperditum, sanguinisq; expulsiōem sunt idonea remedia. Radix præter astrictiōē, non paucam habet substantiā in sese tenuem, per quā & lapides renum comminuit.

Rubi radix cō
minuit lapides

Batrachium. Ranunculus.

Batrachium.
Ranunculus.

H Vius omnes quatuor species adeò acres existūt, ut cum dolore exulcerent. Quare si conueniēter utare, pforas & lepras excoriant, & ungues diuellunt. Tum leprosis stigmata digerūt, & uerrucas detrahūt. Quin & alopecias iuuāt exiguo tempore admotē. Radix arefacta sternutationem prouocat. Sed & dentes dolentes iuuat, sic ut eos frangat. Est itaq; ualde calida & sicca, tum radix, tum uniuersa herba.

Bdellium.

Bdellium.

Q Vod Scythicum nominant estq; acrius & resinosis, emollientis admodum & efficacis uirtutis est. Arabicum autē, quod splendidius est, magis q̄ emollientia exiccat: uideturq; in potu sumptum calculos renum frangere, tum urinas ciere, & crudorum flatuum discursus, præterea laterum dolores, ruptu-

rasq; sanare.

Bechion. Tusfilago. Vngula caballina.

T Viles & orthopnoeas iuuare creditur, si quis folia arida aut radicem in prunis urens, ascendentem inde fuliginem inspiratu attrahat. Est autem modicè acris: ut sine molestia, noxa ue omnes thoracis affectus credatur rumpere. Folia uirentia partem recenti phlegmone obsessam illitu adiuuant.

Blitum.

H Olus est esculentum, humidæ frigideq; temperaturæ in secundo ordine.

Bulbus satiuus.

F Rigidior quidem & crassior agresti est, lentumq; succum pcreat. Nam & coctu difficilis est & flatusosus, & uenerem prouocans. Attamē illitus ob amaritudinem simul & astrictionē abstergit simul & glutinat, & nimirum etiam exiccat.

Bulbus uomitorius.

M Vltò est calidioris temperaturæ q̃ superior.

Bubonium. Aster atticus.

C Reditur sanare bubonas & illitum, & alligatum inguini. Digerit enim mediocriter, quia modicè est calidum. Cæterū non ita siccatur, ut tendat.

Buglosson.

H Vmidæ calidæq; tēperiei est: uinisq; iniectū hilaritatis causa esse creditur. Sed gutturis etiā lenit aspredinem, si melicrato coctum sumatur.

Bunium.

A Deò excalfacit, ut & urinas moueat, & menses prouocet.

Buphtalmos.

F Los eius floribus chamæmeli est tum maior, tum acrior: uehementiusq; digerit, adeò ut & duritias sanet, cerato mistus.

Brathy. Sabina.

Bechion.

Tusfilago.

Vngula caballina.

Blitum.

Bulbus satiuus

Bulbus vomitorius.

Bubonius.

Aster atticus.

Buglosson vino iniectum, hilaritatē parit.

Bunium.

Buphtalmos

Brathy.
Sabina.

Quantum in acrimonia cupressum uincit, tantū ab eo superatur in astrictione: quare illo & calidior est, & potētius digerit. Quin & similiter cupresso putredinibus accommodari potest, maximē ubi rebeliores fuerint, & diuturniores. Carbunculos item soluit; mensesq; ut si quid aliud, essentiae tenuitate prouocat, & sanguinem per urinas mouet. Foetum etiam uiuentem interficit, & mortuum educit. Esto autem hoc medicamen tertij ordinis tum excalfacientium, tum exiccantium; ex numero eorū quae uel maximē tenuiū sunt partium.

Bretanica.

Bretanica.

Huius folia astringentia sunt, & uulnerum glutinaria, similia agrestibus lapathis. At expressus ex illis succus perinde natus est astringere, uideturq; sanare iam putrescentia.

Bromus.

Bromus.

Illitum desiccet, digeritq; mediocriter, & sine morfu. Temperiem autem habet paulō frigidiorē. Nonnihil etiam astrictiois obtinet, ut uentris profluua iuuat.

Bryon thalattion. Alga.

Bryon thalattion.
Alga.

Compositū est ex terrena & aquea essentia, utraq; frigida. Siquidem & gustum astringit, & calidis quibusuis illitum, ea refrigerat, adiuuatq;.

Bryon.
Splachnon.
Muscus.

Bryon aut Splachnon. Muscus.

Vim habet astringentem inualidam, ceterū mediocriter frigidam. Nam & digerendi, & emolliendi facultatis est particeps.

Gallium.

Gallium.

Inde nomen sumpsit, q̄ lac coagulet. Facultatem autem obtinet exiccatoriā, & subacrem. Flos eius competere sanguinis profluuijs uidetur, & combustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

Gentiana.

Gentiana.

Huius radix efficacissimē extenuat, purgat, abstergit, liberat,

git, liberat obstructione, utpote impēse amara existēs.

Gigarta. Acinorum uuae nuclei.

EX secundo exiccantium sunt ordine: refrigerantiū
uerò, primo. Omnibus autem uentris cum proflu
uio iunctis affectibus, impēdio conferunt: utpote quū
acerbi appareant.

Gigarta:
Acinorum uuae
semina.

Gingidium.

GVstu amarum & astringens quum sit, temperie
calidum frigidumq; uidetur. Secundum utranq;
uerò qualitatem desiccatorium est. Cætera porrò sto
macho amicum existit.

Gingidium.

Glaucium.

AStringit cum quodam fastidio: tum adeò insigni
ter refrigerat, ut solum sæpe erysipelata, si ualen
tia nō fuerint, curare possit. Cōstat enim ex aquea ter
reaq; substantia, utraq; frigida.

Glaucium.

Glaux herba.

EX lacticinīs quum sit, calida quodammodo hu
midaq; fuerit.

Glaux herba.

Glechon. Pulegium.

QVandoquidē acris & subamara est, ualde exte
nuat & calfacit. Quare & illita rubricat: & ex
ulcerat si diutius hæreat. Quin etiam humida, crassa, et
lenta, ex thorace & pulmone excreatu facilia facit, mē
sesq; mouet.

Glechon.
Pulegium.

MGlæos, strigmenta balneorum.
Modicè emolliendi uim obtinet;

Glæos.
Strigmenta.

Glycyrrhiza, Dulcis radix.

SImiliter radici ipse succus, dulcis leuiterq; astrin
gens existit: Proinde nō modò asperæ arteriæ, sed
uesicæ etiam scabritiem lenire potest, idq; temperatu
ræ mediocritate. Quare fuerit sanè natura eius familia
ris nostræ temperaturæ. Cæterum tepidam quandam
caliditatem sortitur. Porrò quoniam temperie quoq;
est humidum, id quod modicè est dulce, ure sanè etiā

Glycyrrhiza.
Dulcis radix.
Dulcis modicè
est humida.
Glycyrrhiza
fitim lenit.

Tomus IIII.

H h h h

siti congruens medicamentum est, nimirum modicè humidū, humanaq; natura frigidius. Dioscorides ait, are factæ radicis pollinem unguibus oculorum mederi.

Glycyfida. Pœonia.

Glycyfoda.
Pœonia.

R Adicem habet leuiter astringentem, cum quadā dulcedine: at si plusculū dentibus mandas, acrimoniam item quampiam subamaram subesse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato, amygdali pota quantitate. Expurgat porrò etiam iecur obstructum, & renes: uentrisq; sistit fluxiones, si in aliquo austero uino cocta sumatur. Est præterea omnino resiccatoria: quare ex collo pueris suspensa, meritò comitialē morbum persanat: idq; aut aliquem à se fluorem, per infantuli inspirationem imittens: aut aerem assidue mutās, atq; alterum reddēs. Nam hoc pacto succus Cyrenai: cus columellam phlegmone affectam iuuat: & melanthium frictum palam catarrhos & coryzas desiccatur, si quis id in calidum lintheum rarum liget, assidueq; calorem ex eo per inspirationem in nares attrahat. Quin etiam si compluribus linīs, & maximè marinæ purpuræ, collo uiperæ iniectis, illis uiperam præfoces, eaq; postea cuiuspiam collo obuincias, mirificè profueris, tum paristhmijs, tum omnibus ijs quæ in collo expulsiuant. Pœonia itaq; & exiccat, & tenuium est partiū: calfacit autem mediocriter.

Pœonia appē-
sa comitiale
morbum per-
sanat.

Cyreniacus
succus.
Melanthium,

Vincula qbus
præfocaueris
uiperam, con-
ferre tumori-
bus gutturis.

Gnaphalium.

Gnaphalium.

Folia eius modicè astringunt: quare ex aliquo uino austero dysentericis prosunt.

Gongilis, Rapum.

Gongilis.
Rapum.

Gongilidis semen uenerè excitat, utpote spiritum flatuosum gignēs. Sic & radix coctu difficilis est: inflatq; & semen generat.

Damasonium, Alisma.

Damasonium,
Alisma.

Decoctū radicis eius calculos renum cōminuit. Quare absterforiæ facultate est particeps.

Daucus, Staphylinus.

D Omesticus esui aptior, sed imbecillior, acrem calidamq; facultatē sortitur; ac proinde etiam extenuat. Ac radix sanē flatuosum quid obtinet, ac uenerum. Semen autem, domestici quidem, et ipsum quādam ad uenerem ciēdi potentiā possidet; agrestis uerò planē flatu caret; ac proinde urinam mensesq; ciet.

Daucus.
Staphylinus;

Dauci semen.

A Deo uehementer excalfacit, ut inter prima, tum urinam, tum menses prouocet. Multum etiam digerere per halitum foris impositū ualet. Ipsa uerò herba, moderatē calida est, similemq; etiam uim obtinet, cæterū infirmiore.

Dauci semen.

Daphne arbor, Laurus.

H Vius folia calfaciunt & siccant uehementē: at fructus adhuc uehementius. Radicis cortex minus quidem acris est & calidus; cæterū plus amarus: habetq; etiam astrictiōis nonnihil. Quamobrem & calculos confringit, & iecori prodest. Bibitur ex uino fragrante trium obolorum pondere.

Daphne.
Laurus.

Daphne herba: quā Alexandrinam appellant.

E Vidēter est calida, acris, & subamara, potaq; tum urinas, tum menses prolicit.

Daphne herba.

Chamædaphne.

P Er similis quidem est uiribus daphnæ Alexandrinæ: sicuti & quod daphnoides uocant.

Chamædaphne.

Dictamnū.

T Enuiori essentia constat quā pulegium, cætera illi simile. At pseudodictamnū ad omnia imbecillius existit.

Dictamnū.

Dipsacos.

D Ipsaci spinæ radix ex secundo ordine exiccatoria est, habetq; nonnihil & absterforium.

Dipsacos.

Dorycnidion.

A Quea excellit frigiditate. Quamobrem, paucū.

Dorycnidion.

Hhhh ij

lum quidem, soporem conciliat; plusculum uerò sumptum, perimit.

Dracuntium.
Dracunculus.

Dracuntium, Dracunculus.

Quidam aro persimile obtinet, tum folijs, tum radice. Cæterum illo acrius est, & amarius; ac proinde calfactorium magis, et tenuioribus partibus. Habet etiam & astrictiōem leuiculam. Radix omnia uiscera expurgat, optimumq; remedium est contumacium ulcerum. Verum extergit etiā cætera omnia quę extersionem desiderant. Folia præterea similem facultatem sortiuntur, ob idq; si sint uiridia, recentia uulnera glutinant. Fructus ualentior est, non folijs tantū, sed radice. Itaq; & cancos, & polypodas credit eliquare. Succus eius quoq; uitia oculorum expurgat.

Dryopteris, Filicula.

Dryopteris.
Filicula.

DUlcis, acris, amara, & in radice etiam acerba existit. Habet autem facultatem putrefaciendi; proinde pilis glabram cutim efficit.

Drys, Quercus, Robur.

Drys.
Quercus.
Robur.
Fagus.
Ilex.

EXiccandi astringendiq; possidet facultatem, cum mediocri quadā tepidāq; caliditate. Cæterū plus cæteris eius partibus astringit quę in trunci cortice membrana subest: tū quę ipsius fructus conuestit carnem. Quamobrem ad pfluuium muliebre, sanguinis expuitiones, dysenterias, & diuturnos uentris fluxus, eam esse credunt accommodam. Valētius tamen astringunt fagus & ilex. Quarum plantarum folia tenella illita non instrenuē desiccant, necnon uulnera glutināt. Eandem folijs uim habet & fructus roboris: eoq; Medici nonnulli utuntur ad incipientes atq; crescentes phlegmonas.

Ebiscus, Althea, Agrestis malua.

Ebiscus.
Althea.
Malua sylue.
Aris.

Facultate digerendi, laxandi, phlegmone liberandi, mitigandi, & concoquendi difficiles coctu affectus est pedita. Cæterū radix & semē q̄ folia, & tenuiorum

sunt partium, magisq; exiccatoriam & extersoriam facultatem ostendunt: ut & uiligines detergant, & seminum calculos frangant. At radices decoctum, ad dysenteriam, diarrhoeam, et sanguinis reiectionem est aptum: quum nimirum etiam nonnihil astringant.

Ebenus.

EX his lignis est, quæ trita in aqua soluuntur. Vis ei Ebenus.
inest excalfaciendi, extergendi, & tenuium partium. Quamobrem, quæ pupillas offuscant extergere credit: misceturq; alijs ocularibus medicamentis.

Elæa, Olea.

Oliuæ rami quantum habent astrictionis, tantæ sunt Elæa.
Olea.
frigiditatis participes. Fructus uerò, si quidē ad unguem maturuit, moderatè calidus est: sin imaturus, magis, tum astringit, tum refrigerat.

Elæon, Oleum.

Oleum quod ex oliuis exprimitur, humectatorium Elæon.
Oleum.
esse & moderatè calidum, iam supra docuimus. Eiusmodi est, quod est dulcissimum: fitq; potissimum ex oliuis quas druppas appellant. Cæterum quod omotribes & omphacinum nuncupant, quale ab Hispania uehitur, id quantum in se habet astrictionis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Porro oleum uetus, quod quidem ex dulci inueterato efficitur, & calidius est, & potentioribus ad euaporandum uiribus: quod uerò ex crudo, id, dum reliquum quippiam seruauerit astrictionis, miste permanet facultatis: ubi uerò illam prorsus abiecerit, reliquo euadit simile. Quinetiam, quicumq; in præparando ramos iniiciunt, ij omphacino simile oleum efficiunt. Porro qd oleum lotum minimè omnium mordacitatem contineat, supra etiam traditum est. Sunt autē Oleum lotum
ē minime mordicans.
uaria oleorum genera: quibus sanè cicinū & tenuius, & ad discutiendum potentius est, qd simillimum oleo ex oliua uetusto. Raphaninū autem, cætera huic est simile, sed calidius tamen. At hoc etiam calidius sinapi.

H h h h i j

num: cui simile est quod est melanthio conficitur. Pu-
gnant cum istis myrtinum & sesaminū, tum q̄ astrin-
gant, tum q̄ crassarum sint partium. Mistæ facultatis
est lentiscinum, terebīthinū, & mastichinū. Nō enim
tantū emolliunt, sed & astringunt. Amygdalinum
porrò amaritudinem exuperantem possidet, cæterū
cuiusdam astrictionis est particeps: nō tamē caryinū,
sed id uel maximè simplicis est digerēdi facultatis. Ca-
lidius eo est laurinum, & hoc etiam magis, cedrinum.
Proximum ei est quod ex nigra pice conficitur. Da-
dinum, minus quidem laurino calidum, uerū ualen-
tius desiccans. Hyoscyaminum uerò mistæ facultatis
est, emolliendi uidelicet, ac refrigerandi. Oleum porrò
cicinum, uentrem subducit. Hoc uerò magis, quod fit
ex gnidio grandē. Quod ex agresti oliua exprimitur, ex-
tergit, simulq; astringit. Squalidissimū enim id est ex
omni olei genere, & post, istricum quoq; deinceps il-
lis Hispanum. Pinguis simum est Zibicum, et Ciliciū:
simul autem pingue & tenue, Sabinum. In medio cō-
prehētorum omnium sunt, tum id quod per cyclades
insulas nascit, tum quod per Græciā, Asiāq;: Etenim
oleum pingue æstimatur uiscositate: tenue uerò, si pel-
luceat, si purum sit, si plurimum minima eius portione
inungatur, si facile à cuti cōbibatur. Omne autem oleū
pro cuiusq; iniectorum natura uariari contingit.

Oleū pingue,
tenueq; qua ra-
tione æstimat.

Elatine.

Modice tum refrigerat, tum astringit.

Elatine.

Excalfacit et tenuium est partium: ob idq; exiccat,
maximè in secundo ordine.

Elenium, Enula campana.

Elenium.
Enula campa-
na.

Radix eius calida & sicca est cum recrementitio
humore. Quare ele gmatīs quę faciunt ad educē-
dos crassos ex pectore succos, idoneè miscetur. Iuuat
etiam ad rubrificandas partes uexatas frigidis diutur.

nisq; affectibus.

Eleliphacos, Saluia.
Videnter excafcit, ac leuiter fubastringit.
Helleborus, Veratrum.

Eleliphacos.
Saluia.

TAm albus q̃ niger helleborus extergentis calfa-
cientisq; eft potentia. Quamobrem ad alphos, li-
chenas, pforas, leprasq; accommodi funt Quinetiam
niger fi in fiflulam callo indurata infundatur duo-
bus tribus ue diebus, callum detrahit. Dentibus pro-
deft cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordi-
ne excafcientium & deficcantium. Porro niger guftu
calidior eft: candidus amarior.

Helleborus.
Veratrum.

Elxine, quam Parthenium uocant.

Aftergit, constringitq; cum humiditate fubfrigi-
da: unde phlegmonas incipientes ufq; ad augmen-
tum sanat: maxime fi calida fuerint. Incipientibus etiā
phygethliis cataplafmatis ritu illinit: ad auriumq; do-
lores phlegmonofos fuccus eius inflillatus, ficuti ad
parifthmia gargariza us concludit.

Elxine.
Parthenium.

DElxine, quam ciffampelon uocant.
Igerendi obtinet facultatem.

Elxine altera.
Ciffampelos.

Elynus, Meline, Panicum.

Facultate pauci nutrimēti eft, & exiccatoria. Siftit
nonnihil uentris fluxus, ut milium. Si uerò foris il-
linatur, exiccatur atq; refrigerat.

Elynus.
Meline.
Panicum.

Empetron.

Ad folas purgationes efle uidetur commodum,
bilem ac pituitam educens: iuuat tamen ad alia,
guftu falum exiftens.

Empetron.

Epithymum.

Thymi facultatē habet, ad omnia efficacius. Exic-
cat & calfacit in tertio gradu.

Epithymum.

Epimedium.

Re frigerat moderatē, cum aquea humiditate. Vbe
ribus illitum, furrecta ea feruare poteft. Aiunt ue

Epimedium.

H h h h i i j

rò si potu hauriatur, sterilitatem parere.

Epimelis, Pomus syluestris.

Epimelis.
Pomus syluestris.

FRuctus eius acerbus est, stomacho tamen ingratus, & capitis mouens dolores.

Erebinthus, Cicer.

Erebinthus.
Cicer.

LEgumen est flatuosum, copiosi nutrimenti, alio mouendæ habile, ciendæ urinæ idoneum, lacti & semini generando aptum. Prolicit uerò & menses. Cæterum quod arietinum dicitur efficacius urinam prouocat: cuius decoctum renū calculos frangit. Reliquū erebinthorum genus eadem ui pollet, puta attrahēdi, digerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi & modicè sicci: participes item amaritatis: cuius ui & lienem & iecur, & renes expurgāt: psorasq; & lepras, & lichenes extergunt: tum parotidas & testes induratos discutiunt: tum ulcera maligna cum melle sanant.

Erebinthus agrestis.

Cicer agreste.

CAlidior & ficior domestico est, quātò et acrior, & amarior existit.

Erice.

Erice.

DIgerendi per halitum facultatem obtinet: sed præcipuè flore eius ac folijs utendum.

Herpyllus, Serpyllum.

Herpyllus.
Serpyllum.

VSq; adeò calfacit, ut urinas & menses moueat. Estq; & gustu admodum acre.

Erysimum

Erysimum.

Semen eius igneum est, & calfactorium. Vtile est cum elegmatis ad promouendas crassorum expectores expuitiones. Quin & parotidas induratas, & duritias antiquas uberum et testiculorū, iuuat: & ut Dioscorides ait, etiam occultos cancos.

Erythrodanum, Rubia passua.

Erythrodanum.
Rubia tinctorum.

Est autem tinctorum rubia radix acerbata et amara. Quare lienē, & iecur expurgat: & urinas, crassas, multas, & interdum sanguinolentas promouet. Quin

& menses ciet, extergitq; mediocriter. Proinde uutiligines albas cum aceto illita iuuat.

Eupatorium.

Tenuium est partium, incidendiq; & extergendi tuum, citra manifestam caliditatem, obtinet: quocirca obstructions iecoris aperit. Inest ei quædam etiam astrictio, per quam robur uisceri addit.

Eupatorium.

Euphorbium.

Ventem & tenuium partium facultate sortitur.

Euphorbium :

Ephemeron, Iris agrestis.

Astringit quidem, estq; suavis odoris. Quare et repellit, & per halitum digerit. Non inefficaciter autem radix eius in dentium dolore colluitur. At folia coctam in uino, phymatum augmento & statui congruunt.

Ephemeron.
Iris agrestis.

Echinus herba.

Fructus eius acerbus est, atq; iccirco repellentis facultatis & exiccatoriae. Utuntur eo ad oculorum aurumq; fluxiones.

Echinus herba.

Zeia, Spelta.

Vniuersa sua facultate, quodammodo in medio est tritici & hordei.

Zeia.
Spelta.

Zingiberis radix.

Excalfacit, sed non primo statim occurso, ueluti piper: unde sanè & minus esse subtilium partium, quæ piper, exstimanda. Etenim illaboratam quandam, & crassam retinere in se uidetur humiditatem: quemadmodum piper longum. Quare diutius perseverat quæ profiscitur à Zingibere, aut pipere longo caliditas, quamquæ ab albo, aut nigro. Porro ubi totum corpus celerrimè calfacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt, quæ & celerrimè à caloris nostri contactu incalescant, & promptissimè undequaq; ferantur. Verum ubi partem quauis refrigeratam recalcere studemus, contra agendum: nimirum quæ tardè calescentia, plurimo tempore perdurent, ea præbendo.

Zingiberis radix.

Cæterum licet zingiber & piper * longum hac ratione à nigro pipere differant, non magna tamē est differentia. At nasturtium, napy, thapsia, & agrestium columbarum stercus, maiori tempore perfectē accenduntur, & plurimo tempore perdurant.

Zythus.

Zythus.

Non parum est acrior hordeo, succiq; pravi, quā ex putredine oriat. Est et flatuosus: ac ptim acis & calidus: pte uerò plurima frigidus, aqueus, acidus.

Zyme, Fermentum.

Zyme.

Fermentum.

Tenuum est partium, & mediocriter calidum: p inde citra molestiam quæ in pfundo sunt extrahit & digerit Particeps autem est aciditatis cuiusdam frigida, & caliditatis ex putredine natæ. Cui accedit ea quæ à sale est, * & quæ etiam à farinæ natura.

Hedyosmos, Menta.

Hedyosmos.

Menta.

Tam menta, q̄ calamintha, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio calfacientium ordine. Iniriormior tamen est menta, & minus excalfacit: cæterum mediocriter ad uenerem excitat: id quod omnibus accidit, quæ humiditatem semicoctam & flatuosam continent: At calamintha, quum ualētius calfaciat & excitet, habet etiam quiddam amarum in se, atq; acerbū. Quare illo quidem lumbricos perimit: acerbitate uerò, si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimit. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuium partium.

Hedysarum.

Hedysarum.

Huius semē amarum & subacribum apparet: ob idq; potum stomacho gratum existit, uiscerumq; obstructions expurgat. Idem præstant totius fructus germina.

Hemerocalles.

Hemerocalles.

Radicem habet liliij radici similem, & figura & uiribus: prodestq; ut illa, ignis ambustis, nimirum

tum leuiter digerens, tum nō nihil astringens.

Hæmionitis.

A Strictionem simul & amaritudinē possidet. Quā obrem cum aceto pota lienosis auxilio est. Hæmionitis.

Herigeron.

R Efrigerat & modicè digerit. Herigeron.

Heryngion.

C Alore quidem est temperatum, nō paruam tamē siccitatem sortitur consistentem in tenui essentia. Heryngion.

Thaliëtrum.

F Olia habet coriandro similia: caulem crassitudine rutæ. Vis eis inest citra morsum exiccatoria. Itaq; ulcera inueterata ad cicatricem perducit. Thaliëtruni.

Thapsia.

A Crem habet ac ualenter excalfacientem facultatem cum humiditate coniunctam. Quare ex alto uiolenter extrahit, & quod extraxit, digerit. Celeriter tamen corrumpitur. Thapsia.

Thermus, Lupinus.

P Remaceratus aqua, amaritudinem exuit, ediq; potest, sed nutrimentum fit crassi succi. Vbi uerò natua etiamnum amaritas permanet, extergendi, digerēdiq; uim obtinet. Interficat autem lumbricos, tum illitus, tum addito melle linctus, tum ex posca epotus. Quin & decoctum eius lumbricos ejicere potest: tum etiam foris identidem perfusum, uirilignes, achoras, exanthemata, pforas, gangrænas, malignaq; ulcera, iuuat. Expurgat iecur & lienem cum ruta & pipere suauitatis gratia sumptum. Elicit menses & foetum cum myrrha & melle impositum. Lupinorum porro farina, etiam sine mordicatione digerit, nec liuida tantū sed & chæradas & phymata curat, si in aceto, aut oxy melite, aut posca coquatur. Lupinorum farina qbus morbis medeat.

Thermos agrios, Lupinus agrestis.

A Marior est, & ad omnia ualentior domestico, Lupinus agrestis.

eiusdem genere cum ipso facultatis.

Thlapsi.

Thlapsi.

Semen eius facultatem acrem sortitur, adeo ut iter nos abscessus potum disrumpat. Menses ciet, & foetum enecat Per sedem infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest: euacuatq; supernè & infernè bilem oxybaphi mensura epotum.

Thridax, Lactuca.

Thridax.

Lactuca.

Humida & frigida est, secundum aquae fontanae frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas, & ad parua & leuia erysipelata, est comoda: propterea restinguit sitim. At semen potum, geniturae profluuium cohibet. Sic & agrestis lactucæ semen. Cuius holeris colligitur succus, argemas & caligines purgans, inungitq; ad adustiones cum lacte muliebri solitus.

Thymum.

Thymum.

Incidit & calfacit uehementer, ob idq; urinam & menses prouocat, foetum euellit, potum uiscera expurgat, educendis ex thorace & pulmone confert, ac deniq; excalfacit exiccatq; in tertio ordine.

Idæa radix.

Idæa radix.

Admodum gustu est acerbæ. Quare sanguinis effusiones, lienterias & dysenterias, mensesq; fluctes supprimit, tum pota, tum etiam admota extrinsecus.

Ixos, Viscum.

Ixos.

Viscum.

Ex plurima aerea & aquea, paucissima terrena substatia constat. Quare ex alto humores extrahit eosq; diffundit et digerit. Tempus aut ut calfiat postulat.

Ios. Viola.

Ios.

Viola.

Violæ folia aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident. Proinde tum per se, tum cum polæta illita, calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori uentriculi æstuanti, & oculis.

Hippuris.

Cauda equina

Hippuris, Cauda equina.

Astringentem cum amaritudine facultatem pos-

fidet, ac proinde ualenter exiccantē, sed citra morsum. Itaq; uulnera etiam maxima glutinat, uel si perfectos esse nervos cōtigerit. Præterea uocatas enterocelas glutinat: necnō sanguinis reiectiones, fluētes menses, dysenterias, cæterosq; alui fluxus coercet. Succus uerò eius pdest sanguinis eruptioni per nares, et fluxui obnoxiijs in uētre passionibus, ex austerorum uinorū quopiam epotus: ac si febre teneantur, ex aqua.

Hippomarathrum.

V Nā cum foeniculo & de ipso differemus.

Hippomara-
thrum.

Isatis.

D Omestica quidē qua utuntur tinctorēs, facultas est ualenter exiccātis, nondū tñ mordentis: est enim simul amara & astringens. Proinde magna uulnera corporum durorum glutinat: & sanguinis profluuiο laborantibus partibus utiliter illinitur, tumores laxos mirificē digerit, simul ac reprimat, & aduersus omnia maligna ulcera mirabiliter resistit. At isatis syluestris manifestē iam acré quiddā, tum gustu, tum actione præfert. Proinde q̄ domestica magis desiccans, ualentius etiam putredinibus obfistit: ad cætera iam cōprehensa deterior.

Isatis.

Isopyron, Phasiolon.

S Emen habet amarum & subacerbū. Extergit itaq; & incidit humores crassos, cum hoc ut corpora cōtrahat, & stringatq; . Quare excreationibus pectoris cōfert, & iecur expurgat; crediturq; iuuā hemoptoicos.

Isopyron.

Phasiolon.

Itea, Salix.

S Alicis folijs ad cruenti uulneris glutinationem uti possis. Verūm floribus eius maximē ppe omnes utuntur ad exiccantis emplastri præparationem. Est enim uis eorum ita desiccatoria, ut morsu abstineat. Habet uerò etiam quandam astrictionem. Porro succus expressus medicamē exiccatoriū existit, expersq; mordacitatis. Nec enim inuenias aliquod medica-

Itea.

Salix.

Salicis corticis
cinere macera-
to in aceto cal-
los atq; myr-
mecias exteri.

men ad plures res utilius eo, quod citra mordaci-
tatem exiccat. Arboris cortex similem facultatem
obtinet, tum floribus, tum folijs, nisi q; tēperaturā sic-
cioris existit, ueluti omnes cortices. Etenim cinere
corticis macerato in aceto, nonnulli callos atq; myr-
mecias tollunt.

GALENI PERGA-

MENI DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber VII.

Calamintha.
Nepita.



Calamintha, Nepita.
SSENTIA quidem est tenui, tem-
perie autem calida & sicca, quodāmo-
do in tertio ordine. Est enim acris gu-
stu, paulumq; amaritudinis obtinet.
Extrinssecus admota, primū quidē
ualde excalfacit et mordicat, cutemq;
exugit: postremò etiam ulcus efficit. In corpus autem
intrò assumpta, tum ipsa per sese sicca, tum etiam cum
melicrato, perspicuò calfacit, atq; sudores ciet, omneq;
corpus tum digerit, tum exiccat. Idcirco ea cōtra rigo-
res repetētes per circuitum nonnulli utuntur, sicuti &
cōtra ischiadicos morbos. Trahit enim que in profun-
do hærēt ad superficiem, totumq; adeò articulū excal-
facit, & cutem non obscure adurit, mensesq; tum epo-
ta, tum apposita, admodum efficaciter prouocat, ac de-
niq; elephāticis etiam probè auxiliatur. Præterea cica-
tricibus atris candorē restituit, & sigillata digerit. Præ-
stat autem in huiusmodi, ubi in uino decoxerimus, ip-
sam emplastri ritu apponere, & uiridem magis q; sic-
cam. At sicca, ad uenenatarum bestiarum morsus as-

sumitur, ueluti etiam cauteria, & quæcūq; medicamēta calida sunt & acria. Succus eius aut infusus, aut epotus, ascaridas, lumbricos, & auriū uermes, enecat. Sic & conceptum interimit, eiectq;. Igitur incidendi quidem ei uis adest, ob calorem, tenuitatē, amaritudinē: abstergendi uerò propter solam amaritudinem. Quare Asthmaticis atq; ictericis cōuenit. Ad omnia tamē dicta, montana efficacior existit.

Calamus odoratus.

LEuiculam quādam astrictionem, ac minimā acrimoniam possidet. Siquidem magna ex parte essentia quidem eius terrena est, & aeria: temperies autem, calida & sicca in secundo excessu, nisi q; ualentius deficcet. Porrò moderatē mouet urinam: ac facultatibus quæ iecori stomachoq; imponuntur, necnon ijs fomentis quæ inflāmato utero, aut mouēdis menstruis administrantur, cōmodissimē potest misceri.

Calamus odoratus.

Calamus phragmites, Canna.

RAdix eius cum bulbis aculeos stipitesq; infixos extrahere ex alto traditur. Etenim abstergentem, minimeq; acrem facultatem sortitur, quemadmodum & ipsa folia. Cortex uerò cōbustus, admodum tenuiū partium, & digerentis facultatis efficitur, cum nonnulla abstersione, ut exiccet & calfaciat tertio quodāmodo ordine. Cæterū eius flos est uitandus. Nam si in aures incidat, adeò tenaciter hærens affigit, ut auelli non possit, auditumq; uitiat.

Calamus phragmites.
Canna.

Calami flos uitiat auditum.

Cancanus, Cacalia.

RAdix cancani, crassam, emplasticamq; & exiccātem habet essentiam, sed mordacitatis expertē. Quare macerata uino sicuti tragacantha, & lincta, aut cōmansa, arteriæ asperitates sanat.

Cancanus.
Cacalia.

Cannabis.

CAnnabis semē adeò flatus discutit, exiccatq;, ut si largius edatur, genituram absumat.

Cannabis semen.

Capnios, Fumaria.

Capnios.
Fumaria.

A Cris, amaræ, & acerbæ qualitatis est particeps, Quamobrem urinam biliosam, multamq; provocat; sanatq; tum obstructions, tum imbecillitates iecinoris. Succus eius oculorū aciem acuit, non parū trahens lachrymarum, ueluti ipse fumus.

Capparis.

Capparis radi-
cis cortex itus
foris adhibitus
quæ molitur.

C Apparis radicis cortex uincentem habet qualita-
tem amaram, proximam acrem, deinde acerbā.
ob idq; pugnantibus facultatibus cōstat; qppē abster-
gere, purgare, icidere, potest amaritudine: ex calfacere,
incidere, digerere, acrimonia; cōtrahere, dēfare, & strin-
gere, acerbitate. Quare lienes induratos, si quid aliud,
maximē potest iuuare: tum foris medicamentis quæ il-
linunt admistus, tum intra corpus assumptus, siue de-
coctus in aceto, oxymelitē ue, siue cōtus atq; illis p-
mistus. Quum nimirū crassos lentosq; humores aper-
tē hoc pacto sumptus euacuet; nec eos tantū per uri-
nas, sed per uentrem etiam sæpe sanguinolētos defert:
unde & lienes adiuti sunt, & coxarum dolores. Quin
etiam menses promouet, ex capite purgat, auxiliatur
ruptis atq; conuulsis, nec non malignis ulceribus, cata-
plasmatis modo impossius. Præterea dentium dolores
adiuuat, interim cum aceto coctus, interim cum uino,
sæpe solus dentibus mansus. Ad hæc uiligines cum
aceto detrahit, & choeradas, & duros tumores digerit,
idoneis ad eas medicamentis mistus. Radicis cortici
fructus proportionē respondet, nisi q̄ ad omnia sit im-
becillior. Imò & folia, & caules similem etiā uim obti-
nent. Admiscemus tamē illis aliquid, qđ eorum uehe-
mentia obtundat. Nec mirum est, q̄ aurium uermes
sua perimant amaritudine.

Capparis fru-
ctus & folia.

Cardamum, Nasturtium.

Cardamum.
Nasturtium.

N Asturtij semen adurētis facultatis est particeps,
ueluti napy. Proinde omnia quæ rubrificationē
postulant

postulant, eo excalfaciunt. Miscetur quoque remedijs, quæ exhibentur asthmaticis, tãquam ualenter crassos succos incidere ualeat. Porro & herba arefacta semini similem facultatem sortitur. Nam quæ humida est et uiridis, multis numeris inferiorem.

Cardamomum.

Q Vanto suauius magisque fragrans nasturtio est, tãtò & imbecillior ei calida facultas inest. Nec enim ulcerare est idoneum. Habet autem adiunctum quiddam amaritudinis, qua lumbricos interficit; & cū aceto ualenter psoras detergit.

Cardamomum.

Caron.

C Ari semen calfacit & exiccat tertio quodammodo ordine, moderatè acrem possidens qualitatem. Itaque & flatus extinguit, & urinas ciēt, tum semē, tū planta.

Caron.

Casia.

E Xiccat et calfacit tertio quodammodo ordine, sed & tenuium admodum partium est, habetque acrimoniae plurimum, ac leuiter nonnihil astringens. Incidit itaque simul & digerit, roburque instrumentis addit. Quare mensibus est mouendis idonea, ubi à copia simul & crassitudine illi suppressi fuerint.

Casia.

Carya, Nuces.

A Rbor tum in folijs, tum in germinibus astrictio- nem quandam possidet, cæterum euidentem multamque in nucis putamine recenti pariter & sicco. Eius autem succo expresso, ac melle decocto, nos uice stomachici medicaminis utimur. Oleum quod ex fructu elicetur inueterato, admodum per halitum digerit. Quare nonnulli eo gangrænas, carbunculos, & cegilopas sanant. Sunt qui ad neruorum uulnera utantur. Cæterum si recens sit, astringentis nonnihil qualitatis obtinet. Nucleus arefactus & uustus, tenuium partium & exicatorium citra morsum est medicamen. At pontica nux, quam λεπτοκάρειον & auellanā appellāt, plus habet es-

Carya.
Nuces.

Nux pontica.
Auellana.

Tomus IIII.

Iiii

sentiaē terrestriſ ac frigide. Itaq; auſterior tum cortex,
tum planta, tum fructus apparet.

Caucaliſ.

Caucaliſ.

EXcalfacit & deſiccāt. Præterea urinam ciet, mu-
riq; ad repositionem conditur.

Carpesium.

Carpesium.

Simile eſt ualerianæ, tum guſtu, tum facultate. Sed
plus habet tenuitatis. Proinde magis ea uiſcerum
obſtructiones extergit, urinam mouet, renesq; calcu-
lis deſcrauat expurgat.

Cenchrum, Milium.

Cenchrum.

Milium.

Primo ordine refrigerat. Exiccat uerò tertio exolu-
to, aut certè ſecundo intèſo. Paululum etiam tenui-
tatis ſortitur. Quibus de cauſis inter omnia frumenta-
ria edulia minimum nutrimenti largitur. Ventrem ta-
men deſiccāt, forisq; admotū in ſacculis, idoneū fomē
tum eſt ijs quę citra morſum exiccati poſtulant.

Cedrus.

Cedrus.

Cedrea.

Cedrus ſpecie eſt duplex: altera fruticoſa iunipero
aſſimiliſ: altera arbor non exigua. Vtraq; eſt cali-
dæ ſiccæq; temperaturæ tertij quodammodo ordinis
ſecundum utruq;. Ceterum cedrea (uocatur ita cedri
oleum) quartum etiam ordinem attigiffe uidet, admo-
dum calida & tenuium partium. Quare mollem uiuen-
tium carnem promptè, citraq; dolorem putrefacit. Nā
mortuorū corpora exiccat, ſimulq; à corruptione tue-
tur: utpote humiditates eorū depaſcens: at ſolida haud
quaq; attingens corpora. Nec mirum uideri debet, ſi
quā tanta ui polleat, lendes, pediculos, tineas, aur iūq;
uermes interficere ualeat: tum foetum uiuentem quidē
interimat: extinctum autem eiſciat: quemadmodū &
ipſum ſemen, ſi coeundi tempore, pudendo ea circūli-
natur. Proinde partui aduerſum eſt medicamē. Quod
etiam dentium foraminibus inſtillatum, eos & cōſtrin-
git, & à dolore liberat. Extenuat quoq; oculorum cica-

trices, & uisus hebetudini ab humorū crassitudine or-
te medetur. Utuntur autem ea plebei, quum ad uulne-
ra ouibus inter tondendū à forfice illata, tum etiā con-
trā ipsarum scabiem & ricinos, quos κρότωναs uocāt.
At fructus moderatiores existūt, adeò ut comedi pos-
sint. Quanq̃ si ijs liberalius utare, capiti dolorem infe-
rent, ardoremq̃; ac morsum in uentre percipies.

Centaurium maius.

R Adix eius gustui acris simulq̃; astringens appa-
ret, cum leuicula quadam dulcedine. Quòd uerò
ad actiones pertinet, menses prouocat, uiuum foetum
extinguit, extinctumq̃; propellit. Præterea ulcera glu-
tinat, sanguinemq̃; reſcientibus prodest. Exhibentur
autem eius binæ drachmæ, febrientibus quidem cum
aqua: feбри uerò liberis, cum uino. Quinetiam ruptis,
conuulsis, dyspnœæ, inueteratq̃; tusſi est auxilio. Eadē
quæ radix, & succus ipsius præstat.

Centaurium minus.

H Vius radix planè inefficax est: at caulis & folia, et
flores, utiliora sunt. Vincit enim in eis qualitas
amara, paululum habēs & astrictionis: ob idq̃; admo-
dum exiccatorium est medicamen, expers mordacita-
tis. Ulcera itaq̃; magnæ herbæ ipsius recētis illitu glu-
tinantur: & ue uſta, quæq̃; egrè ad cicatricem perducī
queunt, cicatrice obducuntur. Arefacta uerò glutina-
torijs & desiccatorijs miscetur facultatibus. Miscetur
etiam ijs quæ rheumaticis medētur affectibus. In qui-
bus ea medicamina præstantissima sunt, quæ uehemē-
ter desiccantia cum quadam astrictione nullam habēt
mordacitatem. Decoctum herbæ quidam infundūt is-
chiadicis, ceu biliosa & crassa extrahens: nam & talia
purgat. Succus eius præter dicta, cum melle oculis illi-
nitur, mensesq̃; & foetum euocat. Iecinoris quoq̃ ob-
structiones optimè aperit, bonumq̃; durato ſſieni est
remedium, & impositum foris, & bibitum.

Iiii ij

Cedri fructus.

Centaurium
maius.Centaurium
minus.

Cerasia.

Cerasia.

Cerasi gūmi.

QUæ dulcia sunt, magis aluum subducūt, sed minus grata stomacho sunt. Austera uerò, cōtrario modo. At acida, pituitosis excrementosisq; stomachis sunt idonea. Siquidem austeris magis exiccant, & nonnihil etiā incidunt. Ipsius arboris gummi, arterias asperas lenit, calculisq; uexatos adiuuat,

Ceratonia.

Ceratonia.

EXiccantis astringētisq; facultatis est, tum arbor ipsa, tum fructus. Qui quidem si sumatur humidus, magis uentrem subducit; si autem siccus, magis eundem sistit.

Cestrum, Betonica, Psychotrophon.

Cestrum.
Betonica.
Psychotrophon.

Vim habet incidendi, ut gustus indicat. Est enim subacris & amariuscule. Quare calculos renum frangit; pulmonem, pectus, & iecur expurgat: menses promouet; comitialibus prodest: rupta conuulsaq; curat, omnibusq; bestiarū moribus illita auxiliatur. Postremo acidū ructantibus & ischiadicis, bibita pdest.

Cecis, Galla.

Cecis.
Galla.

QUæ omphacitis dicit, admodum acerbum est medicamen, pleraq; sui parte essentiae terrenae & frigide, per quā desiccatur, repercutitq; fluxiones. Esto uerò tertij in desiccando, secūdi autē in refrigerando ordinis. Altera autē galla, flaua illa & magna, laxaq; & ipsa desiccatur quidē, sed tantò minus, quātò minus acerbæ qualitatis est particeps. Cocta itaq; ipsa per se in aqua, aut si magis astringere uis, in uino aliquo austero, ac dein trita, cataplasma est nō instrenuum sed in flammate, procidentiq;. Gallæ combustæ, extinctæq; in aceto aut uino, sanguinis reprimendi facultatem acquirunt.

Cera.

Cera.

Inter primas quatuor qualitates mediū quodāmodo obtinet. Habet uerò quiddam crassæ essentiae & emplasticum. Quamobrem aliorum medicamentorū

materia existit. Ipsa autem per se ex genere fuerit debili-
liter concoquentiū. Habet tamē quiddam digerentis,
calidæq; potentia, quæ plurima melli inerat.

Cici Ricinus.

VT fructus eius expurgat, detergit, & digerit, sic Cici.
etiam foliū, sed undequaq; debilius. Oleū quod Ricinus.
ex semine conficitur, calidius atq; tenuius est, q̃ cōmu-
ne oleum, ac proinde potentius digerit.

Cinnamomum.

Summè tenuium est partium, atq; ex tertio ordine Cinnamomū.
calfacientium. Nihil autem æquē desiccant, eorum
que pariter calfaciūt, ppter tenuitatē essentia. At Cin- Cinnamomis.
namomis, ueluti imbecillum est cinnamomum.

Circæa.

DIoscorides ait radicem eius ex uino dulci potā, Circæa,
secundas purgare. Est enim boni odoris, & cal-
factoria. Semē autem eius in sorbitione exhibitum, ad
lactis generationem conducit.

Cisthus.

FRutex astringens est. Folia eius & parua germina Cisthus.
trita adeò desiccant, astringuntq; ut ulcera gluti-
nare ualeant. Sed flores efficaciores sunt, adeò ut cum
uino poti dysenterias, uētris imbecillitates, fluxusq; &
humiditates persanent. Cataplasmatibus ritu illiti, ulcerū
putredinosa iuuant. Desiccant enim secundo excessu.
Hypocistis multò est magis astrictoria q̃ folia, admo- Hypocistis.
dum efficax remedium ad omnes fluxionū affectus.
Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ ui-
delicet plusculo humore exoluta fuerit, robur ac firmi-
tudinem illi haud segniter addit. Quo nomine antido-
to ex uip. ris inditur.

Cisthos, Ladanum.

Primo excessu medicamen est quodammodo com Cisthos.
pletè calidum, ita ut secūdum attingat, habens etiā Ladanum.
astrictionis nonnihil. Est præterea substantia tenui, &

IIII ij

emolliens, necnon moderatè digerens, cōcoquensq;. Peculiariter igitur ad uteri uitia est aptum. Diffuentes tamen capillos retinet. Cæterum alopecias & ophthalmias sanare non potest, quòd hi affectus ualētiora medicamenta desyderent.

Cissos, Hedera.

Cissos.
Hedera.

EX contrarijs facultatibus cōstat. Habet enim qdādam astringentis substantiæ, quæ terrea & frigida existit: habetq; nonnihil acris, quam calidam esse uel gustus cōprobat: præterea si uiridis sit, obtinet etiā quandam aqueam & tepidam. Viridia igitur folia in uino decocta, grandia ulcera glutināt, malignaq; ad sanitatem reducunt. Igne factas exulcerationes cicatrice obfirmant: cum aceto decocta lienosis opitulantur. Flores autem quodāmodo ualidiores sunt. Succus medicamen est errhinō: uetustas aurium fluxiones sanat. necnon uetera ulcera tum auriū, tum narium. Lachryma hedere perimit lendes, pilisq; nudat. Adeò quippè est calida, ut etiam obscurè adurat.

Clinopodium.

Clinopodiū.

CAlfacit simulq; siccatur in tertio ordine, estq; subtilium partium.

Clematis.

Clematis.

HVius folia acrem & adurentem obtinent facultatem: adeò ut lepras excoriēt. Fuerit itaq; in quarti ordinis excalfacientium initio. Dicitur etiam Clematis illa herba, quam nonnulli polygonoidem appellāt. Quæ tantum abest ut exulceret, ut profluuijs & dysenterijs cum uino pota auxilietur, mansaq; dentium dolores mitiget, ac deniq; doloribus uteri in pello admotā sit usui.

Cnicos.

Cnicos.

CNici semine duntaxat ad purgationes utimur. Estq; tertij ordinis excalfacientium, si quis foris eo uti uolet.

Coccus cnidius, Granum gnidium.

E T ipsum quoque purgat, sed acris est, adurentisque facultatis.Coccus cni-
dius.

Coccus baphicus, Granum tinctorium.

A Stringentem simulque; amaram possidet qualitate. Vtraque sine morfu desiccatur. Proinde ad ingentia uulnera congruit, & ad neruorum uulnerationes.Coccus baphi-
cus.
Granum tin-
ctorum.

Coccymelea, Prunus.

P Runi fructus uentrem subducit, recens quidem plus, aridus minus. Minus tamen subductiua sunt. Damascena pruna istis quae ex Iberia aduehuntur. Quin et ipsae arbores fructibus proportionem respondent. Porro quorum in germinibus astrictio quaedam manifesta inesse apparet, istis decoctis, phlegmone in columella aut tonsillis consistentes idonee colluuntur. Iam uero agrestium fructus, euidenter est astrictorius, uentremque sistit.Coccymelea,
Prunus.

Colla, Glutem.

G Luten quod ad libros preparant ex similagine & garo, emplasticae, & coctoriaeque facultatis existit.Colla.
Glutem.

Colocynthe, Cucurbita.

H Vmida & frigida est in secundo ordine. Quare succus eius rosaceo mistus, aurium dolori contraesto ex phlegmone, est utilis. Praeterea restinguit sitim.Colocynthe.
Cucurbita.

Colocynthis.

G Vstu amara est, uehementerque; purgatoria facultate praedita. Ipsius uirentis succus intritus, ischiadicis prodest.

Colocynthis.

Comarus, Arbutus, Cuius fructus Vnedo.

F Ructus una cum arbore acerbus est. Est autem hic & insensus stomacho, & capiti dolore concilians.Comarus.
Arbutus.
Vnedo.

Commi, Gummi.

L Achryma est concreta in truncis arborum ipsam producentium; estque; exiccatoria & emplasticae facultatis, asperitatibusque; medetur.Commi.
Gummi.

Iiii iiij

Conia, Lixiuum.

Conia.
Lixiuum.

OMnium maximè abstersorium exiccatoriumq; est, quod ex cinere ficus & tithymallorum efficitur: fereq; putrefacientis est facultatis.

Conyza.

Conyza.

Conyza & maior & minor adsimilis sunt, tum temperaturæ, tum facultatis, gustu amaræ & acres. Luculenter autem excalfaciunt: siue quis folia cum teneris ramulis parti infricat: siue ubi oleo incoxerit, eo utatur. Siquidem rigores per circuitum redeunt, sanare tale oleum uidetur. Consimilis quoq; flores sunt facultatis. Quos quidem nonnulli ex uino propinant, ad educendos menses, atq; pellendum foetum. Est & tertium conyze genus in locis humidioribus nascens, utrisq; illis graueolentius & imbecillius. At primæ memoratæ, calfaciunt & siccant in tertio ordine.

Coriannon, Corion, Coriandrum.

Coriannon.
Corion.
Coriandrum.

HAnchorbam refrigeratoriâ esse Dioscorides perdidit, q; mista pani aut polentæ, illitaq; erysipelas curet. Quanq; certè exactum aliquod erysipelas, quod utiq; inflammatum est, & flauum, haud unq; à tali cataplasmate persanabitur: sed illud tantum quod refrigeratum iam fuerit. Coriandrum itaq; ex contrarijs facultatibus constat, plurimū habens essentię amaræ, quæ tenuiū partium est & terrena. Nec parum etiā aqueę humiditatis obtinet, quæ tepentis est facultatis. His adiunctum est quoq; astrictionis pauxillū. Quod autem longè à refrigeratione absit coriandrum, hinc constat, q; choeradas siue strumas, cum lomato discutiat: id quod nullum refrigerantium medicamentorū facere est aptum.

Coronopus.

Coronopus.

Coronopodis radix coeliacis prodesse creditur manducata.

Costus.

LEuiculam planè amaram: plurimam autem acré Costus:
& calidam in se qualitatem simul et facultatē ob-
tinet; adeò ut etiam exulceret. Quare in quibus ex cal-
facere partem quāuis, aut ex alto in superficiem extra-
here quippiam est opus, ad costum cōfugitur. Eadem
de causa urinas mensesq; puocat: & ad rupta, conuul-
sa, & laterum dolores congruit. Porrò ob amaritudi-
nem quæ illi inest, latos lumbricos enecat, maculasq;
à sole cōtractas exterit, illitus cum aqua aut melle. In-
est item flatuosa quædam illi temperiei humiditas, per
quam & uenerem excitat cum uino mulso.

Cotyledon, Vmbilicus Veneris.

HVmidam, subfrigidam, obscurè astringentem, ac Cotyledon:
leuiter amaram obtinet facultatē. Vnde refrige- Vmbilicus
rat, repercutit, abstergit, & discutit. Itaq; phlegmonas Veneris:
erysipelatodeis, & erysipelata phlegmonode persā-
nat: æstuantiq; uentriculo commodissimum cataplas-
ma existit.

Crania, Cornus.

FRuctus eius admodum acerbus est, esuiq; aptus: Cranīa:
proinde ualenter aluum restringit, quemadmodū Cornus:
& mespila. Folia quoq; & germina pacerba sunt gu-
stui, ualenterq; desiccant. Itaq; maxima uulnera gluti-
nare possunt, potissimumq; durorum corporum.

Crambe, Brassica esculenta.

DEsiccandi uim habet, tum esa, tum foris imposita: Crambe.
non tamen admodum acrem. Præterea & uulne Brassica escu-
ra glutinat, & maligna ulcera sanat, phlegmonasq; iā lentia.
induratas, atq; ægrè solubiles, necnon erysipelata id
genus, epinyctidasq; et herpes curat. Habet quiddā
etiam in se abstersoriū, quo lepras elicit. Porrò semeni
eius potum, amarum quum sit, lūbricos perimit. Eadē
facultate ephelidas, lentes, & quęcunq; modicam ab-
sterfionem postulant, adiuuat. Cineres caulium brassi-
cæ desiccant usq; adeò, ut causticæ facultatis partici-

pes esse uideantur. Quibus sanè cum adipe mistis contra inueteratos laterum dolores utuntur. Sic nāq; ualenter digerens pharmacum redditur.

Crambe agria, Brassica agrestis.

Brassica agrestis.

C Alidior sicciorq; et amarior q̃ domestica est: quā obrem nec citra noxā intra corpus sumit. Extergit autem & degerit q̃ domestica etiam ualentius.

Crambe thalattia, Brassica marina.

Brassica marina.

N On solum aluū deijcit, subsalsa & subamara exstēs, sed etiā ē ad externos corporis usus idonea.

Cratægonos.

Cratægonos

F Ructus eius & acris gustanti est, & utenti frigidus, similis milio.

Crethmon.

Crethmon.

G Vstātibz falsum est, cum paucula amaritudine: quāobrem uis eius est exiccatoria, & absterforia.

Crithe, Hordeum.

Crithe.
Hordeum.

P Rimi est ordinis in exiccando & refrigerando. Habet etiam absterfionis pauxillum. Præstat in cibofabis, q̃ flatuosam naturam exuat. Quantūcūq; enim fabas coxeris, flatuosa semper illis natura remanet. Sunt quippè crassioris essentia quam hordeum, ob idq; eo plus etiam alunt. At polenta multò plus hordeo desiccatur.

Crimnon.

Crimnon.

P LUS nutrit quā polenta, sed ægrius concoquitur. Sorbitio quæ ex eo conficitur, si ex zea fiat, leuiter uentrem sistit.

Crinos, Lilium.

Crinos.
Lilium

L Ilī flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, partim ex aquea, eaq; temperata. Quare quod ex eo conficitur oleum, digerendi, emolliendiq; citra morsum facultatem sortit; unde fit, ut uteri sit duritiēbus aptissimū. Porro radix foliaq; per se trita, desiccant, abstergunt, & digerunt

moderate. Proinde quoque ambustis competunt. Radicem ergo tostam, ac dein rosaceo contritam, ambustis quoad obducat cicatrix, imponunt: quum sit etiam ulcerum aliorum remedium. Emollit præterea uteros, mensesque prouocat. Ceterum quum aut uirilignes, aut psoram, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere uolumus, commiscemus illi aliquod aliorum medicaminum ualidius extergentium, cuiusmodi est mel. Imposuimus uerò etiam quandoque & foliorum succum cum melle & aceto coctum. Eratque respectu utriusque, portio ipsius succi quincupla. Atque itaque conficiebatur infigne medicamentum ad omnia ulcera, quæ exiccare absque morfu postulant.

Crocodilion.

Crocodilij semen acre est, atque odoratum, urinam mensesque ciens: itaque facultatem habet calidam, digerentem, & exiccantem. Succus tum caulis, tum seminis, ut quæ similis sint facultatis, nephriticos adiuuat. Radix pectoris excreationibus ualenter conducit. Trahit uerò etiam per nares sanguinem. Crocodilion.

Crocus.

Secundi quidem est ordinis excalfacientium: primi uerò exiccantiū. Proinde concoquendi quoque uim obtinet, adiuuante etiam ad id, quadam exigua astrictione. Crocus.

Crommyon, Cæpa.

Cæpa ex quarto est ordine excalfacientium. Essentia eius potius crassarum est partium. Vnde etiam hæmorrhoidas aperit, tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole albos abstergit, tum alopecij attrita pilos alcyonio citius restituit. Succus eius si suffusi sunt, aut aciem oculorum obtusam præ crassitudine humorum habent, inunctus prodest. Ob huius temperaturam tota cæpa flatuosa est, manducata. Itaque quæ temperie ficciore sunt, minus flatuum generant. Crommyon.
Cæpa.

Cyamos, Faba.

Cyamos.
Faba.

MEdiocriter exiccat, refrigeratq;. At caro eius paulum quoq; abstergentis facultatis cōtinet: sicuti putamen nonnihil astringentis. Porrò ut edulium, flatulenta est, & coctū difficilis, si quid aliud: excreationibus ex pectore & pulmone idonea. Vt medicamentū uerò, foris imposita, desiccet innoxie. In podagricis ea sæpenumero usi sumus ex aqua decocta, & ita adipi suillo admista. Ad neruorū tum contusiones, tum uulnera, farinā eius cum oxymelite imposuimus. Ad eos quos ex ictu iam occupauerat phlegmone, cum polenta. Sed & testitū & uberum aptū est cataplasma. Quo quidem & lac ipsum extinguatur, & puerorum pubes farina fabacea illita, plurimo tempore glabra pmanet.

Cyclaminus, Rapum, Tuber terræ.

Cyclaminus.
Rapum.
Tuber terræ.

Abstergit, incidit, ora uenarum aperit, attrahit, & digerit. Succus eius hæmorrhoidas reserat, uiolenterq; ad secessum puocat, in floccis appositus. Sic etiā facultatibus phymata, strumas, aliasq; durities digerentibus cōmiscetur, ac suffusis cum melle illitus comperit. Ad hæc per nares expurgat. Adeò uehemens eius facultas est, ut abdomine illito, subducatur aluum, & foetum perimat. Tota autem radix succo imbecillior est, q̄q; & ipsa uehemens satis. Nam & menses siue epota, siue apposita, euocat, & aurigini prodest. Modus eius bibendi est drachmarū trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cutem detergit, ac tū alopecias, ephelidas, omniaq; exanthemata curat: necnō auxilio est lieni indurato. Fructus etiam alterius cyclamini, quā nonnulli cyssanthemon nominant, cum uino pluribus diebus potus, sanat lienem, urinas mouens, atq; aluum subducēs. Locos quoq; eiicit, atq; asthmaticis auxiliat. Qualitas eius gustui acris est & sublentia.

Cyssanthemō.

Cyminum, Cuminum.

Cyminum.
Cuminum.

CYmini semen calfacit in tertio ordine, urinā mouet, extinguitq; flatum.

Cynos batus, Sentis canis.

H Vius fruticis fructus non segniter astrictorius est. Folia uerò mediocriter, lanugo fructus, artemuram uitiat.

Cynos batus.
Sentis canis.

Cyparissus, Cupressus.

C Vpressi folia, germina, pilulæ recentes & molles, magna ulcera glutināt in duris corporibus. Quare resiccandi uim habent absq; insigni acrimonia aut calore. Tāta enim ei acrimonia inest, caliditasq; quāta satis sit deducēdæ in altū acerbitati. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusq; affectibus humiditates, innoxie depascit et populatur. Sic enterocœlicos iuuat, exiccans, roburq; addens corporis partibus præ humiditate laxatis. Quidam ea utuntur ad carbunculos, herpesq; polentæ miscentes. Sunt qui ad erysipelata utantur.

Cyparissus.
Cupressus.

Cyperus, Iuncus quadratus.

C Yperi radices excalfaciunt pariter & siccāt absq; mordacitate. Itaq; ulceribus inueteratis mirifice profunt. Habent etiam quippiam astringens: quapropter ulceribus item oris conueniunt. Quin & incidendi uim quampiam illis inesse testificandum est, qua & calculos exterunt, & urinam mensesq; prouocant.

Cyperus.
Iuncus quadratus.

Cypros.

H Vius arboris folia summaq; germina habent in se quiddam digerēs cum aquea substantia modicè calida; habentq; & astrictionem quādam ex terrena substantia frigida. Itaq; eorum decocto quidā ambusta fouent, necnon igneas phlegmonas, carbunculosq;. Nam absq; molestia siccant. Sed sponte ortis in ore ulceribus cōmansa folia cōmodissima sunt.

Cypros.

Cytisus.

C Ytisi folia digerendi facultatē obtinent, aqueæ & temperatæ mistam, ut malua.

Cytisus.

Coneion, Cicuta.

Conion.
Gicuta.

QUod extremè sanè refrigeret, omnes norunt.
Conos.

Conos.
Strobilus.
Cocalus.

Coni fructus, quem cocalum & strobilum appellant, uiridis totus, habet cum humiditate amaritudinem quampiam & acrimoniā. Proinde purulentis, & ijs quibus facilè expuere est opus, accommodatur. Quod esculentum est, nutrimentum est coctum difficile & ualidum. Vt medicamen autem asperitati leniendæ congruit, si præmaceratus in aqua, omnem acrimoniā exuerit. Nam reliquū sic minus mordax efficitur, in medio calidæ & frigidæ qualitaris consistens: ex aquea et terrea mistū substantia, minimum participās aeris.

Lagopus.

Lagopus.

Facultatis est desiccantis, adeò ut fluxus alui probe exiccet.

Lathyrus.

Lathyrus.
Esula.

Et succo, & purgatoria ui, tithymallū refert: nisi quod semen apparet dulce, licet maximè sit purgatoriū.

Lampsane.

Lampsane.

Esa quidē succos prauos procreat. At illita, abstergendi, digerendiq; nōnullam facultatē sortitur.

Lapathum.

Lapathum.
Oxylapathū.

Digerit moderatè. At oxylapathum, nonnihil etiā repercutit. Manifestè ipsorum semen astringit: ita ut dyarrhæas & diarrhœas persanet.

Limonium.

Limonium.

Eius fructum, utpote acerbum, ex uino exhibet cœliacis, dysentericis, et hæmoptoicis. Iuuat & profluuium muliebri. Satis est oxybaphi mensura.

Leichen.

Leichen.

Leichenas curat, extergentem, modicèq; refrigerantem, ac siccantem obtinens facultatem. Nascitur enim in humidis rorèq; perfusis saxis.

Leontopetalon.

Leontopetalon.

Radix eius, digerendi facultatem, et exiccandi, cal

faciendiq; in tertio ordine possidet.

Lepidium.

EX quarto est ordine excalfacientiu, simile prorsus Lepidium. nasturtio, nisi q; minus desiccat.

Leucas.

A Crem possidet qualitatem exuperantem: tempe raturam uero calidam, siccamq; in tertio quodammodo ordine.

Leucas.

Leucacantho.

HVius radix amara est, ac p inde incidit, exiccatq; in tertio ordine. Calfacit autem in primo.

Leucacantho.

Leucoion.

EXtergit ac tenuium est partium: plus tamē flores, ac præcipuē qui sunt sicciores. Hi quippē & oculorum crassas cicatrices extenuant. Præterea menses eorum decoctum mouet, secūdas, & partum emortuū elicit, bibitumq; facit abortum: maximē amarum quū sit. Quod si eius uires multa mistione aquæ frangant, erit contra phlegmonas, & difficilia ulcera, cōmodum medicamen. Semen etiam eiusdem est facultatis, radicesq; similiter, nisi q; hæ sunt crassioris essentię, terreq; magis. Cum aceto tamen lienes induratos p sanant.

Leucoion.

Leuce, Populus alba.

EX aquea, tepida, & terrena extenuata essentia conflatur. Quamobrem & abstergentis facultatis est particeps.

Leuce.
Populus alba.

Libanotus, Thus.

EXcalfacit secundo ordine, desiccat primo, habet quoq; astringentem pusillam. Cortex eius euidenter astringit, desiccatq; in secūdo ordine. Est autē crassiorum partium q; thus, & minimum acrimoniæ possidet. Quare in hæmoptoicis, stomachicis, coeliacis, & dysentericis eo utimur. Ramus eius, siccioris & calidioris ē facultatis q; ipsum thus, adeo ut ad tertiu usq; excessum perueniat. Habet uero etiam & absterforiu

Libanotus.
Thus.

quiddam. Vnde expurgare & implere oculorum ulcera potest.

Libanotides.

Libanotides.

Libanotides tres existunt: una sterilis, due fructum ferentes. Omnes uerò emollientis, digerentis, incidentis, & abstergentis sunt facultatis. Succus tum radicis, tum herbae mistus melli, obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine emendat. Decoctum eius quam rorem marinum appellant, potum, regio morbo auxiliatur.

Lignys.
Fuligo.

Lignys, Fuligo.

Fuligo omnis exiccatoria est, ob idque terrenae essentiae: habens quasdam etiam ignis etsi pusillas reliquias: ratione quarum tenuium est partium. Ceterum quae speciatim in ea differentiae sunt, ea pro uita materia eueniunt. Thuris fuligine utimur ocularibus medicamentis permista, iis uidelicet, quae ad oculos etiam phlegmone tentatos, & qui adhuc fluxione affliguntur, exulcerati uel sunt, accommodantur. Nam & illa expurgat, & carne implet. Terebinthinae etiam myrrhaeque fuligo, molestia caret: non secus quam thuris. Sed styracis quodammodo ualentior est. Magis etiam picis liquidae. Qua adhuc magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad uitia superciliorum uocata ptila, & erosos angulos oculorum, & citra phlegmonem humidos.

Libisticum.

Lybisticum.

Lybistici radix et semen, ex genere excalfacientium sunt, adeo ut et menses cieant, & urinas prouocent, flatusque discutiant.

Linorpermō.
Lini semen.

Linosperrmon, Lini semen.

Flatuosum est esum, etiam si frangatur. At calfacit quidem quodammodo in primo ordine, humiditatis & siccitatis, in medio existens.

Liozostis.
Mercurialis.

Linozostis, Mercurialis.

EA utuntur omnes ad subductiones alui duntaxat:
Quantum

Quancūq; etiam admota, ualenter digerit.

Lonchitis.

R Adix eius quæ semē gerit triangulare, urinā ciet. *Lonchitis.*
Folia eius quæ scolopendriæ similis est, uiridia
quidem, uulnera glutinant; sicca autem, & cum aceto
epota, lienes induratos perfanant.

Lycion.

A Rbor est spinosa, ex qua lycium fit, medicamē id *Lycion.*
liquidū, quo ad sugillata, sedis orisq; phlegmo-
nas, ulcerationes, herpetas, putredines, ulcera cōtuma-
cia, aures pure fluentes, intertrigines, & paronychias
utuntur. Est enim facultatis exiccatoriæ, compositum
ex diuersi generis substantijs, altera quidem tenuium
partium, digerente atq; calida; altera terrestri & frigi-
da, ex qua astringentem exiguum obtinet. Ceterū dige-
rit & siccat in secundo ordine; in calore autem medijs
est proximum. Est porro lycium Indicum ad omnia
ualentius.

Lyfimachios.

S Vperantem astringentem fortitur: per quā omnes *Lyfimachios.*
sanguinis fluxus reprimat, tum pota, tum cataplas-
matis modò admota.

Lychnis.

S Emen eius calidum & siccum est, secundo quodā *Lychnis.*
modo, aut etiam tertio ordine.

Lotos herba.

L Otos domestica, quam trifolium nominant, ut me *Lotos herba.*
diocriter cōcoquendi, sic etiā exiccandi uim pos- *Trifolium.*
sident, in caliditatis frigiditatisq; coniugio, media quo-
dammodo existens. Semen agrestis loti, secundi est or-
dinis calfacientium: habetq; nonnihil absterforiū. Por-
rò Ægyptiæ loti semen etiam in panes fingitur.

Lotos arbor.

N On ita multæ astringentis qualitatis est particeps, *Lotos arbor.*
sed & tenuium partiū est, & exiccatoria. Cuius

Tomus IIII.

K k k k

siccę ramenta profluuiio muliebri, dysenterijs, capillo-
rum effluuiio, coeliacis q̄; affectibus accōmodantur, aut
in uino, aut in aqua concocta.

Macer.

Macer.

Cortex est qui ex India aduehitur, gustu multum
acerbo, cum leuicula quadam acrimonia odora-
ta. Constat autem ex mista essentia, pleraq; terrena fri-
gida, paucula uerò calida & tenuiū partium. Itaq; ua-
lenter desiccatur, astringitq; ob idq; coeliacis & dysen-
tericis medicamentis miscetur, in tertio exiccantiū con-
sistēs ordine: in caloris frigoris q̄; discrimine, neutrum
insigniter præstans.

Malabathrum.

Malabathrū.

Malabathri folium cum spica nardi simillimam
obtinēt facultatem.

Malache, Malua.

Malache.
Malua.

Agrestis, quidem digerētis paululū & emolliētis
leuiter est facultatis: hortēsis uerò, quāto plus ha-
bet aqueę humiditatis, tātō facultate ibecillior est. Fru-
ctus eius tanto ualidior est, quanto & siccior. Cæterū
Althea omnium efficacissimè digerit.

Mandragora.

Mandragora.

Refrigerat tertio excessu. Nonnihil tamē pomis ca-
loris atq; humiditatis inest. Vnde soporem con-
ciliant. Radicis cortex non tantū refrigerat, sed etiam
siccatur. Quod eo includitur, imbecillimum est.

Marathrum, Fœniculum.

Marathrum.
Fœniculum.

Confacit in tertio, desiccatur in secundo ordine: pro-
inde lac gignit, auxiliatur suffusis, menses q̄; et urī-
nas pmouet. Radix & semen hippomarathri, amplius
q̄; domestici siccant: quare & uentrē uidentur sistere.
Possunt etiā & calculos frangere, curare ictericos, mē-
ses q̄; & urinas mouere: minimè tamen lac gignere.

Mastiche.

Mastiche.

Candida quidem & Chia, astringit simul emol-

litq; . Proinde stomachi, uentris, intestinorum, iecorisq; inflammationibus competit, ut puta secundo ordine exco-
faciens & siccans. Nigra uero, quæ Aegyptia dicitur,
magis desiccet, minusq; astringit: quamobrem aprior
est ad ea quæ ualidiorē digestionem per halitum po-
stulant. Porro oleum, quod præcipue ex Chia conficitur,
similis est cum mastiche facultatis.

Melanthium, Nigella.

EXcofacit & siccet in tertio ordine, estq; amarum,
atq; tenuium partiū. Quare catarrhos sanat in lin-
teo admotum, atq; assidue olfactum: flatus potū extin-
guit: lumbricos enecat, non esum modò, sed etiam fo-
ris applicitum: lepras, clauos, atq; myrmecias exterit:
orthopnoeam iuuat, & menses puocat: in summa uero
ubi sectione, exsectione, desiccatione, excofactione est
opus, præstantissimum id remedium existit.

Melilotum.

Quidam habet astringens, digerit tamen, con-
coquitq; . Copiosior enim in eo est substantia
calida q̃ frigida.

Mel.

Desiccet excofacitq; secundo ordine: ac detergen-
tem facultatē obtinet. Porro coctū, minus acre
absterforiumq; redditur. Itaq; ad sinuosorum ulcerū
glutinationē eo utuntur. Cæterum quod mel est ama-
rum, mistæ facultatis existit. At Saccharo, quod ex In-
dia et foelici Arabia conuehitur, concrefcit in calamis,
estq; mellis species, minus certē nostrate dulcius, sed
similes ei uires obtinens, quod ad abstergendum, de-
siccandum, & digerendū pertinet. Quatenus uero nec
inimicum uentriculo est, ut nostras, nec sitim adferēs,
eatenus ab illo substantia differt.

Melissophyllon, Citrargo.

Marrubio similis est facultate, sed plurimū ab eo
uincitur. Quamobrē nec utitur eo quispiam, quū

Kkkk ij

Melanthium,
Nigella.

Melilotum.

Mel.

Saccharum.

Melissophyl-
lon.
Citrargo.

larga marrubij copia suppetat.

Mespilum.
Tricoccon.

Mespilum, Tricoccon, q̄ tria grana gerat.

F Ructus eius admodum est acerbus, uixq; edi possit, uentrem extremè coercens. Quin & in germi-
nibus & folijs acerba hæc qualitas non pauca reperit̃.

Medion.
Trifoliū odo-
ratum.

Medion, Trifolium odoratum.

R Adix quidem eius austera est, omnesq; fluxiões cohibet. At semen tantum abest ut id moliatur, ut etiam menses cieat: nimirum tenuium partium quū sit, & facultate incidendi præditum.

Mecon, Papauer.

Mecon.
Papauer.
Rozas.

Q Vum quatuor eius insignes species sint, facul-
tas omnium existit refrigeratoria. Cæterū sati-
uū semē, mediocriter somnum conciliat, uisu candidū:
proinde pani ipsum inspergunt, ac melle maceratum
esitant. At ex syluestribus, eius quod rhœas dicit̃, quia
flos ipsius celeriter defluit, semen ualidius refrigerat.
Itaq; nequaquā eo quis innoxie solo uti possit. Illius ue-
rò quod calicem incidentem sustinet, atrum existit se-
men, medicamentosumq; atq; impensè refrigerans.
Quod autem longiorem emittit calicem, medicatissi-
mum omnium est, admodumq; refrigerans, idq; om-
nibus partibus suis. Adeò quippe refrigerat, ut stupo-
rem ac mortem etiam inducat. Est enim ex quarto &
ultimo refrigerantium ordine.

Papauer cor-
nutum.

Mecon ceratit̃is, Papauer cornutum.

V Im habet incidendi, extergēdiq;. Itaq; radix eius
in aqua ad dimidiū decocta, hepaticos affectus
adiuuat. Folia & flores sordidis & contumacibus ul-
ceribus profunt. Sed ea reiicere oportet ulceribus iam
repurgatis: alioqui sanam carnem exedent.

Papauer Her-
culeum.

Mecon Heracleia. Papauer Herculeum.

S Emen habet pituitam expurgans.

Melea.
Malus.

Melea. Malus.

M Alus non omnis eiusdem naturæ est, sicuti nec

eiusdem fructus. Succī siquidem, cortices, foliaq; arborum, etiā inter se dissident. Itaq; si acidiora austerioraq; sint, illis uulnera glutinare possis, tum in phlegmonarum initio repercutere influxum, ac uētriculū exolutū & lāgūidū roborare: at aquosioribus, mediocres phlegmonas incipientes & gliscentes remittere. Quod autem plurima pomis omnibus recrementitia frigidaq; insit humiditas, hinc liquet, q̄ nullus eorū succus seruari possit: uerūm acescāt corrumpanturq; uniuersi. Solus enim cydoniorum & struthorum (que propter astrictionem uehemētem, cæteris minus sunt humida) succus coctus cum melle durare potest: per se autem minimè.

Succī qui seruari possint, et quomodo.

Melea Persice, Persica malus.

IN germinibus & folijs uincentem habet qualitātē amaram. Proinde folia eius trita & super umbilicum posita, lumbricos enecant: estq; digerens medicamen. Fructus humidior est, & temperie frigidior.

Persica malus

Melea Armenice, Malus Armenica.

FRUCTUS humidior frigidiorq; est: Vtrunq; secundo quodammodo excessu.

Malus Armenica.

Melea Medice, Malus Medica, Citrium.

Malus Medica.

QUOD in fructu semen amplectitur tertij est ordinis resiccantium atq; refrigerantium. Cortex desiccatur quidem in excessu secundo, non tamen frigidus est, sed temperatus, aut paulò infra. Caro eius pariter crassi succi est, & pituitosa, frigidaq; Semen amarum est, digerereq; & exiccare potens, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia exiccādi & digerendi uim obtinent.

Meum.

RADICES eius sunt calidæ tertio excessu, in secundo siccæ. Proinde urinas mēsesq; mouent. Quòd si liberalius sumantur, capiti dolorem conciliant.

Meum.

Milax tracheia, Milax aspera.

Kkkk ij

Milax aspera.

Varijs clauiculis suis arboribus circūuoluitur. Folia eius & acria gustanti, & utenti calida existūt.

Milax lenis.

Quodāmodo iam dictæ similes uires obtinet.

Milax lenis.
Morca, Morus.

Morus.

Mori fructus maturus quidem aluū subducit: immaturus uerò, ubi aruerit, restringit admodum. Quare ad fluentes affectus est cōmodus. At maturorū succus, propter astrictiōem quam habet, ad stomatīca medicamenta est utilis. In radicis cortice purgatoria uis cum quadam amaritudine exuperat, ita ut latos uermes enecet.

*Myagros.**Myagros.*

Oleum quod ex semine ipsius funditur, emplasticam facultatem obtinet.

*Mycetes.**Mycetes, Fungus.**Fungus.*

Frigida humidāq; admodum plāta est, quare proximè ad enecātem facultatem accedit. Et sanè inter eos sunt qui interficiant: maximè qui ex natura mistam habent qualitatem putrilaginosam.

*Myle.**Myle.*

Radix eius contrahentis est facultatis. Quam cum farina lolij apertā uuluā sanare ait Dioscorides.

*Myosotis.**Myosotis, Auricula muris.*

Desiccat secundo ordine, cæterū nullam euidētem caliditatem sortitur.

*Myrice, Tamarix.**Myrice.**Tamarix.*

Abstergit & incidentis est facultatis, absq; perspicua desiccatione. Habet uerò etiam astrictiōem nōnullam. Igitur cum aceto decocta prodest lieni indurato. Sanat etiam dentium dolores. Fructus & cortex non paucam possident astrictiōem. At cinis myricæ, admodum desiccatoriæ facultatis est, plurimam habens abstergendi uim, astringendi pauxillam.

Myriophyllon.

A Deò exiccat, ut uulnera glutinet.
Myrrhis.

Myriophyllo.

R Adix eius est odorata et dulcis, mensesq; mouet,
necnō thoracem atq; pulmones purgat. Calfacit
itaq; secundo ordine, cum partium tenuitate.

Myrrhis.

Myrrhine, Myrtus.

I N hac planta uincit terreum & frigidum. Habet ta
men aliquid tenue & calidum. Quare ualenter de
siccat. Porrò quod ramis & trunco adnascitur tubero
sum, quanto siccus cæteris partibus est, tanto defic
cat & astringit uehemētius. Folia item arida uiridibus
plus desiccant. Itaq; omnes partes eius restringunt, tū
foris imposita, tum intro assumpta.

Myrrhine.

Myrtus.

Moly, Ruta syluestris.

R Adicem habet nigrā, & florem lacteū. Vis eius
tenuium partiū est, & calida tertio ordine; unde
crassos humores desiccatur, digeritq; & urinā mouet.

Moly.

Ruta syl
uensis.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E S I M P L I C I V M
M E D I C A M E N T O R V M

Facultatibus. Liber VIII.

Nardus stachys, Spica nardi.



C ALFACIT excessu tertio. De
siccat secundo completo. Constat ex
astringēti, acri, & leuiter amara sub
stantia. Quare radix iecori et uentri
culo cōuenit, & pota, & admota ex
trinsecus. Urinam ciet: morbus sto
machi sanat, uentris, capitis, & thoracis, fluxiones de
siccat. Valenter tamen est Indica: quæ nigrior quā
Syriaca existit.

Nardus sta

chys.

Spica nardi.

Kkkk iiij

Nardus Celtica, hoc est Gallica.

Nardus Cel-
tica.

A Domnia est imbecillior dictis, præter quæ ad pro-
uocandam urinam. Nam calidior illis est, sed
minus astringit.

Nardus oreæ: hoc est montana.

Nardus mon-
tana.

Plurima in Cilicia nascitur, sed prædictis infirmior:
Narthex, Ferula.

Narthex.
Ferula.

Semen eius calfacit et tenuat. Medulla autem atri-
tionis est particeps. Vnde hæmoptoicis & cœ-
liacis conuenit.

Napy.

Napy.

Calfacit desiccaturque ordine quarto.

Narcissus.

Narcissus.

Eius radix desiccatur adeo, ut uel maxima tendonum
uulnera glutinet. Habet uero quiddam absterfo-
rium & attractorium.

Neuras, Poterium.

Neuras.
Poterium.

Desiccatur citra morsum, adeo ut icisos nervos glu-
tinare credatur: ac præcipue radices eius.

Nerium, Rhododaphne.

Rhododaphne.

Foris quidem illitus is frutex, digerendi uim obti-
net. At si intra corpus sumatur, uirulentus homini
& plerisque pecudibus est.

Nymphæa.

Nymphæa.

Tum radix eius, tum semen, desiccandi citra mor-
sum uim habet. Itaque uentris profluvia, semenque im-
modicè profluens sistit. At cui adest candida radix, ea
& muliebri medetur profluvio, ex uino nigro & auste-
ro epota. Vtraque autem abstergendi quandam uim pos-
sidet. Quare maceratæ quidem aqua, sanant alphos, li-
quida uero pice, alopecias. Ad hæc tamē aptior est ea
cuius radix est nigra.

Xanthion.

Xanthion.

Semen eius digerendi uim obtinet.

Xyris.

T Enuium partium, attractoriae, digerendi, & desiccandi facultatis est, quā radix, tum multo magis fructus: qui quidem & urinam ciet, & lienes induratos sanare potest.

Xyris.

Xyphion, Gladiolus.

X Yphij radix, maximè altera quæ superior est, attrahit, digerit, desiccaturq;.

Xyphion.
Gladiolus.

Oe, Sorbus.

A Stringentem uim obtinet, at multo quæ mespilus imbecilliolem. Proinde fructus eius gustui iucundus est, minusq; uentrem quæ mespilus constringens.

Oe.
Sorbus.

Oenos, Vinum.

E X secundo est ordine calfacientium: sed quod admodum uetus est, ex tertio: sicuti mustū ex primo. Caliditati proportionem respondet siccitas.

Oenos.
Vinum.

Olynthi, Grossi.

A Crem facultatē fortiunt. Cocti itaq; duos tumores discutiunt: crudi myrmecias & thymos eiciunt.

Olynthi.
Grossi.

Olostium.

D Esiccandi uim obtinet cum astrictione: ideoq; propinatur ad rupta.

Olostium.

Olyra.

M Ediam tritici & hordei naturam possidet, tam ut nutrimentum, quæ ut medicamentum.

Olyra.

Onagron.

H Vius radix arefacta uinosum quiddā redolet, maximeq; ad uini facultatem accedit.

Onagron.

Onosma.

A Cri & amara substantia constat. Cuius folia in uino pota foetum extinguere expellereq; credunt.

Onosma.

Onobrychis.

R Arefaciendi digerendiq; uim obtinet. Proinde folia eius uirētis illita, phymata digerunt: arefacta uerò, & cum uino pota, strangurias sanant: sudoresq; eliciunt, cum oleo inuncta.

Onobrychis.

Ononis.

Ononis.

RAdix eius calfacit quodāmodo in tertio ordine, abstergitq; & nonnihil incidit. Itaq; non tantum urinas prouocat, sed & lapides frāgit, & crustas detrahit. Præterea ad dolores dentium, oxycrato in quo fuerit cocta, colluuntur.

Oxos.
Acetum.

Oxos, Acetum.

EX frigida calidaq; substantia constat: utraq; tamē tenuium partium. Verū calidam frigida exuperat. Desiccat porrò in tertio gradu.

Oxyacanthos.

Oxyacanthos.

VT specie, sic facultate hæc arbor piro syluestri est similis. Cæterū piri syluestris fructus, prorsus * acerbus est: oxyacāthes uerò, & tenuium est partium, & nonnihil incisorium sortitur: estq; rubeus & rarus. Qui quidem affectus omnes fluxionum conhibet.

Opos, Succus.

Opos.
Succus.

CYrenaicus quidem reliquos omnes caliditate & tenuitate exuperat: ideoq; omniū maximè per ha- litum digerit. Quāq; sanè & cæteri admodum calidi sint, & spirituosī. Porrò licet complures etiam sint aliī succi, qui effluunt, incisa radice: ob excellentiam tamē sic dicitur Cyrenaicus, & Medicus, & Syriacus.

Origanus.

Origanus.

HEracleotica quidē efficacior est onitide: agrestis tamen est ualentior utraq;. Omnes uerò inciden- di, extenuandi, calfaciendi, & exiccandi obtinent facul- tatem, in tertio nimirum excessu. At Tragoriganus etiam quippiam astringit.

Tragoriganus

Orobus, Eruum.

Orobus.
Eruum.

DEsiccat quidem excessu secundo intēso, calfaciē uerò primo. Porrò quatenus amaritatis est par- ticeps, eatenus incidit, extergit, atq; obstructions ex- pedit. Cæterū si sumatur copiosè, sanguinem per urinas euocat.

Orobanche, Eruangina.

Orobanche.
Eruangina.**S**iccæ frigidæq; temperaturæ est, in primo ordine.

Oryza.

Habet astrictorium quippiam, quare mediocriter
aluum sistit.

Oryza.

Orchis, Testiculus canis.

RAdici eius bulbosæ & geminæ, uis inest humida
& calida, gustantibusq; dulciuscula. Cæterū ma-
ior radix multam habere uidetur humiditatem excre-
mentitiam, & flatulentam: quapropter epota uenerem
excitat. Minor uerò, quum ad calidius & siccus uer-
gat, tantum abest ut ad coitum stimulet, ut etiam co-
hibeat, & reprimat. Eduntur bulborum more, tostæ.Orchis.
Testiculus ca-
nis.

Orchis, Serapias.

Siccat ultra primū excessum. Quare nō ita est ad ue-
nerē cōmodus. Oedemata illitus discutit. Vlcera sordi-
da expurgat. Herpetes sanat. Siccatus multo amplius
desiccatur. Nam putrescētia contumaciaq; restituit ulce-
ra, & subastringens quū sit, uentrē sistit ex uino potus.Orchis.
Serapias.

Osiris.

AMara est, & aperiendi uim obtinet. Quare iecur
obstructum adiuuat.

Osiris.

Pancratium.

RAdix huius, scillæ similem gustū refert, & uires,
multo tamē imbecilliores. Ea itaq; pro scilla, ubi
hæc non adest, utuntur.

Pancratium.

Paliurus.

Folia eius & radix adeo perspicuè astringūt, ut flu-
xum uentris cohibeant: adeoq; digerunt, ut micio-
ra phymata curent. At fructus, tantam incidendi uim
possidet, ut calculos uesicæ cōminuat, & pectoris pul-
monisq; excretionibus auxilietur.

Paliurus.

Papyrus.

OXycrato uino uel macerata, recentia ulcera gluti-
nat, maximè in circulum circumposita, ut mate-

Papyrus.

Chartæ cinis.

ria sanantia medicamina excipiens. At ubi usta fuerit, medicamen exiccatorium existit, ut chartæ combustæ cinis. *Hoc tamen cinis papyri est infirmior.

Panax Heraclium.

Panax Heraclium.

Opopanax.

Opopanax.

EX hoc conficitur opopanax, radicibus et caulibus eius incisis. Porro opopanax ipm tum mollit, tum digerit. At calfacit quidem in tertio ordine; in secundo autem siccatur. Cortex radice excalfacit etiam & siccatur, minus tamen q̃ succus. Cæterum abstergerendi nōnullam facultatem sortitur. Quare eo utimur & ad nuda ossium, & ad ulcera contumacia. Sufficiēter siquidem quæ talia sunt, carnem procreant. Fructus calidus est & ipse, ac mensibus mouendis accommodus.

Panaces Asclepium.

Panaces Asclepium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

Panax cheironium.

MInus est calidum supradicto panace. Quare floribus eius & semine melli mistis ad ulcera, phymata, & phagædænas utuntur.

Panaces, Asclepium.

Panaces, Asclepium.

Panaces, Asclepium.

Panaces, Asclepium.

Radix eius desiccatur uehemēter, nimirum in tertio ordine, citra mordicationem tamē. Minimum si quidē habet quā acrimoniæ, tum cōspiciuē caliditatis.

Succum habet similem tithymallis, quum in alijs, tum quia purgat ceu illi.

Etiam fruticulus hic succum habet ut tithymalli, ualidumq̃; nō tamē admodū utilem. Radix eius uidetur superuacanea. Semen utile est, & flatulentum, pepli semini similiter purgans.

Peperi, Piper.

Piperis radix vires costo similes obtinet. Fructus nuper germinatis, longum existit piper: quare maturo est humidius. At fructus qui ueluti omphax est, piper album est, nigro quidem acrius. Nam illud iam ueluti superassatum uidetur. Vtrunq; tamen ualenter & calfacit, & desiccatur.

Peperi.
Piperis differētiæ.

Persea.

Persee folia modicè astringunt, ita ut nonnunquā si sterere queant sanguinem erumpentem.

Persea.

Periclymenos, Volucrum maius.

Fructus eius & folia adedò uehementer incidunt & calfaciunt, ut si diutius bibātur, urinam sanguinolentam efficiant: principio tantum urinam mouentia. Foris cum oleo illita etiam excalfaciunt. Iuuant & lenos, & difficulter spirantes. Competens mēsurā est drachmā unius cum uino. Desiccatur etiam semē, & (ut quidā tradunt) si liberalius bibatur, sterilitatē inducit.

Periclymenos
Volucrum maius.

Peristereon.

Vim habet hactenus desiccantem, ut & uulnera glutinet.

Peristereon.

Petalites.

Ex tertio est ordine desiccantium: quāobrem ad caecoethe & phagedænica ulcera eam adhibent.

Petalites.

Petroselinum.

Eius semen est gustu acre, cum amaritudine: Sic & in operibus calidum, unā cum incidendi effectu. Hinc menses & urinas assatim prouocat, flatusq; discutit. Calfacit itaq; & siccatur in tertio ordine. Tota herba similem, sed imbecillio rem possidet facultatem.

Petroselinum.

Peucedanum.

Succus eius admodum excalfacit & digerit, estq; tenuium & incidentium partium. Quare omnibus neruorum affectibus credit opitulari: tum morbis in pulmone & thorace ex crassitudine humorum ortis. *

Peucedanum.

Nec uerò intra corpus sumptus duntaxat, sed olfactu etiam prodest. Ad hæc sæpe foratorum dentium dolores, cavitati impositus, p̄tinus mitigauit. Quin etiam induratos lienes iuuat. Ad quæ omnia, licet etiam uti radice, quæ & squamas celerrimè ab ossibus detrahit, & arida illita ulceribus contumacibus remedium est optimum: minus quidem q̄ succus exalfaciens, nempe in secundo ordine iam completo: desiccans uerò in tertio incipiente.

Peganon. Ruta.

Peganon.
Ruta.

A Grestis quidem, in quarto ordine exalfacit: Domestica uerò, in tertio. Est autem non solum gustu acri, sed & amaro. Ex quo sanè digerere, icidereq; crassos & lentos humores potest, atq; mouere urinas. Quin et tenuium est partium, flatusq; extinguit. Quare ad inflationes competit, ac ueneris appetentiam inhibet: digeritq; atq; exiccat strenuè.

Pissa, Pix.

pissa.
Pix.

Sicca quidem siccatur, & calfacit secundo ordine. At plus siccare ualet q̄ calfacere. Humida uerò contrà, plus calfacit q̄ siccatur: habetq; partium tenuitatem nonnullam, qua asthmaticos & purulentos adiuuat. Satis est autem cyathi linxisse mensuram melli mistæ. Abstergendi etiam, cōcoquendi, digerendiq; quandā uim habent, ueluti in gustu leuem amaritatem & acrimoniam. Sic leprosos ungues eximunt mistæ cum cera, lichenasq; detergunt. Coquunt item duos & crudos tumores, cataplasmatibus inditæ. Atq; ad ea omnia, humida ualentior est: arida uerò glutinandis uulneribus aptior.

Pisselæon.

Pisselæon.

EX humida pice efficitur, genere quidem ei simile, sed essentia tenuioris.

Pistacium.

Pistacium.

FRuctus eius quodammodo tenuioris essentia est,

subamarum quid, & odoratum retinens. Obstructiones itaq; oīum uiscerum aperit, sed precipuè iecinoris.

Pityides, Picearum fructus.

A Stringit, simulq; acris ē, cū amaritudine quadā. Vnde thoracis pulmonisq; expuitiōibus cōfert.

Pitys, Picea.

PIceæ cortex uincentem facultatem astrictoriā sortitur, sic ut intertrigines sanet, uentremq; potus fistat. Sed & ambusta cicatrice includit. Tedæ cortex illi adsimilis est, uiribus tamen moderatioribus. Vtriusq; arboris folia, glutinant ulcera. In coni folijs & cortice ualidior facultas est, adeò ut cum molestia mordicet. Fuligo quæ ex dictis colligitur, ad pilos superciliarum est commoda, itemq; ad angulos oculorum erosos, lipientes, & lachrymantes.

Pityusa.

Viribus est similis tithymallo, succumq; sortitur similem, & similiter purgat.

Platarus.

HVmidioris frigidiorisq; est essentiæ, non ita multò q̃ symmetra Proinde folia uiridia trita & illita, non obscure nascentes phlegmonas adiuuāt. Cortex & pilulæ magis desiccantem uim obtinent: ut ille quidem in aceto coctus ad dentiū adhibeatur dolores; pilulæ uerò cum adipe, ad ulcera ambusta. Vitandus est puluis folijs arboris insidens. Alioqui si attrahatur spiritu, arteriā offendit, ualenter siccans, exasperansq;. Necnon uocem lædit, sicuti & auditum & uisum, si in oculos aut aures inciderit.

Polygonon, Centinodia.

VTi astrictionis est particeps, ita in eo frigidum aqueum uincit: ut secundo excessu refrigeret, aut etiam initio tertij. Itaq; æstuantī uentriculo, erysipelati, atq; calidis phlegmonis, si illinatur frigidum, auxiliatur. Sistit præterea uniuersas fluxiones; qua ratione

Pityides.

Picearum fructus.

Pitis.

Picea.

Tedæ cortex.

Pityusa.

Platanus.

Polygonon,
Centinodia.

uidetur exiccatorium. Quare ad herpetas, ulceraq; bonum remedium est. Quin etiam cruenta uulnera glutinat, auriumq; puri & ulceribus confert. Stillicidio & stranguria affectis exhibitum, urinam mouet, ut Dioscorides ait. Fœminæ ad omnia mas præstat.

Polygalon.

Polygalon.

Eius folia modicè astringunt, uidenturq; si bibantur, lac generare. Itaq; superauerit in eo calidum humidumq;.

Polygonatum.

Polygonatū.

A Strictionis pariter & acrimoniæ habet quippiā, cum fastidiosa quadam amaritudine. Quare non usq; adeò est uescū. Sunt qui radicē eius illinant uulneribus. Alij eo n̄ uos in facie detergant.

Polemonium.

Polemonium.

Tenuium partium est, & desiccandi uīm obtinet. Vnde quidam radicem eius cum uino ad ischidas, dysenteriam, lienemq; induratū propinant.

Polium.

Polium.

A Marum est ac modicè acre. Obstructione itaq; omnia uiscera liberat, urinamq; & menses promouet. At uiride magna etiam uulnera glutinat, & maxime species eius fruticosa. Aridum sanat rebellia ulcera; præcipuè quod minus est.

Polium minus.

Polium minus.

A Crius & amarius est hoc q̄ maius, adeò ut ex tertio sit ordine desiccantium; ex secundo autem completo calfacientium.

Polycnemon.

Polycnemon.

Desiccat & calfacit secūdo excessu; itaq; & ipsum uulnera glutinat.

Potamogeiton.

Potamogeitō.

A Stringit & refrigerat similiter polygono; sed essentia eius crassior q̄ polygoni est.

Polypodium.

Dulce m

D Vlcem simul & auferam uincem obtinet Polypodium.
qualitatem: ut facultatis sit citra morsum admo-
dum exiccantis.

P Prasium, Marrubium.
Prasium amarum quum sit, iecur ac lienem liberat
obstructione, thoracem & pulmonē expurgat, ac mē-
ses pmouet. Sed illitū etiam detergit et digerit. Calfa-
cit itaq; secundo excessu completo: siccatur autem tertio
ineūte, aut completo. Succo eius ad aciei oculorū cla-
ritatem utuntur cū melle; per naresq; auriginē purgat,
ipsumq; ad inueteratos aurium dolores adhibent.

Propolis.

M Odicē quidem extergit, cæterū ualidē trahit. Est
enim essentia tenui. Excalfacit porrò ordine secū-
do completo, aut certē incipiente tertio.

Parmice.

F Lores eius ciendæ sternutationis uim obtinēt. Su-
gillata et ceteras ecchymosis digerit. Viridis por-
rò calfacit secundo ordine: tertio autem siccatur.

Ptelea, Vlmus.

V Lmi folijs quandoq; recens uulnus conglutina-
uimus: confidentes astringentem simul & abster-
gentem inesse eis facultatem. Cæterū cortex magis
amarus est, astringentiorq; magis. Itaq; cū aceto & le-
pras sanat. Quòd si uiridis circūligetur uulneribus, ea
glutinare potest. Radices etiam eandem uim obtinent.
Quarum decocto sunt qui perfundant fracturas, quæ
callo obduci desyderant.

Pteris, Filix.

R Adix eius latum lumbricum perimit, si in meli-
crato pōdere drachmarum quatuor bibat. Qua-
re ipsam partem uiuum necare, mortuū autem expel-
lere, nō est mirum. Siquidem amara existit, paulumq;
astrictionis obtinet. Vnde ualidē ulcera desiccatur: citra
morsum tamen. Similē ei uim habet Thelypteris.

Tomus IIII.

LIII

Pynocomum.

Pynocomū.

R Adix, fructus, & folia eius, digerendi attrahēdiq; obtinent facultatem: acria nimirum quum sint. Folia itaq; phymata furunculosq; discutunt. Fructus ualentior est. Nam & palos, & tela infixa, ad extimam cutem elicit. Radix ad supradicta est infirmior, cæterū flauam bilem expurgat.

Pyrethrum.

Pyrethrum.

R Adix eius causticam possidet facultatem, qua dentes refrigeratos mitigat. Porro ad rigores ante periodum cum oleo confricatur: stupidosq; & resolutos adiuuat.

Pyros, Triticum.

Pyros.

Triticum.

F Oris impositum, primi est ordinis calfacientium: *cæterum nec siccare, nec humectare manifestò potest. Habet uerò etiam quiddam lentoris, obstruentisq; naturæ. Quod ex eo amyllum conficitur, ipso est tum frigidius, tum siccus. Quod ex pane fit cataplasma, magis digerit, q̃ quod ex tritico: salis & fermenti ratione. Fermentum quippe uim attrahendi habet, digerendiq; quæ in alto resident.

Rhamnus.

Rhamnus.

D Esiccat & digerit excessu secundo. Refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente. Proinde herpes sanat, & erysipelata non magnopere calida.

Rhaphanis, Radicula.

Rhaphanis.
Radicula.

E Xcalfacit excessu tertio: desiccat uerò secundo. Agrestis in utroq; efficacior est. Semen etiam efficacius est planta. Ei enim inest digerendi facultas.

Rheum, Rha.

Rheum.
Rha.

Q uiddam habet terrestre frigidum, ceu indicio est astrictio: adiuncta est illi tamē quædam caliditas. Siquidem si mandatur plusculum, subacre conspicitur. Est etiam aeris cuiusdam substantiæ subtilis: particeps: quod indicat laxitas, leuitasq;. Quare con-

uulsis, ruptis, orthopnoeæq; prodest. Sic quoq; liuentia & lichena; cum aceto illitum persanat. Astriktionis ratione, sanguinem expuentibus, coeliacis, & dysentericis confert.

Rhetinæ, Resinæ.

Resinæ omnes desiccant & excalfaciunt. Lentiscinæ tamen (quam uocant mastichem) primæ debentur partes. Nam præter q̄ q̄ pauca ei inest astrictio, qua stomachi, uentrisq; & iecoris imbecillitibus, phlegmonisq; etiam accommodatur, desiccatur insuper citra mordacitatē. Minimum enim acris est, & maximè tenuium partium. Inter ceteras præfertur terebinthina, manifestam quidem, non tamē similiter atq; mastiche astrictionem possidens. Verūm adiunctam habet quandam amaritudinem, per quam magis q̄ mastiche digerit. Per eandem etiam usq; adeò abstergit, ut psoras sanet. Quin etiam quæ in profundo resident, magis ceteris extrahit, ob maiorem tenuitatem partiū. Attamē pinea, & hac etiam magis strobilina, acriores ea sunt, sed non magis tamen digerunt, attrahunt uē. Media inter has sunt picea & abietina. Habet porrò & emolliens quiddam terebinthina. Secundum locum habet in emolliendo lentiscina, sicuti cyparissina in ipsa acrimonia.

Rhodos, Rosa.

Ex aquea substantia calida, duabus alijs qualitibus mista, astringenti uidelicet & amaræ, composita est. Flos tamen, magis q̄ ipsa rosa, est astringens: ac proinde etiam exiccatorius est.

Rhodia Rhiza, Radix Rhodia.

Tenuium partium & digerentis est facultas. In calfaciendo uerò secundi ordinis est cēsenda; aut certè tertij incipientis.

Rhododaphne.

Tota sua essentia uenenū est & hominī & plerisq;

LIII ij

Rhetinæ.

Resinæ.

Mastiche.

Terebinthina.

Rhodos.

Rosa.

Radix rhodia.

Rhododaphne.

pecoribus. Porro calfacit excessu tertio: primo autem desiccatur.

Rhoea, Malum granatum, siue punicum.

Rhoea.
Malum granatum, punicum.

OMne malum granatum astringentem qualitatem sortitur: non tamen in omnibus ea exuperat. Nam inter ea quædam sunt acida: quædam plus dulcia quæ astringentia. Pro ratione quarum qualitatum uincetium, suos usus præstant. Porro acini astringentiores, & exiccantiores sunt succo. Sicuti & his putamina: quæ fidia dicuntur. Ad similem illis uim habent flores qui cytini dicuntur.

Rhus.
Sumach.

Rhus, Sumach.

AD desiccandum & astringendum coriarij hac planta fruticosa utuntur. Medicis in usu sunt fructus eius & succus, austeræ admodum qualitatibus. Exiccatur itaque in tertio ordine: refrigeratur uero in secundo.

Rhypos.
Sordes.

Rhypos, Sordes.

* **S**ordes quæ à gymnasiorum statuis æreis abraditur, digerendi emolliendiq; uim obtinet: quæ autem ab ijs qui in palestra exercentur, quantum accepit pulueris, tantum ab ea est diuersa: atque hanc sordem πᾶτον Græci nominant. Prior igitur, quæ ob contractam æruginem, acrior etiam existit, cruda phymata digerit. Secunda autem, optimum est phlegmones mamillarum remedium. Constat enim ex puluere percussione, oleo emolliente, ac denique sudore & sordibus digerentibus.

Sagapenum.

Sagapenum.

Liquor est calidus et tenuium partium, sicuti & alij liquores. Sed abstersionem quædam obtinet, quæ oculorum cicatrices expurgat, extenuatq;. Suffusionibus etiam & hebetudinibus oculorum, quæ à crassitie humorum proueniunt, non malum est medicamen. At planta ex qua prouenit, ferculæ assimilis, imbecilla est & inutilis.

Sampsychon, Maiorana.

T Eruium partium & digerentis est facultatis. De Sampsycum.
 siccatur enim & calfacit ordine tertio. Maiorana.

***C** Saprotēs ξύλων, Caries lignorum.
 Aries eorum precipuè lignorum quæ partici- Caries ligno-
 pia sunt astrictiōis & absterfionis, ut ulmus, expur- rum.
 gat, impletq; ulcera humida.

Sarcocolla.

M Istam uim habet ex emplastica quadam substan- Sarcocolla. 3
 tia, & paucula amara. Itaq; citra morsum defic-
 cat, ac proinde glutinare ulcera ualet.

Satyrium, Triphyllon.

H Vmidum calidumq; est temperie, ob idq; dulce. Satyrium.
 Recrementitiam tamen & flatuosam humiditatē Triphyllon.
 possidet. Quocirca ad uenerem incitat.

Selinon, Apium.

A Deò calidum est, ut & urinam & menses cieat. Selinon.
 Flatus quoq; digerit, & magis semen q̃ herba. Apium.
 Oreoselini & hipposelini similis uis existit. Verū hip-
 poselinum imbecillius est; oreoselinum ualentius.

Seris, Cichorion.

H Olus est subamarum, & magis quod agreste est. Seris.
 Id nāq; est frigida & sicca temperaturæ, secun- Cichorion.
 do excessu. Cæterum domestica magis q̃ agrestis re-
 frigerat. Porrò utraq; astringentis qualitatis est parti-
 ceps, ut chondrilla, quæ est etiam sereos species.

Seriphum.

A Bsynthio est tum specie, tum gustu simile. Cære Seriphum.
 rum non æquè astringit. Sed calfacit ualentius,
 necnon amaritudinem quandam saluginosam refert,
 uentriculoq; est infestum; magisq; absynthio lumbrico-
 enecat. Calfacit itaq; secundo ordine intenso. Sic-
 cat autem in tertio.

Seseli.

A Deò excalfacit tum radix, tū fructus, ut moueat Seseli.
 urinas. Est etiam tenuium partiū, ut & comitia-

libus morbis, & orthopnoeis competat.

Sesamon.

Sesamon.

Viscosum & pingue quum sit, emplasticum etiam existit, emolliensq; ac modicè calidum. Oleum quod ex eo conficitur, & ipsius herbæ decoctum, eiusdem sunt facultatis.

Sesamoides magnum.

Sesamoides magnum.

Semen eius ut helleborus purgat, similiterq; abstergit, calfacit, & desiccatur.

Sesamoides album.

Sesamoides paruum.

Huius semen nonnullam * acrimoniam sortitur, Huehementerq; est amarum. Excalfacit itaq; rumpit, extergitq;.

Sideritis.

Sideritis.

Non nihil abstergit, sed plurima pars eius est humida & mediocriter frigida, cū exigua astrictione, qua phlegmonem sedat & glutinat. Sideritis autē Achillea, dictā superās astrictione, sanguinis eruptio, ni, dysenteria, & muliebri profluuio est aptissima.

Sicyos, Cucumis.

Sicyos.

Cucumis.

Maturus tenuioris essentia est: immaturus crassioris. Sed incidendi & abstergendi facultas eis inest. Quare & urinam mouet, & corpus splendidū reddunt. Sunt enim humidi frigidiq; quasi in secundo ordine. At arefacta tum radix tum semē, siccant primo, aut secundo incipiente, ordine, magisq; abstergunt, q̄ ipsius melonis caro.

Sicyos agrios, Cucumis agrestis.

Cucumis agrestis.
Elaterium.

Tum ipse, tum eius succus quem elaterium uocāt, aut ex folijs & radicibus pressus, p̄tilis ad medicaciones existit. Elaterium itaq; mēses ciet, foetumq; perimit applicatum, ceu alia omnia amara et tenuium partium. Summè siquidem est amarū, calfacitq; in secundo ordine, ac proinde etiā digerit. Sic enim eo angina laborantes inungunt quidam cum melle aut oleo

ueteri. Bonū item est regio morbo affectis infusum cū lacte in nares. Similiter dolores capitis sanat. Radicis atq; foliorum succus similem sed imbecillio rem facultatem fortit. Radix etiam abstergit, digerit, emollitq;. Cortex potentius desiccatur.

Silphium, Laserpitium.

Silphij liquor calidissimus est. Necnō folia, caulis, & radix, strenuē etiam sunt calida, omnia tamē flatulentæ magis essentia sunt, ac proinde difficilia concoctu. Foris autē imposita corpori, efficaciora, liquor præcipuē admodum trahentem facultatem possidens. Attamen & excrescentias exerit, & quandam liquandi uim possidet.

*Silphium.
Laserpitium.*

Sifion.

Calidus & subamarus existit: Vnde urinam mouet, concoquit, menses prouocat, omnesq; uiscerum obstructions referat.

Sifion.

Sion.

Quantum gustu * aromaticum est, tātum etiam excoficientis facultatis est particeps. Quare & digerit, & urinam mouet, & calculos renū frangit, & menses euocat.

Sion.

Sisaron.

Sisari radix cocta stomacho grata est, & urinā mouet, secundo ordine excoficiens, cum amaritudine & astrictione leuicula.

Sisaron.

Sisymbrium.

Tenuium est partium, facultatisq; digerentis, calfacientis, & exiccantis in tertio ordine. Quidam semen cum uino exhibent singultientibus, torminaq; patientibus.

Sisymbrium.

Sisymbrium, quod Cardaminem uocant.

Siccum sit, tertij est ordinis calfacientium & excofientium: si humidum, uirideq;, secundi.

Cardamine.

Scandix.

LIII iij

Scandix.

A Greste est olus, subacre & amarū. Calfacit itaq; & siccat secundo ordine intenso: ualenter mouet urinam: uisceraq; liberat obstructionibus.

Scilla.

Scilla.

A Dmodum quidem incidit: calfacit autem secundo ordine. Porro præstat eam assam aut elixam sumere, q; sic eius uehementia exoluatur.

Scolymos.

Scolymos.

R Adix eius, si quis illam in uino coctam bibat, graueolentem urinā abundanter elicit, foetoriq; alarum medet. Succus enim eius est purgatorius. Calfacit porro secundo & completo ordine, aut tertio incipiente: siccat uerò secundo.

Scordion.

Scordion.

N Onnihil amarum obtinet, & acerbū, & acre: ipsiusq; acrimonia, alij acrimoniæ est persimilis. Expurgat igitur, excalfacitq; uiscera: menses urinamq; prouocat: Conuulsa, rupta, doloresq; laterū ab obstructione & frigore obortos, epotū sanat: illitum uiride, magna uulnera glutinat: purgat sordida: inspersumq; aridum contumacia ad cicatricem per ducit.

Scorodon.

Scorodon, Allium.

Allium.

D Esiccat & excalfacit excessu q̄rto. Porro ophioscorodō, allium agreste est, domestico ualērius.

Scorodoprasson.

Scorodoprasson.

V T gustu & odore, sic uiribus inter allium & porrum mediam naturam sortitur.

Scorpiodes.

Scorpiodes.

E Xcalfacit ordine tertio. Desiccat secundo.

Smylax.

Smilax, Cactus arbor.

F Acultatis est uenenosæ.

Smyrna.

Smyrna, Myrrha.

Myrrha.

S Ecundi est ordinis calfacientium & exiccantium. Vnde capitis uulnera glutinat. Inest illi amaritas non exigua, qua foetum & lumbricos enecat, eijcitq;.

Habet etiam & abstergerendi uim moderatam. Quare ocularibus miscet medicamentis: & his quæ ad ueteretursum, atq; anhelationem administrantur.

V Smyrna Boice, Myrrha Beotia.
Im habet calfaciendi, fundendi, emolliendi.

Myrrha Beotia.

Smyrnium.

Smyrnium.

EX eodem genere cum apio est & petroselinò: fueritq; apio quidem ualidius, imbecillius uerò petroselino. Itaq; & urinas & menses proritat, calidum siccumq; tertio ordine.

Sonchus.

Sonchus.

DUm uiridis est, aquea terreaq; essentia constat, utraq; leuiter frigida: nam & astrictionis cuiusdam est particeps, & manifestè refrigerat, tum illitus, tum estus. At arefactus, terrestrior reddit, modicam asciscens caliditatem.

D Sparganium.
Esiccantis est facultatis.

Sparganium.

Spartum, Genista.

SParti (quo & uites alligant) tum fructus, tum succus uirgarum, ualentem trahendi uim possidet.

Spartum.
Genista.

Staphilinus, Pastinaca.

SAtiua imbecillior, agrestis ad omnia potètiore est. Urinas mensesq; puocat, abstergitq; nonnihil, quum herba quidem tota, tum uel maximè semen & radix.

Staphilinus.
Pastinaca.

Stachys.

CVstu est acris & amaro, tertijq; calfacientium ordinis. Vnde menses rationabiliter prouocat. Facit tamen abortum, atq; secundas eijcit.

Stachys.

Stoebe.

FRuctus eius & folia astringunt citra mordacitatē: desiccantq; in tertio ferè incipiente ordine. Quare decoctum eorum iniicitur dysentericis, auribusq; pure fluentibus: quod etiam magna uulnera glutinat, precipue cum uino atro & austero. Valenter enim desic-

Stoebe.

cat omnes præter naturam humiditates. Folia uiridia illita erumpentem sanguinem suppressunt, suffusionibusq; oculorum ex ictu medentur.

Stoechas.

Stoechas.

Ammara est & mediocriter subastringens, quum nimirum ex terrena essentia frigida exigua: & extenuata altera terrena copiosa, constet. Quare obstructione liberat, extenuat, extergit, roboratq; & uiscera & uniuersum corpus.

Stratiotes.

Stratiotes.

Aquaticus quidem humida & frigida facultate est: terrestris uero, nonnihil habet astrictionis. Proinde & ulcera glutinat.

Struthion.

Struthion.

Radix eius est acris, calida, siccaq; temperamento, ex quarto prope modum ordine excalfaciendum. Sed & abstergit, & irritat, proinde & sternutationem prouocat.

Styrax.

Styrax.

Excalfacit, emollit, concoquit. Quamobrem tussis, catarrho, pituitæ destillationibus, raucedinibusq; auxiliatur. Tum menses, seu potum, seu admotum placet. Combusti eius fuligo, thuris fuligini est similis.

Syca, Ficus.

Syca.
Ficus.

Aridæ excalfaciunt ordine primo, aut secundo incipiente: habentq; partium tenuitatem quandam: quare tubercula dura concoquunt, digeruntq; tum ipsæ, tum ipsarum decoctum. Verum ubi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea: ubi uero plus digerere, hordeacea. Panis horum in medio. Porro quæ sunt pinguiore, magis possunt concoquere: quæ acriore, magis tum extergere, tum digerere. Ficus uirides, imbecilliores sunt. Vtræq; tamen & sicca & humida aluum subducunt.

Syce, Ficus arbor.

Syce.

Ficus arbor.

Calida, tenuiumq; partium temperaturæ est, sicut

Indicant tum liquor eius, tum foliorum succus. Valenter enim calfacit uterq;. Itaq; non mordicat tantū, aut uehementer absterget, sed & ulcerat, & ora uasorū re-ferat, & uerrucas extirpat. Quin & uim purgatoriā ha-bet. Porro lachryma & succus agrestis ficus, quam ca-prificum uocant, ad omnia, q̄ satiuæ, ualentior est. Ce-terū ipsarum surculi adeo calidi sunt, atq; tenuium partiū, ut carnes bubulas duras, si coquendis adijcian-tur, friabiles ac teneras reddant.

Caprificus.

Symphytum petræum.

Habet quandam uim incidendi, qua collectum in thorace pulmoneq; pus expurgare potest: ac si-mul cōtrahendi facultatis est particeps, qua eiectioni-bus sanguinis auxiliatur: estq; humidū, ac non imodi-cè calidum, unde & dulce apparet, atq; odoratu iucun-dum. Ad hæc, mansum sitim extinguit, & arterię sanat asperitates. Liquet igitur ipsum etiā & digerere, & con-stringere posse. Vnde & enterocœlijs imponitur, et ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur.

Symphytum petræum.

Symphyton magnum.

Similem dicto uim habet. Cæterū neq; uidet dul-ce, neq; odoratum. Est uerò secundum uiscositatē mordacitatemq; scillæ simile

Symphytum magnum.

Spondylon.

Fluctus eius acris & incidens est: itaq; ad asthma & comitalem morbum aptum est medicamen. Prodest & aurigini. At radix ultra iam dicta, fistularū callos tollit, si sit circūrasa. Floris succus, ad diuturnio-ra aurium ulcera conueniens reponitur.

Spondylon.

Schinos, Lentiscus.

Ex aquea essentia leuiter calida, & terrena frigida non pauca, constat. Desiccatur itaq; secundo ordine completo, aut tertio incipiēte: in caloris frigorisq; me-dio consistens, quodāmodo. Astringit autem ex æquo, moderateq; omnibus partibus suis. Succus bibitur &

Schinos.

per se, & cum alijs medicamentis, quæ dysenterias & alui affectus sanāt. Quin & ad sanguinis expuitiones, flores miliebres, necnō sedis uuluxq; p̄cidentias idoneus est, utpote ad hypocistida nōnihil accedēs p̄pe.

Schinu anthos, Schini flos.

Schini flos.

MOdicè calfacit, modicèq; etiam astringit, nec plānè à tenuitatis natura est alienus. Quare urinam & menses mouet, siue potione, siue fomēto adhibitus. Prodest etiam iecoris, stomachi, & uentris inflammationibus. Cæterū magis astringit radix: quanq̄, flos etiam astringat omnibus partibus suis. Proinde medicamentis quæ hæmoptoicis exhibentur, miscetur.

Schoenos leia, Iuncus læuis.

Schoenos leia.
Iuncus læuis.

Quidam oxyschoenos, alius oligoschoenus dicitur: gracilior duriorq; oxyschoenos, crassior laxiorq; oligoschoenos. Fructus huius somnū conciliat. Oxyschoeni autē duæ sunt species: altera sterilis, cuius nullus usus in medicina: altera quæ fert semen somni cōciliatiuū, sed minus q̄ oligoschoeni. Vtrūq; si cum uino bibatur, uentris fluxus desiccat, & muliebri profluuium rubrum sistit. Est itaq; eorum temperies composita ex terrena essentia leuiter frigida, & aquea leuiter calida.

Terminthos, Terebinthus.

Terminthos.
Terebinthus.

Cortex, folia, & fructus eius astringunt, & secūdo ordine excalfaciunt: unde etiam q̄ siccent, liquet. Porro fructus aridus propinquus est tertio ordini desiccantium: calfacitq; ualenter. Quare & urinam prouocat, & lienibus auxiliatur.

Teutlon, Beta.

Teutlon.
Beta.

Nitrosæ facultatis est particeps, qua tum digerit, tum extergit, & per nares expurgat. Cæterū cocta nitrositatem exuit, euaditq; leniter digerens. Ad detergendum tamen, digerendumq; ualidior est beta alba.

Teucrium.

Incidit et tenuium est partiū: quare lienes sanat. *Ac Theucrlum.*
 Exiccat quidē in tertio, calfacit autē secūdo ordine.

Thephra, Cinis.

EX partibus cum terrenis, tum etiā fuliginosis (que *Tephra.*
 & tenues sunt, & cum aqua in qua macerati prius *Cinis.*
 fuerint cineres, excolantur) constat. Pro materiæ tamē
 combustæ differentia, cineris temperies uariat. Quare
 haud scio qua ratione Dioscorides astringere cineres *Dioscorides*
 omnes prodiderit: quum ficulneus cinis eiusmodi om *fuggillatur.*
 nis qualitatē sit expers: nimirum ipsa arbore nulla par
 te sui acerbam quā alitatē reddente. At ex acerbis lignis
 confectus cinis, non parum quidē astringit; meminiq;
 me eo aliquando sanguinis suppressisse eruptionē. Ve
 rū nullus unq; ad tale uti ficulneo audeat. Siquidem
 hic acrimonię plurimum, urentisq; facultatis obtinet,
 mistæ abstersioni. Est & calx cineris quedam species, *Calx.*
 cæterū tenuioris essentiæ, q̃ qui ex lignis fit. Porro
 elota, medicamen est citra morsum desiccās, magisq;
 si bis ter ue lauetur. Cæterū si marina aqua abluta
 sit, admodum digerit.

Telephium.

EXiccandi & detergendi facultate est, non tamen *Telephium.*
 insigniter calida, sed forsan secundi ordinis. Desic
 cat etiam secundo, intenso tamen, aut tertij principio.
 Proinde ad putrida ulcera congruit, & cum aceto u
 tranq; uiriliginem sanat.

Telis, Fœnum Græcum.

Calfacit secundo ordine, desiccāt primo. Proinde *Telis.*
 feruentes phlegmonas irritat: quæ uerò minus *Fœnū Græcū.*
 sunt calide, & magis duræ, eas digerendo persanat.

Tithymalli.

Tithymalli omnes uincentem habent acrem, cali
 damq; potentiam, cum amaritudine quadam. Va
 lidissimus eorum est liquor: Dein fructus & folia. Po
 stremò radix. Hęc aceto incocta, sanat erosorum den

Tithymallus.

etiam dolores: liquor in ipsa foramina inditur. Cæterū si aliam partem contingat, cōtinuò adurit, ulceratq; illam, ex quarto existens calfacientiū ordine, qui ad exurētia pertinet. Sic pilos quoq; & uerrucas, & myrmecias, & pterygia, & thymos, cum oleo inūctus succus euellit: detergitq; lichenas & psoras, propter amaritudinem: necnon ulcerum phagedænica, anthracode, & gangrænode, quia ualēter calfacit & desiccāt, aliquādo iuuare poterit. Ad hæc, fistularū callos eximit. Prædicta omnia folia & fructus p̄stare possunt, sed ibecillius. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiēdos, uti assolēt. Celerrimè enī ab illis in uertiginē acti, ac semimortui redditi, ad aquæ superficiem feruntur. Porro cum septem sint rithymallorum genera, ualentissimus est quem characiam maremq; nominant: & fœmina nūcupata myrsinites; & qui in petris nascitur arborescens. Deinceps qui phlomo affimilis est: & cyparissias. Dein marinus: ac deniq; helioscopius. Proportione autem facultatis ipsorum, & cinis & lixiuium existet.

Pisces reddunt
vertiginosi, capiunturq; facile, foliis, fructibusq; rithymalli gustatis.

Tragacantha.

Tragacantha.

EMplasticam facultatem similem gummi obtinet, necnon obtusiozem acredinem. Ac sanè similiter illi desiccāt.

Tragion.

Tragion.

TRagion folia, fructus, lachrymaq; trahentis digerētisq; sunt facultatis. Est uerò & tenuium partiū, & facultate in principio tertij ordinis calida. Stipites, & infixa corporibus extrahit, lapides frangit, menses mouet, drachmę pondere potum. Porro in Creta sola nascitur, lentisco simile. Alterū minus, cuius folia scolopēdrio similia sunt, uisitur quidem multis in locis, sed non parū habet facultatis astringentis: ut & ad fluxionum affectus conueniat.

Tragoriganon.

DE hoc in sermone de organo diximus.

Tribolos,

Tragoriganā

EX humida essentia modicè frigida, & sicca nō me-
diocriter, cæterū similiter frigida, cōstat. Vnde
contra phlegmonarum generationes, & contra omnes
influxus congruit. Porro terrestris ipsius fructus, quū
tenuium sit partium, potus renū calculos conterit.

Tribolus.

Tripolion.

RAdix huius est acris, & facultate calida in ter-
tio excessu.

Tripolium.

Triphyllum.

Calfacit & siccat in tertio ordine, ut bitumen, cui
odore est simile. Proinde potū laterū dolores ab
obstructione natos iuuat: & urinam mēsesq; puocat.

Triphyllum.

Trichomanes.

EAdem præstat quæ adiantum.

Trichomanes.

Trychnon, Solanum, Strychnon

ESculentum quidem astringit, refrigeratq; in secū-
do ordine. At eorum quæ esui non sunt, unum qui-
dem dicitur Alicacabum, fructum habens rubeū, aci-
no uuxæ persimilem. Alterum uerò est fruticosum, à cō-
ciliando somno Hypnoticum appellatum. At tertium
q̄ ad insaniam adigat, omnes manicū nominant. Ali-
cacabum igitur, fructum fert ciendę urinæ idoneum,
compluribusq; facultatibus quæ ad iecur, uesicam, &
renes accōmodantur, miscetur. Solani uerò hypnotici
cortex radices, si cum uino bibatur, somnum accersit,
drachmæ pondere sumptus, existens succo papaueris
similis, nisi q̄ imbecillior: utpote tertij refrigerantium
ordinis: quū ille sit quarti. Huius solani semen urinam
ciendi uim habet. Si plus tamen duodecim corymbis
hauseris, demētiā asciscet. Quod reliquū est ex solanis
propositis, est ad medicationes intra corpus, inutile.
Nam si quatuor eius drachmæ offerantur, mortem in-
ferēt: si pauciores, insaniam. Vna certè innoxie sumi-

Trychnon.

Solanum.

Strychnon.

Alicacabum.

Solanū Hyp-
noticum.

Solanum ma-
nicum.

tur: nihil tamen utile præstat. At foris corpori illitum, ulcera maligna perfanat. Verum ad talia, radicis cortex præfertur, desiccās secundo ordine iam completo, aut tertio incipiente; secundo autē incipiente refrigerās.

Hyacinthus.

Hyacinthus.

R Adix eius bulbosa est, desiccās primo ordine: secundo autem, aut initio tertij refrigerās. Fructus leuiter extergit, astringitq; unde & regio morbo laborantibus exhibetur in uino, ordine quidem tertio desiccans, at in medio caloris frigorisq; consistens.

Hydnon, Tuber terræ.

Hydnon.

Tuber terræ.

S Vbstantiam habet uincētem terrestrem quidem, sed cum paucula tenuitate permistam.

Hydropeperi.

Hydropeperi.

N On usque adeò calidum est, ut piper. Viridis ipsa herba cataplasmatibus instar imposita, sugillata & tumores induratos digerit.

Hyoscyamus, Altercum.

Hyoscyamus.
Altercum.

C Vi semen atrum est, insaniam ac soporē inducit: cui uerò mediocriter flauum, propinquam ei obtinet facultatem. Vtriq; tamen fugiendi sunt, ut deleterij & inutiles. At cui semē & flos est candidus, sanitati idoneus existit, ex tertio quodāmodo refrigeratiū ordine.

Hypericum.

Hypericum.

C Alfacit & siccat, essentia tenui, adeò ut mēses urinasq; puocet. Illitum uiride, ad cicatricē omnia perducit ulcera. Siccum contusumq; si inspergas, mollia, humida, & putrilaginosa sanabis. Sunt qui & ischiadicis bibendum propinent.

Hypecon.

Hypecon.

R Efrigerat tertio ordine, parūq; à papaue r distat.

Hypoglosson.

Hypoglosson.

R Adix eius & succus, emolliendi uim possident.

Hyssopum.

Hyssopum.

D Esiccat & excalfacit ordine tertio, sed tenuium est partium.

est partium.

Phaci, Lentesc.

Valenter astringunt, mediumq; tenent inter calorem & frigiditatem. Desiccant tamen in secundo ordine. Ipsum itaq; earum corpus siccatur & sistit aliu. Ceterum decoctum puocat. Proinde prior aqua abijci-
tur, ubi retentionis causa exhibentur.

Phaci.

Lentes.

Phacos, Lenticula palustris.

Humida frigidaq; temperaturæ existit, utrinq;
ex secundo ordine.

Lenticula pa-
lustris.

Phaleris.

Succus, semen, & folia eius, comode potari credun-
tur contra vesicæ dolores, ceu in se habeat tenue
quiddam & calidum.

Phaleris.

Phalangites.

Sic dicitur, qd morsis à phalangis auxilio sit. Est au-
tem facultatis tenuium partium, & exiccatis, qua-
re tormina lenit.

Phalangites.

Phlomis, Verbascum.

Huius herbae duæ sunt species. Quædam enim fo-
liis est candida; quædã uerò nigra. Rursus, albæ
quidem mas est, cuius folia angustiora; foemina cuius
maiora uisunt. Est & alia phlomis agrestis, flores ha-
bens aureos & luteos; necnò alia quam phlomida ap-
pellant. Priorum duarum radix acerbæ gustu est, et flu-
xionum affectibus prodest, atq; adeò dentium dolori-
bus: q; q; folia digerendi uim habent. Similiter & alia-
rum folia. Omnium quippè folia desiccandi & deter-
gendi uim possident.

Phlomis.

Verbascum.

Phlomis.

Phoenix, Palma.

Astrictorie facultatis est particeps oibus parti-
bus suis. Igitur ramorum succus austerus est, ex
aquea substantia tepida, & terrea frigida constans. Si-
milis facultatis est eius cerebrum, esui aptum. At fru-
ctus, et maximè, dulcis, non paruam obtinet caliditatē.

Phoenix.

Palma.

Tomus IIII. M m m m

Qui quidem quum edendo sit, magno est usui, non tã-
tũ foris impositus, ubi roborare, desiccare, contrahe-
re, stipareq; est consilium, sed tanquã cibis sumptus,
& simul cum alijs, & per se. Porro tenerum palmę ger-
men, eãdem cum eius cerebro facultatem sortitur. At
cortex, astringit quidem, ac plus q̃ dicta omnia desic-
cat: * utpote minimum habens humiditatis. Quare ad
ulcera putrescentia, laxatos articulos, hepatis & uentri-
culi imbecillitates eo itus & foris administrato utunt̃.
Radix citra morsum desiccatur, cũ nōnulla astrictione.

Phormion.

Phormion.

PHormij semine cum melle ad leucomata * utunt̃.
Sed spicula etiam extrahere creditur: ueluti & ipsa
herba. Quare tenuium partium, & attrahendi digerendi-
q; potentiam obtinet.

Phu.

Phu.

ODorata quodammodo eius est radix, nardo ui-
ribus similis: ad pleraq; tamen infirmior. Mouet
autem urinam, ut nardus Gallica.

Phycos, Alga.

Phycos.

Alga.

EX mari exēptus & uirens, siccatur refrigeratq; in se-
cũdo ordine: habet enim quiddã modicẽ acerbũ.

Phyllitis.

Phyllitis.

ACerba quum sit, meritò & diarrhœas & dysen-
terias epota iuuat.

Folium mala-
bathri.

Phyllon malabathru, Folium malabathri.

Nardo similem possidet facultatem.

Chalbane, Galbanum.

Chalbane.
Galbanum.

SVccus est plantæ ferulaceæ, molliendi & digerendi
ui: Calfacit enim ordine tertio incipiente, aut cõ-
pleto secundo. Siccatur uerò secundo incipiente.

Chamædris.

Chamædris.

Vincentem habet qualitatem amaram. Est & quo-
dammodo acris. Quare meritò lienes colliquat;
urinas & menses prouocat: crassitudinẽ humorũ inci-

dit, uiscerumq; obstructiones repurgat. Calfacit itaq;
& desiccatur tertio ordine; plus tamē calfacit q̄ siccatur.

Chamæcissos.

Flos eius admodum amarus quā sit, iecur obstru-
ctum aperit, daturq; & coxendice laborantibus. Chamæcissos.

Chamælea.

Vincentem habet qualitatem amaram. Quare ad-
modum sordida ulcera, & quæ maximis inducta
sunt crustis, purgare cum melle est potens. Chamælea.

Chamæleuce.

Calfacit quodāmodo tertio ordine. Siccatur primo. Chamæleuce.

Chamæleon.

Nigri quidem radix, letale quiddam obtinet. Qua
re foris usus eius ad ea quæ absterfionem postu-
lant, administratur. Præterea digerentibus & emolliē-
tibus pharmacis commiscetur. Etenim siccatur tertio or-
dine. calfacit autem secundo absoluto. At albi radix q̄
non sit perinde acris, potui datur cū uino austero, mē-
sura oxybaphi, laborantibus aqua inter cutem. Chamæleon.

Chamæpitys.

Magis amara est quā acris. Quare abstergit, pur-
gatq; uiscera, magis quā calfacit. Proinde auri-
ginosis, & quibus facile iecur obstruitur, bonum reme-
dium est. Quin & urinam, & menses ducit tum pota-
tum illita cum melle. Viridis uulnera magna glutinat,
ulcera putrescētia sanat: durities uberum discutit. Est
enim in siccando tertij ordinis; in calfaciendo, secūdi. Chamæpitys.

Chamæsyce.

Abstergendi simul & acré uim possidet. Itaq; acro-
chordonas & myrmecias caules eius teneriores
intriti, quiq; ex eis profluit liquor, auferūt. Cum melle
crassas oculorum cicatrices detergunt: hebetudinem
uisus à crassitie ortam, adiuuant: sicuti & suffusio-
num principia. Chamæsyce.

Chelidonium.

Mmm ij

Chelidonium.

Admodū extergit & calfacit. Succus eius ad acū-
dum uisum est commodus. Quidam radicē eius
ad auriginem ab obstructione iecoris ortā in uino al-
bo cum aniso propinant. Mansa etiam confert dentiū
doloribus. Chelidoniū minus, quā maiori sit acrius,
celeriter cutem exulcerat, unguēs q; scabros eiicit. Suc-
cus eius p̄ nares purgat. Hæc itaq; siccāt & calfacit in
quarto incipiēte ordine. At chelidoniū maius in tertio.

Chondrila.

Chondrila.

Eiusdem ferē est facultatis cum seri; nisi q̄ amari-
uscula est, ac proinde siccantior.

Chondrus.

Chondrus.

Nutritum quidem est optimum, sicut triticū.
Ut medicamen autem emplasticæ est facultatis,
temperie tritico similis, nisi q̄ uiscosior existit, qua ra-
tione plus illo nutrit. Est porro hoc semen ueluti mate-
ria quædam idonea excipiendis medicamentis siccantibus.
Ipsū uerò ex numero concoquentiū existit, ut
triticum, quæ minimè profecto desiccant.

Chrysocome.

Chrysocome.

Radix uincentes habet acrem & astringentē qua-
litates. Quare nō admodū multi usus est. Quāq;
cocta in melicrato peripneumonijs & morbis hepatis
auxiliatur. Sed & menstruis purgandis est utilis.

Pseudodictamnium.

Pseudodictam-
num.

Vim dictamni sed imbecillam sortitur.

Psyllium.

Psyllium.

Semen habet admodum utile ex secundo refrigerā-
tium ordine. In desiccando uerò & humectando,
quodammodo est symmetrum.

Ocimum.

Ocimum.

Ex secundo est ordine calfaciētium. Habet autem
recrementitiā humiditatem: proinde nec com-
modum est, ut in corpus sumatur. At foris illitum, con-
coquit, digeritq;.

Ocimoides.

S Emen tenuium est partium, & citra morsum, facultatis desiccatoriae. Ocimoides.

GALENI PERGA

MENI DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM.

Facultatibus. Lib. IX.



QUOT plantarum sunt partes, fruct⁹, succi, & liquores, supra dicta sunt omnia. Nunc autem de reliquis medicamentis, quæ ex metallorū sunt genere, quæq; species ipsius terre existunt, differere propositū est. Post quæ deinceps nonnihil tractabitur, de partibus animalium, quibus ceu medicamentis ad curationes utimur. Meminisse autē in uniuersum oportet, astringentibus medicamentis facultatē inesse cum acribus pugnātiſsimā. Astringentia siquidē contrahunt, constipantq; & condensant substantiā nostram: ac proinde in quāuis corporis nostri partem extrinsecus imposita, continuo illam & rugosam, & contractā efficiunt: contra quæ acria, quæ admota cuti, perspicuè eam excalfaciunt, atq; in molem attollunt, rubente colore: ac si diutius immorentur, exulcerant. Hæc itaq; euidenter apparent incidere, excalfacere, à uicinisq; partibus ad sese sanguinē trahere. At astringentia, refrigerādo, contrahendo, cōstringendoq; in illis etiam cōtentum repellere. Porro combustorum nonnulla calidiora quæ antea redduntur, & ad gustum, & ad tactum, & ad eam quæ in usu ceruitur, facultatem. Quædam contra, ab uisione minus apparet calida, id quod tactu & usu manifestè discer-

Astringentium facultas.

Acrium facultas.

Uisum differtentia.

M m m m i ij

Combustorū
nullum est fri-
gidum.

nitur. Igitur acria multum caloris amittunt usta: quæ uerò non sunt eiusmodi, assumunt. Cæterum combustorum, nullum planè est frigidū. Relinquitur enim in illis ueluti acrimonia ignis, quæ per ablutiones extergitur: ita ut aqua in qua medicamentum ablutum fuerit, calidam facultatem comparet, eamq; tenuium partium: quod reliquum uerò est, sit terreum simul & frigidum, ac deficcare citra molestiam possit.

De differentiis terræ.

Terræ differē-
tiæ.

Terra communiter ac secundum agricolas dicitur illa quæ agriculturæ est aptissima: quæq; humore macerata lutum efficitur. Atq; in ea sanè plures differentias constituunt: aliam exempli gratia pinguem esse dicentes, ex qua lutum fit uiscosum & lentum. Aliā contrario modo dispositam, hoc est quæ lutum efficiat friabile. Atq; hoc unum uocabulū terræ est omnibus usitatum. Alterum est solis Philosophis usurpatū, quū aiunt elementa corporum esse terram, aquam, aerem, & ignem. Corpus nāq; extremè siccum, & frigidum, terram nuncupant. Secundum quos nullum compositorum corporum terra censetur elementaris. Aiunt tamen quanto corpore fuerint duriore, tãto magis ea esse terrea: contra q̃ agricolæ, qui eam exactissimā esse terram contendunt, quæ q̃ longissimè à saxi consistētia recesit. Pro hoc itaq; secundo significato, quod à Philosophis celebrat, tribus claudunt generibus differentię ipsius terræ. Quorum unū genus est lapis: alterum corpus metallicum: tertium terra quæ colitur.

Elementa cor-
porum.

De differentiis nominatæ passim terræ.

Terræ passim
vocatæ differe-
ntię com-
plures.

Terra itaq; uel Latinis etiā dicitur usitatè, quæ in-
iecta aqua soluitur, & fit lutum. Quæ sanè quas-
dam differentias sortitur: secundum propriam quidē
rationem: ut uidelicet pinguis si sit & uiscosa, quæ utiq;
omnino & atra colore est: aut contra, friabilis, & pin-
guitudinis expers, quam argillam appellant, quæ quo-

dammodo candidior existit: aut si inter has maximè contrarias habeatur. Secundum misturam autem alienorū corporum, ut dum dicimus lapidosam aut arenosam hanc esse terram. Porro talis substantia admista, segregatur larga aquę affusione, maceratione q; donec uniuersum perfluat. Sic enim qd lapidosum & arenosum est, subsidit, & terra exacta supernatat: in quem modū præparatur etiam & terra Lemnia, quam alij sphragida lemniam (ob impressum illi sigillum Dianę sacrū) cognominant. Quę quidem à Lemnia rubrica differt, q; contactu non contaminet, perinde ut illa: q; q; secundum collem in Lemno qui totus colore est fuluus, et in quo nec arbor, nec saxum, nec plāta nascitur, tantū huiusmodi terra uisitur. Cæterū eius tres differentię assignantur. Vna quam Lemniam sphragidem diximus: quam q; alij nemini, præter q; uni sacerdotissę, contingere fas est: altera uerò eius, quę milto est, siue rubrica: ac deniq; tertia, quę detergendi uim habet. Utuntur autē priore illa, ad uulnera uetera & cõtumacia, ad omnes q; ferarum morsus, sicuti aduersus medicamenta letalia. Distinguere itaq; ab ea terra quę colitur, medicamentosam oportet, qua ad curationes utimur. Tãt si eius quoq; quę colitur, si qua pinguis est, utilis ad curationes existit earum omnium partiū, quę desiccari postulant. Desiccandi nāq; uim terra quę uis possidet. Quum enim eius corpus natura sit siccū, omnino q; igneę substātię expers, citra mordacitatē exicat. Ad quod quidem etiam ablutio iuuat.

De terrę lotionē.

A Clauatur sanè terra omnis, ut lemnia. Primò si quidem maceratur aqua, quę nullā habet medicamentosę qualitatē suspicionem. Dein effunditur qd innatat, colligitur q; id quod est à lapidosis & arenosis secretum. Gustus autem docet, quę nam terra lotionē indigeat: aut quę minimè. At Lemnia, quum sit à sa-

Terrę purgandi ratio.

Lemniam sphragidis.
Lemniam rubricam.

Lemniam tres differentias.

Terra quę uim desiccandi uim possidet.

Terram ablutiōis di ratio.

M m m m i i j

certote abluta, rursus elui non exigit.

De terra Samia.

Samia terra.
Samius aster.

Selinusia terra
Chia terra.
Abstergentia
leuiter, produ-
cendæ esse car-
ni idonea.

AT Samiam ne lauari quidem est opus. Vimur autem altera eius specie magis, quã Samiũ aste-
ra cognominat, ad sanguinis expuitiones, muliebriaq;
profluuia, ueluti & Lemnio sigillo, necnõ aduersus ul-
cera dysenterica, prius q̃ putrescentia euadant. Quãq;
etiam & putrescentibus, quæ depascentia uocant, in-
terdum Lemnia ipsa profuit: iniecta quidem per arna
glossæ succum: bibita uerò ex oxycrato aquoso: prius
tamen ablutis ulceribus: idq; primò quidem, melicra-
to: dein autem, muria. Cæterũ Lemnia terra q̃ Samia
non parum efficacioribus esse uidetur uiribus. Quare
ab ea, quæ phlegmonē tentari cœperūt partes, exaspe-
rantur: quum tamen à Samia iuuētur. Ex qua & oleo
rosaceo mitissimum conficitur pharmacum, etiam cõ-
tra alias feruentes phlegmonas, incipiētesq; bubonas
& fluxiones podagricas, & ad ea breuiter, quæ refri-
gerare cum mitigatione est animus. Vnde constat Sa-
miã refrigerare. Quin & magis aerea eius essentia exi-
stet, collata ad lemniam: cuius argumento est leuitas.
Æstimabis porrò omnem terram medicaminosam.
tum leuitate, tum grauitate, præterea circa gustus aspe-
ritate & lenitate: ad hæc tenacitate & abstergendi po-
tētia. Tenax enim & uiscosus est Samius aster, quum
& Lemnia sphragis eiusmodi paululum quiddam ha-
beat. Abstersoriam quoq; facultatē moderatam obti-
nent & Selinusia terra, & Chia: quamobrem mulieres
quædam ihs ad faciem utuntur. Porrò quicquid abster-
git leuiter, producendæ ulcerum carni est idoneum.
Quod si etiam siccet, cicatrici inducēdæ est habile. At
omnium aptissima sunt & ad ulcera quę in summa cu-
tæ cõsistūt, & ad ambusta, illa quæ citra morsum exic-
cant, nec manifestò excalfaciunt, nec refrigerant. Quò
circa terra Selinusia et Chia, pulcherrima sunt ad am-

busta ulcerum remedia. Iam uero Cimolia terra, quā
 mistæ sit facultatis, partim sanè refrigerat, partim leui-
 ter digerit, operaturq; pro natura illorū quibus misce-
 tur. Verū unicè ambustis conuenit: ueluti & alię om-
 nes, illitę ex aceto, aut oxycrato: nimirum bullas existe-
 re prohibentes. Aduertendum tamen est, corpora mol-
 lia, ualentem medicaminum uim haud posse perferre:
 dura uerò posse. Terra itaq; misticionis expers, uim ha-
 bet citra morsum siccandi. Quum autem nullum repe-
 rire sit corpus à misticione alienū, inspiciendum est, qua-
 lem nam miscellam ipsa terra sortiatur. Si qua ergo in
 ea astrictio sentiatur, tantū frigiditatis assumpsit, quan-
 tum habet astrictionis. Sin acrimonia, tantum scito illi
 inesse caliditatis, quantū & acrimoniæ. Similiter, quā-
 to leuior terra ipsa fuerit, tantō acrior existit. Quanto
 grauior, tanto etiam syncerior terra. At proprium ter-
 ræ est, q̄ igni admota non soluitur, aut liquefcit: id q̄d
 accidit plumbo, stanno, auro, & argēto. Quum igitur
 audis nominare terram argenteam, aut auream, mini-
 mē intelligas ipsum argentum, aut aurum, per totū ter-
 ræ corpus misceri: sed particulas quasdam exiguas tū
 auri, tum argenti, illi coniunctas, atq; contiguas existe-
 re: easq; ab igne in fornacibus fusas coire inuicē. Eun-
 dem in modum quæ uitrum cōtinet terra, arenosa est.
 Sed & auri quoq; glebulę exiguę frequenter nō paruō
 numero in quibusdam repēiuntur arenis. Terrarum
 autē id genus omnium quæ in metallis sunt, ubi ab eis
 separatur id metalli aut gr̄is quod cōtinent, reliquię ui-
 dentur lapideæ, nec macerari, rigari ue, aut humectari
 per totam substantiam possunt: ut medicaminosa illa,
 quæ cum aqua in lutum degenerat: quæq; uiti circūli-
 ta nascentes in ea uermes interimit, unde ampelites uo-
 catur. Cadmia etenim ex illarum lapidearum est gene-
 re: neq; rigari potest. Terra Cretica admodum imbe-
 cilla est, multum habens, substantiæ aeris. Inest tamē

Cimolia terra.

Ambustis quæ
conferant.Corpus nullū
dari a misticio-
ne alienū.Terra igni ad-
mota nō sol-
uitur.Vitrum conti-
nens terra.Aurum repē-
ti in arenis.Ampelites ter-
ra.Cadmia.
Cretica terra.

Eretrienſis ter-
ra.

Pignites.

Boli Armeni
descriptio.

Febres peſtilē-
tes nō eſſe ve-
hementer cali-
das.

ei quādam citra morſum eius extergendi. Eretrienſis, q̄ Lemnia, ualentiorē poſſidet aſtrictionem: hactenus tamen ut nondū mordicet. Expedit uerò hanc terram bis terq̄; lauare, ut Cimoliā, quo moderatior redatur. Eam etiam urunt, ut ſubtiliorē, acriorem, & magis digerentem efficiant. Quòd ſi poſtea q̄ combuſta fuerit, abluatur, replendis & cicatrice inducendis ulceribus multò magis opitulatur. Cæterū quæ colore cinericio eſt, illi quæ alba exiſtit, præferē. Eſt & alia terra dicta Pignites, tota quidē facultate terrę Cimoligæ aſſimilis, cæterū atra colore, quēadmodū Ampelites. At terra, ſiue lapis, ſiue bolus Armenus, colore eſt pallido, promptiſſimēq̄; ſoluitur in læuorē omnino equalem, ut calx, ualidamq̄; deſiccandi uim poſſidet. Siquidem ad dyſenterias, uētris profluuiā, ſanguinis expuſiones, catarrhos, et putreſcentia oris ulcera, in primis competit. Quin & illos magnificē iuuat, quibus ex capite in thoracem fluxio decumbit. Quare & ijs quibus ex tali occaſione, anhelitus difficilis eſt, ualde auxiliat. Sed & eos, qui tabe laborant, adiuuat; ulcus enim ipſorum deſiccat. Maximè etiam confert Armenus bolus contra peſtilentes affectus. Ii ſiquidem uſu eius non perſanantur, qui prorsus immedicabiles ſunt. Cæterū bibitur ex uino albo, cōſiſtētia tenui, modicē diluto, ſi iſ qui morbo eſt correptus, aut planē febri careat, aut leuiter ea teneatur. Sin grauius febriat, admodum aqueo. Non ſunt tamen calore uehementes febres peſtilentiales.

De lapidibus.

EX corporibus ſponte natis ſunt lapides, hoc diuerſi à uulgo nuncupata terra, q̄ rigari nō ſuſtinent. Vires habent partim ſecundum totius ſubſtantiaę proprietatem: partim ſecundū qualitates effectrices. Nunc autem ſermo nobis eſto de illis uiribus, quæ ſecundum effectrices agunt qualitates: in quibus ſanē eſt & utē.

di ratio & methodus. Nam facultates quę proprietatis totius substantiæ ratione insunt, à methodo sunt atq; ratione alienæ, & per solam experientiam noscuntur. Nam cur hic lapis tacto uulnere unde sanguis prorumpit, cursum eius reperimat, haud nouimus. At cur hæmatites lapis in oculares facultates indatur, nouimus: qđ sit rationis inuentum. Nam si in cote oculari cum aqua eum teras, donec accipiat crassitudinem mellis, astringentem facultatem percipies. At didicisti qđ gliscentes etiãnum phlegmonas restringentibus medicamentis repercutere oporteat: ubi autem iam sanguis non fluit, astringentibus medicamentis digerentia adiungere, & sensim ad ipsa sola transire. Itaq; de ijs lapidibus prius disseram, qui mortarij aut cotis attritu, in liquorem soluuntur.

Ciferis, Pumex.

Pumex quidem abstergit. Sed Smiris acrimoniæ quiddam obtinet. Proinde causticis & desiccantibus facultatibus additur, eisq; quę curant gingiuas laxas. Pumex autem si comburatur, haud erit inferior Smire, eosdem ad usus.

Lapides qui in spongijs reperiuntur.

FRangendi uim obtinent, non tamē ita ualidam, ut lapides in uesica comminuant. Rumpunt eos tamē qui coguntur in renibus: ueluti qui aduehuntur ex Cappadocia.

Ostracites.

HVnc lapidem aiunt desiccandi ualenter facultatē habere, temperatam ex astrictione, acrimoniaq;: ut Geodem expurgare pupillas, uberumq; & testium sanare phlegmonas, inunctum ex aqua. At Cotis Naxiæ ramentum uirginibus māmās prohibet tumescere: sicuti & testes puerorum: tanquam facultatis refrigeratoriæ sit particeps.

Ophites.

Facultates quę proprietatis ratione insunt, eē a methodo alienas.
Hematites, lapis commode ocularibus medicamentis miscetur.
Phlegmonarū generalis curatio.

Ciferis.
Pumex.
Smiris.

Spongiarum lapides.

Ostracites.
Geodes.
Cotis Naxiæ ramentum.

Ophites.

198

G A L. P E R. D E

EXtergendi confringēdīq; uim possidet, ceu etiam uitrum. Admodū enim ipsum ex uino albo ac tenui epotum lapides uesicæ conterit, atq; confringit.

Iaspis uiridis.

Iaspis uiridis.

Ventriculum adhæsu, ipsiusq; os adiuuat. Porro Ophitem lapidem suspensum, iuuare morfos à uipera tradit. Sed eiusmodi facultates non constant methodo. Veluti etiam quum Hieracites & Indicus profluentem ex hæmorrhoidibus sanguinem sistunt.

Hieracites.

Indus lapis.

Sapphyrus.

Sapphyrus.

ICtos à Scorpione iuuare creditur.

Aphroselinus.

Aphroselinus.

Liberat comitali morbo uexatos: id quod nōdum sumus experti.

Thyites.

Dioscoridis Thyites.

Svbuiridis est ut Iaspis, soluiturq; in succum colore quidem lacteum, gustu uerò acrem: ac proinde nemo illum oculorū miscet medicamentis, nec fluxiones reperiētibus, nec ulcera sanantibus. Sed eo tantum utuntur ad purgandum & abstergēdum quæ pupillam absq; phlegmone offuscant: quales sunt cicatrices recentes, & pterygia non nimis dura.

Iudaicus.

Iudaicus lapis

Colore est candido, specie concinna, lineas habēs ceu torno ductas. Utunt ad uesicæ lapides in cocte soluentes, & ex aquæ calidæ tribus cyathis potui præbentes. Præcipuè uerò ad eos qui in renibus hærent, est efficax.

Pyrites.

Pyrites.

Validam possidet facultatem, eoq; utimur digerenti emplastro admisto. Adijcitur etiam ei & schistos. Ab hoc medicamine & pus sæpenumero, & consistentia grumosa in spatijs intermedijs musculorum nata, per halitum sunt degesta. Nisi autē dum in usum ueniunt, pollinis instar comminuantur hi omnes lapi-

des, ut profundū corporū quibus applicantur subeāt, assimiles manent istis marinis fluuiatilibusq; arenis: quæ & ipsæ cōmunem omnium lapidum uim possident. Siquidem exiccant tumentem ab aqua inter cutem carnem, si in ipsis excalfactis decumbat eger. Nō tamen ad aliud quippiam eis utimur.

Phrygius.

Hoc semper uitor combusto quidem ad ulcera putrida: idq; ipso aut p se, aut ex aceto, aut œnomete, aut oxycrato. Ad oculos uerò ex eo permisto alijs, medicamen siccū efficio. Validè enim desiccatur, habēs quiddam astrictionis simul & mordicationis.

Ageratus.

Astringit simul & digerit. Atq; astrictione quidē euidenter iuuat phlegmone columellas grauatas.

Assius.

Colore & consistentia est topho similis, friabilis, latusq; Innascitur ei quiddam instar farinæ tenuissimæ, qualis in molarum parietibus adhaerescit. Appellant hoc medicamen petræ Asiæ florem. Est uerò & tenuiū partium, ut sine morfu nimis fluidas carnes eliquet. At petra ipsa in qua nascitur, actionis uehementia est inferior. Habet etiam & salsedinem quādam ipse Asiæ petræ flos, ita ut inde uideatur ducere originem, quod ros ex mari in petram residens, à sole postea exiccetur.

Gagates.

Colore est atro, qui ubi igni fuerit admotus, persimilem bitumini odorem exhibet. Confert autem ad discutiendos flatulentos tumores consistentes in genu, diuturnosq; & ægrè curabiles: ac præterea cruenta uulnera glutinat. Est et lapis Thracius, cuius in hūc modum Nicander meminit.

Si lapis uratur candenti Thracius igne, & Post madefiat aqua, flagrabit totus: at idem

Arena quomodo, exiccet tumētē ab aqua inter cutē, carnem.

Phrygius lapis.

Ageratus.

Assius lapis.

Petræ Asiæ flos

Gagates.

Thracius lapis.

Nicander.

Mox oleo affuso penitus restinguitur, Et c.
Nullus tamen eius in medicina usus, nisi quod suffitu
abigit feras.

Magnitis.
Magnes.

A Magnitis, Heraclia, Magnes.
Ssimilem hæmatiti uim obtinet.

Arabius lapis.

Arabius.

L Apis est elephanto similis, desiccantis abstergen-
tisq; potentia.

Alabastrites.

Alabastrites.

C Ombustus in medicinæ usum ingreditur. Quidā
eum bibendum dant stomachicis.

Smiris.

Smiris.

V Ehementer quidē abstergit. Quare ipso ad annu-
los exculpandos utunt, & ad dentes purificādos.

Hæmatites, Galactites, & Melitites.

Hæmatites.
Galactites.
Melitites.

H æmatites & Galactites lapides, à colorum simi-
litudine, quos repræsentant, sic nominantur. Ille
siquidem sanguinis, hic in succum solutus, lacti uidet
similis. At Melitites, non à colore, sed à sapore mellis
talem nomenclaturam sortit. Quum igitur succus om-
nis dulcis à temperato calore proficiscatur, astringens
uerò à frigore, habebit sanè hæmatites lapis tantū fri-
giditatis, quantum et astrictionis: Melitites uerò tem-
peratam caliditatem: at mediam utriusq; temperiem.
Galactites. Meritò itaq; ocularibus medicamentis la-
pis hæmatites miscet. Ac solo eo uti possis supercilijs
exasperatis, si quidē cum phlegmone sint aspera red-
dita, ex ovo ipsum diluens: ac si magis, etiam per deco-
ctum scenigræci. Sin uerò citra phlegmonem, ex aqua.
Hic idem lapis similiter in cote cōtritus, sanguinis ex-
puitioni cōducit, ulceribusq; uniuersis. Porro ficcus,
reductusq; in tenuissimum pollinē, reprimat excrescē-
tia: ipsaq; oculorum ulcera solus per se cicatrice inclu-
dit attritus, cæterum aut affusus, aut inunctus.

Schistos.

Hæmatiti persimilem uim obtinet, sed infirmiorē Schistos: ac post eū Galactites. At Melitites nō nihil caliditatis asciuit. Vt igitur unusquisq; leuiter ac sensim ab hæmatitis facultate recedit, ita in usum oculorum accommodatur. Est tamē mitior. Etenim mitiora remedia partibus etiānum phlegmōe afflictis semper graviora sunt. Quæ quidem, liberis iam à phlegmone partibus, infirmiora sunt, q̃ ut persanare ualeant. Porro quum lapidibus omnibus cōmune sit, ut desiccant, quotquot ex ijs in succum soluti, aut redacti in pollinē, nullam continuò qualitātē in gustu obtinent, hos putandum est esse tum infirmissimos, tum mitissimos, tum minimē mordaces. At qui manifestam qualitātē exprimūt, n̄ pro qualitatis rōne potentiā possident. Ac si q̃dem astringtā, ad cōprimēdū, cōstringēdū, spissandū, & contrahendū: si uerò mordicēt, ad excalfaciēdū, digerendum, et colliquandum. Medij eorum sunt, qui absterget citra mordicationē. Igitur Hæmatites, Schistos, Galactites, & Melitites, in succū uertunt. Quāq; sunt & alij in succū solubiles, ut Moroxus qui in Ægypto nascit̃, omnium dictorū minimē qualitatis particeps. Quare tantū desiccandi uim possidet.

Metallica medicamenta.

Metallica medicamēta appellare medicis mos est, quorum generatio in metallis consistit, siue spontanea, siue per fornacem facta. Vt igitur lapidibus uniuersis, & terræ medicaminosæ cōmune est ut siccent, ita metallicis quoq; medicamentis omnibus. Est enim essentia eorum terrea, secundum elementaris terræ significatum. Porro caliditate diutina, mistam ex terra & aqua, nonnunq; etiam aere, substantiam uniēte, temperanteq; ac postea desiccante, metallicorum medicamentorum consistentiæ proueniunt. Quemadmodum igitur in differētij terræ plurima essentia terræ elementaris habetur, paulum uerò aeris, ita in metallicis mul

Schistos.
Galactites.
Melitites.

Lapides oī
communitē
siccant.

Moroxus.

Metallica quę
dicantur.

Metallica om
nia siccare.

Metallcis plu-
rimū igneē sub-
stantiæ esse im-
mistum.

tum igneæ substantiæ est immistum. In medio autem eorum sunt lapides. Proinde alia metallicorum semel aut bis, alia frequentius lota, idonea sunt, ut citra morsum exiccent. At locorum, in quibus hæc proueniunt, natura, pro ut plus, minusq; est frigida, alia plus, alia minus, cogit, congelatq;.

Hales, Sales.

Hales,
Sales.

S Al partim ex mari fit in salinis; partim è terra effoditur. Ceterū utriq; uis est assimilis, ipse uero, uidelicet exiccatrix. Porro aphronitri sapor amarus est, & abstergens; salis uerò, tanto in abstergendo inferior, quāto in astrictione superior. In utriusq; medio sapor nitri consistit.

Armeniacum.

Armeniacum.

V Im habet extergentem cum leuicula tum acrimonia, tum astrictione. Vnde meritò miscetur ocularibus facultatibus. Præterea ipso per se redacto in pollinem, atq; sicco, utuntur ad pilorum in supercilijs incrementum; ubi præ humorū acrimonia partim excidunt, partim nec crescunt, nec nutricantur.

Arrhenicum, Auripigmentum.

Arrhenicum.

Auripigmētū.

F Acultatis est causticæ, tam combustum, q̄ ustionis expers. Ceterū per ustionem tenuiorum partium efficitur. Utuntur porro ipso ad denudandam pilis quāuis particulam. Verūm si diutius hæreat, necuti quidem parcit.

Aphronitrum.

Aphronitrum.

A Phronitum ab aphonitro differt. Nitri enim spuma medicamentum exiccatoriū existit, aspectu triticeæ farinæ similis. Etenim alba est, non ut Asie petra flos cinericea. Aphonitrum uerò farinæ speciē nō habet, neq; solutū est, sed concretum & congelatum. Quod quidē adeò extergit, ut nō modò sordes expurgat, sed etiam pruritus sanet. At spuma nitri, eiusdem cum nitro est tum naturæ, tum facultatis; licet essentie tenuioris

Nitrum.

tenuioris. Dictum autē est paulō ante in medio aphro-
nitri et salis, facultatē nitri cōsistere. Aphronitro enim
sola inest uis detergendi; sali uerò etiam astringendi,
sed multò magis, q̄ detergendi.

Gypsum.

Gypsum quidē tum desiccatur, tum uires habet em-
plasticas. Quare siccis medicamētis quæ ad san-
guinis eruptiones accommodantur, utiliter commiscet̃.
Nam ipsum per sese lapidosum sit, coactum & conge-
latum. Ac proinde diluendum est oui tenui & candida
albugine, q̄ & ad ophthalmias est utilis, admisto illi te-
nuissimo farinæ triticeæ pollione, qui residet in mola-
rum parietibus. Excipere uerò quod sic maceratū est,
tenellis leporis pilis, aut q̄ pinde sint molles, expedit.

Gypsum ustum.

Non habet æquē emplasticā uim, ceterū tenuio-
rum est partium, & ualentius desiccatur. Quin &
repercussorium est, maximè si maceretur oxycrato.

Diphriges.

Mistam habet tum qualitātē, tum facultatē. Habet
enim in sese qddā & mediocriter astringēs, & medio-
criter acre: unde ulcerū rebellū optimū medicamē est.
Eo siquidē ad putrescētia oris ulcera, siue per se, siue cū
melle, cum detracta erat spuma, tum ad anginam, ubi
iam per astringentia medicamenta constitit quod in-
fluebat, ac breuiter ad columellam præcisam, puden-
diq; & ani ulcera cicatrice obducenda, sum q̄ foelici-
simè usus. Porro quo pacto adulterētur dictorum me-
dicamentorum singula, non uidetur pretium operæ
scribere, quum talia posse discere homines sceleratis-
simi in lucro ponant.

Theion, Sulfur.

Sulfur omne trahendi uim possidet, est q; tempera-
menti calidi, atq; essentia tenuis, adeò ut ad multa
uenenatorum animalium resistat, si siccū ictui insper-

Gypsum.

Albugo oui ad
ophthalmias
utilis.

Gypsum ustū.

Diphriges.

Adulteria me-
dicamentorum
cur doeenda
non sunt.Theion.
Sulphur.

gatur: aut cum salua, aut urina, aut oleo ueteri, aut mel-
le, aut resina terebinthina illinatur. Quin & pforas, &
lichenas, & lepras, non raro hoc medicamēto cum resi-
na terebinthina sanauit. Extergit enim omnes id genus
affectus, absq; hoc ut in profundum repellat.

Ios, Ærugo.

Ios.

Ærugo.

Epuloticonum
opera.

G Vstantibus acrem exhibet qualitatem, digerens,
detrahens, & liquans non teneram modò, sed &
duram carnem. Hallucinatur igitur qui talia medica-
menta, epulotica appellant, hoc est, quæ cicatricem in-
ducant: quum nimirum epulotica pharmaca contrahant,
constipent, & in calli morem ipsam carnem indurēt.
Quin & gustum mordicat ærugo, non tantum ulcera.
Quòd si pauculum eius cerato non pauco admisceas, id
quod ex ambobus mistum est, citra morsum extergit.

Cadmia.

Cadmia.

Cadmie diffe-
rentie.

Cadmie uires.

C Admia fit, ubi in fornacibus æs paratur: nempe
tota terra, aut lapide ex quo æs gignitur, in subli-
mem partem fornacis egerente ueluti fuliginem aut fa-
uillam quandam. In argenteis etiam metallis simili se-
cretionem efficitur. Quin & ex pyrite lapide in fornaci-
bus usto fit cadmia. Cæterum absq; fornace in Cypro
cadmia inuenitur, quam iure quispiam lapidem uocet.
At eius quæ combusta est, aliam botryitin, aliam pla-
citin Medici nuncupant. Botryitin quidem, * quæ in
editioribus ipsius fornacis muris colligitur. Placitin ue-
rò, quæ in humilioribus. Ac liquet sanè Botryitin par-
tium esse tenuiorum: crassiorum uerò Placitin: utraq;
autem ui desiccandi, ac mediocriter digerendi prædi-
tam. Quæ autem colligitur in fornacibus, igneæ qua-
litatis necessariò etiam aliquid habet. Merito itaq; eā
abluentes, medicamen efficiunt mediocriter tum desic-
cans, tum extergens absq; mordicatione: utile ad caua
ulcera præhumida, & putrescentia, quæ in oculis & in
toto corpore habentur. Igitur respicientes ad tempera-

tam & mediam inter omnes excessus naturam, leuiter desiccatoriam abstersoriamq; cadmige inesse facultatem dicimus. In caliditatis autem et frigiditatis differentia, cadmia quodammodo temperata existit.

Cinnabari.

Modice acrem facultatem obtinet. Habet uero & astringentis quippiam.

Ciseris, Pumex.

In sarcotica medicamenta inditur, & ea quæ dentes extergunt, partim uestionem non expertus, partim etiam exustus: quandoquidem alijs omnibus combustis similiter, substantiæ tenuioris efficitur. Cæterum uestione quiddam acquirit acrimoniæ, quæ rursus lotionem exuit. Videri autem poterit, & conciliare splendorem, non tantum facultate, sed etiam asperitate: ueluti si smirnam, aut testam tritam admoueas. Eundem in modum cornua deusta dentes reddunt splendidos.

Conia, Lixiuum ex cinere.

Abluto cinere fit. Cinerem autem, uistorum corporum reliquias Latini nuncupant. Fit ergo lixiuum pro eius quod eluitur natura. Cineris siquidem qui acrimoniam igneam habet acerrimam, ipsum quoque acerrimum est: eius quod tale non est, etiam moderatius. Quare & putrefacientibus medicamentis miscetur: utpote causticam facultatem possidens: sed propter substantiæ suæ tenuitatem, citra dolorem adurens.

Cyanos, Cæruleus.

Acrem possidet facultatem, ac tum detrahendi, tum digerendi, quæ cinnabari, potentiorē. Inest quoque ei nonnulla astringentio.

Lepis, Squama æris, & ferri.

Squama, alia est æris, medicamentum multo utilissimum: alia ferri, & stomomatis: alia denique quam nonnulli uocant helitin. Atque omnes sanè uehementer siccant. Cæterum helites principem in desiccando locum ob-

Nnn ij

Cinnabari.

Ciseris.
Pumex.

Exusta omnia
reddi substantiæ
tenuioris.

Cornua deusta
dentes reddunt
splendidos.

Conia.
Lixiuum
Cinis.

Cyanos.
Cæruleus lapis

Lepis.
Squama.
Helitis.

tinet: nam subtilissima omnium substantia est, nimirum quæ æruginis nonnihil assumpserit. Maiorē obtinet astrictionem squama ferri, & hac etiam maiorem stomomatis. Quamobrem ad contumacia ulcera meliores sunt quæ squama æris. Detrahit & liquat carnem potentius squama æris, & hac etiam ualentius helitis. Omnes autem squamæ non instrenuè mordaces sunt. Quare essentia ipsarum non est admodum tenuis. Siquidem inter ea quæ parem uim possident, minus est mordax quod est tenuius.

Mordacia minus esse quæ sunt tenuiora, si parem facultatē obtineant.

Lithargyros.

Lithargyros.

Desiccat quidem, sed omnium moderatissimè: & secundum alias tum qualitates, tum facultates, quodammodo in medio consistit. Modica tamē astringendi, abstergendi quæ facultas ei inest. Cæterum ad intertrigines femorum utilis medela est. Iure itaque medi ordinis in metallicis habebitur. Proinde frequenter utimur lithargyro ceu aliorum materia: sicuti in liquefactionibus ad pleraque medicamenta adhibemus ceram, tanquam materiam mediam eorum quæ ualentem possident facultatem.

Cera.

Nitrum.

Nitrum.

Aphronitrum inimicum stomacho.

Inter aphronitrum & salem uires medias sortitur. Cæterum ustum propius ad aphronitrum accedit, utpote ex uctione tenuius redditum. Desiccat itaque & digerit: quæ si intra corpus sumat, secat & extenuat crassos & lentos succos, multo potētius quæ sal. Aphronitrum uerò, nisi grauis urgeat necessitas, deuorandum non est, nimirum inimicum stomacho: quandoquidem plus etiam nitro incidit. Porro ad suffocantes fungos, nitro usto simul & non usto, & multo etiam magis eius spuma, uti consueuimus.

Melanteria.

Melanteria.

Valde quidem astringit, astringentia quæ omnia per modum tenuitate superat.

Melan graphicum, Atramentum scriptorium.

A Dmodum & ipsum desiccatur aqua solutum. Ulcera autem igni ambusta protinus illitum iuuat. & si acetum quoque habeat, multo magis.

Misy.

I N metallis ipsis, super chalcitim nascitur misy, ut ærugo super æs. Ac suspicor etiam fori longo tempore mutationem in chalcitim posse accipere. Quare mirum non est, tria hæc medicamina eiusdem genere facultatis esse, fori dico, & chalcitim, & misy, tenuitate & crassitudine inter se diuersa. Crassissimum enim est inter ipsa fori, tenuissimum misy, mediam utriusque facultatem habet chalcitis. Adurunt uniuersa hæc tria, & escharas efficiunt. Attamen non nihil etiam astringunt. Cæterum misy ad motum corporibus duris minus chalcitide mordicat, tametsi ea non minus sit calidum: id quod beneficio tenuitatis sortitur. Porro quum utraq; hæc in decoctionibus fundatur, & magis chalcitis, quam misy, fori tamen non liquefit: nimirum quia lapidosius sit, & uehementius compactum: sicuti rursus misy, quia à congenito calore elaboratius est, ac proinde ficcius chalcitide, ideo merito quoque liquefit ægrius.

Molibdæna, Plumbago.

S Imilem lithargyro uim possidet, tantum à media temperie ad frigidius paulum quid recedens. Sed neque abstergentis facultatis est particeps. Vtrumque autem medicamentum liquari potest, celerrimeque, ubi oleo non nihil aceti est additum. Liquantur tamen etiam admixta aqua, sed coctione longissima. Vidi equidem molibdænam proiectam plurimum, cum multis alijs lapidibus in ea uia quæ ad ergasteria ducit à Pergamo.

Molibdos, Plumbum.

F Acultatis est refrigeratoriæ. Siquidem non modò multam habet substantiam humidam à frigore congelatam, sed & aeriam: paucam autem terream. Igitur

N n n n iij

Atramentum
scriptorium.

Misy.

Ærugo.

Sori.

Chalcitis.

Molibdæna.

Plumbago.

Molibdos.

Plumbum.

**Plumbum vni
cū mole & pō
dere augetur.**

**Plumbeū mor
tariū conferre
ad conficiēda
medicamenta
refrigerātia.**

**Plūbi lamina
admota lūbis
nocturnas pol
lutiones coer
cet.**

**Plumbū vstū
qbus cōducit
affectibus.**

q plurimum habeat essentiae humidæ coactæ à frigo
re, indicium tibi esto, q ubi admotū est igni, celeriter
funditur fluitq. Quod uerò & aeris sit particeps, hoc
habeto signum. Omnium quæ nouimus unicum plū
bum tum mole ipsa, tum pondere augetur, si condatur
in ædibus subterraneis, aerem habentibus turbidum,
ita ut quæcunq; illic ponantur, celeriter situm contra
hant. Iam uerò si in mortario plumbeo liquorem quē
libet plumbeo pistillo cōtriueris, ita ut ex pistillo ipso,
atq; etiam mortario exprimatur etiam aliquis succus,
id quod ex utroq; conflabitur, multò erit frigidius, q
liquor infusus fuerat. Cæterum si uis magis refrigera
torium medicamen efficere oleum omphacinū, aut ro
saceum, aut mellinum, aut myrtinum, sit liquor is, quē
infundes: eritq; remedium optimū ad sedis phlegmo
nas cum ulcere aut rugis, & ad eas quæ in pudendis, te
stibus, uberibusq; consistunt: similiter aduersus cæte
ras omnes fluxiones quæ articulis accidunt. Sed & ul
ceribus rebellibus etiam utile est. Nam ad caneros eo
utens, uirtutem medicamēti miraberis. Quod si celeri
ter multum succi plumbei uelis colligere, conare in so
le terere, aut quocunq; certè modo aere excalfacto.
Multò autem utilissimum habebis medicamentum, si
affuso refrigerantium succorū aliquo teras, ut semper
uiui, cotyledonis, intybi, lactucæ, condriles, psylli, om
phacis, portulacæ. In laminam etiam diductum plum
bum, lumbisq; admotum, pollutionem per insomnia
coercet, nimirum haud obscurè refrigerās. Sed & bra
ctea tenuis probè ganglio illigata, ipsum dissipat. Illi
gabit autem probè quisquis ab Hippocrate didicerit
in ipsam noxam potius firmandum, q hinc uel inde.
Porrò plumbum ustum, ac dein ablutū, refrigerat, cō
fertq; ad implenda ulcera, eademq; cicatrice obducen
da. Conuenit & chironijs dictis, & omnibus cācrosis
ulceribus. Ante lotionem autem, ulceribus pertinaci

bus etiam auxilio est.

Ostracon, Testa.

DEsiccandi abstergendiq; uim possidet, maximè, quæ ex fornacibus est. Ex qua quidem præperata emplastrum, optimè cicatricem inducit.

Ostracon.
Testa.

Pompholyx, Spodium.

Pompholyx fit & i æris fornace, ueluti & cadmia: fitq; & dum in fornacibus cadmia uritur, nimirum ab ipsa cadmia in tectum fornacis quadam fauilla ascendente; quæ dum colligitur est pompholyx. Nā quod reflectens in pauimentum recidit, nominatur spodium. Cui uidetur similem habere facultatem, quod antispodium appellant. At ego illo usus sum nūquam, quum largè mihi semper pompholyx suppetere. Nec enim quisquam ubi hæc adsit, spodio uti uelit, nedum antispodio. Est autem pompholyx medicamentum propè omnium quæ citra morsum desiccant, si elota fuerit, præstantissimum. Quamobrem ad ulcera cæcrofa idonea est, & ad alia omnia maligna. Itaq; inditur collirijs quæ ad oculorum imponuntur fluxiones, quæq; bullas in eis natas curant. Præterea ad puendorum & sedis ulcera optimum est remedium.

Pompholyx.

Spodium.
Antispodium.

Pompholyx
quibus utilis

Sandarache.

Vrentis est facultatis, ut arsenicū. Meritò itaq; digerētibus facultatibus & extergētibus cōmiscet.

Sandarache.

Sandix.

Qua sit facultate prædita, in sermone de psimythio explicabitur.

Sandix.

Scoria.

Scoria omnis resiccatorium est medicamen: potissimum autem ferri. Siquidem ad leuorem redigēs ipsam in aceto q̄ acerrimo, posteaq; decoquens, ad aures iam pridem fluentes pure, ea uitor pro medicamento maximè exiccatorio.

Scoria.

Stimmi.

Nnan iij

Stimul.

Cum facultate desiccatoria habet astringentem adiunctam. Quamobrem & ocularibus medicamentis miscetur.

Stypteria schiste, & Strongyle, & hygra. Alumen fissile, rotundum, & humidum.

Stypteria.
Aluminis differentie.

Alumen uehementis sime astringit. Ceterum quoniam sit crassarum partium, tenuius quodammodo est quod uocatur fissile. Proximum est rotundum, & astragalotum: Admodum crassum est tum liquidum, tum placites & plinthites dictum.

Titanos, Calx.

Titanos.
Calx.

Vitruua quidem uehementer urit, adeo ut crustas efficiat: extincta uero protinus etiam crustam molitur & ipsa: at post diem unum & alterum minus urit, minusque inducere crustam potest. At uero temporis progressu prosum nec crustam quidem gignere ualet, tametsi etiamnum calfaciat, carnemque liquet. Porro si lauetur in aqua, suam mordacitatem exuit, efficitque nuncupatum lixiuium. At ipsa absque morfu desiccatur.

Hydrargyros, Argentum uiuum.

Hydrargyros.
Argentum uiuum.

Non est ex sponte nascentibus medicamentis, sed ex his quae parantur, ueluti psimythium, arugo, psoricum, lythargyros. Caeterum interimat ne deuoratum aut admotum extrinsecus, nondum feci periculum.

Phycos.

Phycos.

Facultatem eius, ubi de psimythio age, exponam. Chalcanthos, Atramentum futorium.

Chalcanthos.
Atramentum futorium.

Chalcanthos (qui in Cypro ex uiridi quadam aqua concrescit) extrema sui parte in chalcitum temporis processu degenerat. Habet autem cum astringentem maximam, caliditatem non uulgarem coniunctam. Unde omnium maxime condire seruareque carnes humidam potest: nimirum caliditate humiditatem absumens, astringentemque substantiam contrahens, atque constipans. Constringit itaque, siccatur, & contrahit in sese totius substantiam carnis.

M Chalcitis. Iftas habet astringentem acremq; facultates. Ce-
terum uincit acris, utpote adeò uehemens, ut carnem
urat, necnon inducat escharā. Vftum hoc medicamen-
minus mordicat, nō tñ minus deficcat. Verum non pa-
rum aftrictionis remittit. Itaq; melior est undequa; q;
chalcitis tum adufta, tum lota: quum euadat sic minus
mordax.

Chalcitis.

H Chalcos cecaumenos, Æs uftum. Abet & acrimoniam quādam, sed & aftrictionis
est particeps. Proinde si lauetur, pulcherrimū est
medicamen cicatrici inducendæ.

Chalcos ce-
caumenos.
Æs uftum.

T Chalcu anthos, Flos æris. Enuioris effentia; est q̃ aut æs uftū, aut squama.
Quare ex eo factis collyrijs extergunt, auferūtq;
superciliorum magnas asperitates.

Chalcu anthos
Flos æris.

C Chryfocolla. Arnem liquat, non tamen ualēter mordicat: q̃ q̃
fit facultate admodū digerente, exiccanteq;. Pre-
parare autem hāc chryfocollā debes tempore æftiuo,
aut aere prorsus calido: urinam pueri, mortario & pi-
ftillo, utroq; ex rubro ære, ꝑtundens. Hoc medicamē-
tum aptiffimum est ulceribus contumacibus, tum per
fe, tum alijs miftum. Nam quanto plus q̃ chryfocolla
metallica deficcat citra morfum, tanto etiam ipsam
excellit tenuitate.

Chryfocolla
duplex.

S Pfmithium, Ceruffa. I ex acri aceto foluatur, gustu tamē neq; acre erit,
neq; mordax, sed emplasticū, & refrigeratorium.
Ceruffa adufta, in sandyca tranfit, medicamentū feip-
fo tenuius, non tamē excalfaciēs. Phycos autē feruata
ceruffæ frigiditate, tenuitatem affumpfit.

Pfmithium.
Ceruffa.
Sandyx.
Phycos.

C Pforicum. Onficitur dupla chalcite admifta lithargyro: an-
te tamē utrifq; acerrimo aceto solutis, ficq; in ol-

Pforicon.

lam nouam coniectis, quam fimo estate media diebus
quādraginta obrutam sepelies. Hoc medicamen ma-
gis desiccatorium est, minusq; chalcite mordax: quum
partibus sit tenuioribus.

GALENI PERGA- MENI DE SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber X.



PXPOSVIMVS igitur quinque
cōmētarijs prioribus qualitates quas
secundas appellant, in medicamētis
quæ effectricibus qualitatibus agūt,
pro earūdem effectricium specifica-
rumq; qualitatū mistura nasci. Ostē-
sum preterea est, quo pacto uniuersalis facultas unica
experientia inueniatur, neq; ea uulgari, sed quæ certis
adhibeatur limitationibus. Porro in sexto, septimo, &
oçtauo libro, materiam quæ ad plantas pertinet, expli-
cauimus: in nono autem, eam quæ circa terrena & la-
pidosa uersatur. Reliquum uerò nunc est, ut eam quæ
ab animalibus sumit in hoc decimo persequamur ma-
teriam. Nam ad finē undecimi agemus de ijs quæ pro-
uenientia in aqua, nec plantæ, nec terra, nec lapis, nec
animalia sunt.

Hæma, Sanguis.

Hæma.

Sanguis nullus
est frigidus.

Sanguis suillus,
temperie est hu-
mano persimi-
lis.

PRO natura animalium uariat. Huic siquidē anima-
li est liquidior: siccior illi: calidior alteri. Nullus au-
tem sanguis est frigidus.

Sanguis suillus.

HUMIDUS & minus calidus est, temperie humano
persimilis. Siquidem & carnes suum similes hu-

manis existunt. Vnde quidam ab hospitibus prauis appositas, auidissimè humanas carnes ederunt. Etenim ex ipso sanguine, tum generatio prima, tum postea nutritio ipsis carnibus constat. Itaque quisquis humanum sanguinem morbo alicui utilem esse ait, in suillo primum id comprobetur. Nam & si aliquatenus inferior is sit humano, saltem as simile quippiam efficiet quo cognito, ab humano plenior fore utilitatē sperabimus. Porro similia efficere posse similia, experti sumus. Nam columbæ sanguinem, qui capitis ossa cō fracta perforant, in crassum cerebri inuolucrum effundere assolent. Quidam autem, quum nō esset columba ad manum, palumbi sanguine est usus, sceleriterque successit. Alius turturem eundem ad usum applicans, nihil hominem lesit. Similibus siquidem ad eosdem affectus utimur, ubi quæ antea experti sumus non adsunt.

Hæma peristeras, Sanguis columbæ.

EO ad hyposphagmata in oculis consistentia quidam utuntur, uenis ad alarum exortū incis, quo sanguis calidus effluat, ut sic ad multos usus idem perducet animal. Alij pullorum tenerorum extractas penas, quæ humore redundant, in ipsum oculum expriment. Quamquam sunt nobis collyria uaria hyposphagmatis oculorum aptissima, cuiusmodi est quod plurimum recipit myrrhæ, & quod multum thuris admittit; necnon quæ ex croco conflantur. Quin & fœnigræci succus sanguini colūbino in hoc utique præstat. Preterea sexcentos noui eorū quibus Romæ perforata fuisse capitis ossa, nec quicquam ab usu rosacei, citra sanguinem columbinum, offensos. Quare id calidū sit æquè atque columbæ sanguis, necesse est. Cæterū præter moderationem caloris (cuius fortè contactu iuuat) leuiter etiam astringit. Itaque melius inuenire nihil possis in capite perforato, quam ut probo rosaceo utaris.

Hæma nycteridos, Sanguis uespertilionis.

Colūbinū sanguinem infundi per cranii fracturas.

Sanguis colūbinus hyposphagmatis cōfert.

Hyposphagmatis quæ cōueniant.

Rosaceum cōmode infundi per cranii fracturas, esseque nō minus calidum sanguine columbino.

Sanguis ves-
pertilionis.

Sanguis nullus
in totū est fri-
gidus.

Sanguis vini-
dium ranarū.

Gala.
Lactis optimi
notæ.

Lactis vsus.
Lac alteratur
omnium facil-
lime.
Lac muliebre
est homini fa-
miliarissimū.

SI ubi hoc sanguine axillas illeueris, postea chalcam-
thon aut cicutæ semen inspergas, Xenocrates qui-
dem ait, aut sub illis prorsum pilos nō prodituros, aut
certè lanuginosos. Alij uerò & puerorū pudendis san-
guinē uespertilionis illinūt, ut glabras illas partes con-
seruent. Ergo ex refrigeratione partis uehemēti, eiuf-
modi quippiā posse contingere, non est à ratione alie-
num. Non tamen adeò frigidæ facultatis est sanguis
uespertilionis; quum in totum nullus sanguis sit frigi-
dus. Porrò hædinum sanguinem seruēfactum cum pa-
ri aceti portione, hæmoptoicos iuuare prodidit etiam
Xenocrates. Quod remediū tutò experiri poteris, ubi
nullum aliorum ad manum suppetet.

Sanguis uiridium ranarum.

QUum assereret quidam illitum hunc prohibetur
rum quo minus euulsi semel palpebrarum re-
nascerentur pili, falsum esse id experimento didici-

Gala, Lac.

Perfectissimum lac, nempe qđ ab omni aliena qua-
litate est immune (hoc est odoris exps, aut exiguū
bonum odorem referens, præterea gustu suaue, paucu-
lam habens dulcedinē, sicuti & saluberrimus sanguis,
ex quo & lacti generatio cōstat) ad acres & mordaces
fluxiones est commodissimum, non abluēs modò eas
ratione feri ab afflictis particulis, sed etiam ob pingui-
tudinē corpora illinens, ut non in nuda cadat, quod
defluit. Porrò quum lac omnium alteretur facillimè,
præsertim si ambiēs fuerit calidus, multum à dicta fa-
cultate amittit, nisi p̄tinus quis ab uberibus effuso ip-
so calido utatur. Maximè igitur mulieris bene habitæ
& bonam uictus rationem seruantis, lacte utendum;
nam id humano corpori est longè familiarissimū. De-
inde aliorum animalium, quæ quidem ab humana na-
tura non longissimè absunt; id quod scies ex carniū
odore. Nam fastidiosus est eorum quæ multum diuer-

ſam habent temperiem, ut canis, lupi, leonis, pardalis, uulpis, hyænæ, urſi, & ſimiliū. Non iniucundus eſt eorum quæ nō porrō abſunt, ut ſuis, capræ, equæ, bouis, ouis, & aſinæ. Quocirca etiam homines docti experientia, caprino, ouillo, bubulo, aſininoq; lacte utuntur, & caſeos ex eis conficiunt, excepto aſinino. Nā id planè tenue eſt, & plenū humoris ſeroſi, ueluti bubulū craſſum; cæterū conſiſtentia medium caprillum eſt. At ſus crudum aqueumq; lac obtinet. Iam uerò lac omne ex tribus cōſtat eſſentijs, caſeoſa, ſeroſa, et pingui. Hāc plurimam habere conſpicitur bubulum, ex quo butyrum conficitur, facultatis concoquentis & relaxantis. Quare maximè illo utuntur ad parotidas et bubonas.

Serum lactis.

AT ſerum extergendi potentiam poſſidet, adhibeturq; ſubducendi uentris gratia, ac per clyſteres inijcitur, extergens & abluens ſine mordacitate acrimoniam inteſtinorum. Præterea ſi quis ulcera quæ ſanie infeſtantur acri, uice aquæ ſero colluat, optimè ſanè fecerit. Quæcunq; etiam medicamenta digerere ſolent ecchymomata, & atra, ea præſtat ſero q̃ aqua diluere. At quod lacti caſeoſum ineſt, illitū adhæret magis: ob idq; acrimoniam retūdit. Atq; ubi aliam quāpiam deſiccantem facultatem habuerit adiunctā, optimū eſt dyſenterix remedium, & oīum uentris acriū fluxionum. Eam autem accipit à lapidibus, aut etiam ferreis cylindris, qui prædecocto lacti inijciunt igniti. Ferrum ſiquidem aſtringentis facultatis etiam eſt par riceps. Porrō lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per ſe, tum cum mollium collyriorum quopiam, eſt utile; præterea ad hypopia & hypophagmata. Quin etiam palpebris extrinſecus, ubi qui ophthalmia laborant, ſomno ſeſe dabunt, impoſitū ſimul cum roſaceo, & ouo, phlegmonas eorum cōcoquet. Sed hoc eſto lac mulieris recens ex mamillis expreſſum. Infundimus

Lac aſininum eſt plenū humoris ſeroſi.
Lac bubulū.
Lac caprillū.
Lactis ſubſtantia triplex.

Serum lactis q̃ præſtat.

Caſeoſe lactis ſubſtantię uſus.

Ferri facultas.

Lactis uſus.

Lac collutum
anginā lenit.

Lac auxiliari
iis qui venena
erodentia vo-
rarunt.

ipsum & utero exulcerato. Sic eo & ad sedis & puden-
dorum ulcera utimur, & ad omnia breuiter, quæ leni-
ri postulant. Ea propter & cācrofis applicatur ulceri-
bus, medicamentis anodynis commistum, qualia sunt
quæ constant ex pompholyge. Collutum etiam, oris
phlegmonas mitigat: nec non tonsillas, columellā, an-
tiadas phlegmone affectas, ac proinde etiam anginam
lenit. Est itaq; medicamen leniens, totam quidem sub-
stantiam habens mordacitatis expertē, sed multo ma-
gis ubi concoctione moderata, potissima pars seri cō-
sumpta fuerit. Sic mihi uidentur etiam Medici ad ue-
nena quæ erosionem interimunt, lac ppinare: ueluti sunt
lepus marinus, & cantharis. Sunt etiam qui & meritō
id exhibent, ijs qui aconitum & thapsiā deuorauerunt.

Caseus.

Caseus.

Caseus inuete-
ratus ē acrior.

Vbi pinguitudo cū toto lacte concreuit, seroso dū-
taxat' humore per coagulationē secreto, pinguis
caseus efficitur. Qui quidem qualiscunq; sit, temporis
spatio acrimoniam acquirit, quam deprehendes gustu
& olfactu. Cæterum impensē acris inueteratus q; iam
redditus, maceratus q; decocto suillarum carniū, to-
phos arthriticorum discutit. At recēs caseus et mollis,
mirè uulnera glutinat: nam reperiendi uim possidet,
leuiter nimirum refrigerans. Cæterum oxygalacti-
nus, præter hæc, digerendi etiam quandam uim le-
nem obtinet.

Butyrum.

Butyri facul-
tas.

Facultatis est concoquentis, paulum etiam habēs
digerentis potentiæ, in medijs nimirum corpori-
bus secundum duritiem atq; mollitiem. Nam corpo-
rum planè durorum tumores præter naturam, hoc ne-
quit medicamen digerere. At quæ in mollibus sunt
phlegmone, eas & cōcoquit & digerit facilè. Nam pa-
rotidas, & bubonas, & oris inflammationes, prorsus il-
lo solo curamus: nimirum puerilibus corporibus, mu-

liebribusq; eas perpetiētib. Sed & gingiuis puero-
rum dentientiū assidue illitum, nihilo imbecillius mel-
le, extenuat exitum dentibus: ceterosq; oēs oris phleg-
monosos affectus, postea q̄ fluxio restiterit, digerit pa-
riter, concoquitq; Proinde cataplasmatibus inditur quæ
extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondrijs,
bubonibusq; Deuoratū etiam, distributumq; magni-
ficè confert expuitionibus ex pulmone, idq; in pleuri-
ticis peripneumonicisq; affectibus: cum hoc quod eos
etiam concoquat. Quod si solum lingatur, magis qui-
dem concoquit, uerū educit minus: si cum melle &
amaris amygdalis, plus educit, sed minus concoquit.

Pytia, Coagulum.

Coagulum omne acris & digerentis potentia est,
atq; etiam exiccatoria: nā necessariò id superio-
ra comitatur. Ac leporis quidem coagulum comitialē
morbum, si cum aceto bibatur, præterea profluuiū mu-
liebre sanare proditum est: necnon coactum in uētre
lac dissoluere: id quod nos sumus haud dubiè experti,
non solū in leporino, sed in aliorum etiam omniū ani-
malium coagulo. Sed & sanguinem in uentre concre-
tum simili modo epotum coagulum leporinum dissol-
uit, ac efficacius quidem ceteris, uerū non solū: quū
hoc omni sit commune coagulo.

Coagulum phocæ.

Hic nonnulli uires castorij tribuunt.

Chole, Fel.

Hic succus omnium qui in quoq; sunt animalium
calidissimus est. Ceterū pro uaria animalium
temperie, calor eius uariat. Sunt autem in uniuersum
quatuor in singulis animalium sanguine præditorum,
humores: sanguis uidelicet, pituita, & bilis tum flaua,
tum atra. Verū dum absolutè dicimus bilem, semp̄
intelligimus flauam, quæ in iecoris uesica colligitur.
At ipsam flauam bilem interdum Medici pallidā no-

Butyrum exte-
nuat ifan-ium
exitū dentibus.

Butyrum uora-
tū pleuriticis
expuitionibus
confert.

Pytia.
Coagulum.
Coaguli lepo-
rini facultates
insignes.

Coagulum oē
dissoluit lac et
sanguinē in vē-
tre concretū.

Chole.
Fel.
Humores san-
guine præditorū
omniū cōmu-
nes, sunt qua-
tuor.

Flauæ bilis pal-
lidæq; discri-
men.

Castratum ani-
mal reddi simi-
le foeminæ.

Bilis quo pa-
cto accomode-
tur oculis.

Aures pure flu-
entes, qua spe-
cie bilis iuuen-
tur.

Bilis differēti-
æ animalium
diuersitate.

minant. Sciendum tamen est flauam tanto esse pallida-
calidiorē, quanto & crassiorē. Nam seroso recremen-
to flauæ bili permisto, pallidam constitui contingit: si-
cuti & flauam plusculum excoactam, consistētia red-
di crassam, colore autem flauam. Quin & in animali-
bus apparet flaua quidem, ijs quæ magis sunt calida:
quæ uerò minus, pallida. Et ubi animalia calida, aut fa-
me, aut siti torquentur, ad atrū colorem uergit, interim
illum habens æruginosum, interim cæruleum, interim
accuratè fuscū. Porro ubi ocularia medicamenta pre-
parant, callionymi, scorpij marini, hyæng, galli, perdi-
cis, et aliorum quorūdam animalium bilem admiscēt.
Quare color eius est explorādus. Iam uerò taurorum
bilis calidior & ficior est, q̄ boum castratorum: nam
castratum animal semper simile redditur foeminæ, &
ijs quæ sunt etatis minoris. Itaq; ut hæc humore supe-
rant adulta & perfectā, uincunturq; ab iisdem calidita-
te: ad eūdem modum bos castratus à tauris. Vt igitur
urina à modica portione modicè pallere, & sitim fa-
memq; & multum laborē perpessis, flaua esse conspi-
citur: impletis uerò, atq; inebriatis, albicans: ita bilis
colores mutat. At uerò q̄ hic humor sit acris, hinc dis-
cas licet, q̄ referat hæmorrhoidas, q̄q; illis ipsis qui
utuntur mordicare percipitur. Ac proinde cauemus,
ne ad alium morbum, aut symptoma, bilē usurpemus
solam, atq; per se. Quippè dum oculis ipsam accomo-
damus, miscemus illi tum mel, tum foeniculi succum,
tum opobalsamum. Domesticarū suum bile (quæ im-
becillima omnium, ac maximè aquea existit) utuntur
quidam ad aurium ulcera: medicamento certè non re-
probo. Cæterū ubi ulcus diuturnum fuerit, ac mul-
tam saniem & pus cōtineat, etiam ficiorē bilem per-
feret, puta ouium, quæ paulò est acrior suilla: hac etiā
magis caprarum: cui adsimilis quodāmodo est urforū
& boum. At taurorum his ualentior est: inferior tamē
bile

bile hyænarum; et hæc quoq; inferior bile callionymi, et scorpij marini, & marine testudinis. Volatiliū biles oēs tum acriores sunt, tum sicciores q̄ quadrupedum; & inter ipsas quoq; uolucres, gallinarum & perdicū biles ad medicinæ usum probatiores habent. Miluorum uerò & aquilarum, impendio acres sunt: erodentesq;: quamobrem colore ærugineo uidentur, ac non nunquam atro. Licebit itaq; tibi secundum exigētiam affectuū, hæce differentias bilis methodo ad experientiam reducere.

Hydros, Sudor.

E Andem quam urina & materiam & modum generationis sortitur. Siquidem utriq; generatio ex bibito humore constat, ex calfacto simul in corpore, et biliosæ nonnihil substantiæ adeptæ. Verū sudor plus est elaboratus, utpote qui ad cutē usq; permeatis omnibus quæ intersunt partibus, peruenit. Sudores autē inter sese & urinas differre necesse est, tum p animalium tēperaturis, quæ & natura, & ætatum ratione nō parum à seinuicem sunt diuersæ: tū pro ambiētis nos aeris temperie. Quod sudor saluginosæ qualitatis sit particeps, gustus testimonio pbatur. Nā sepe numero nolentibus in os defluens, dictam qualitatem indicat. Sæpe uerò etiam non obscuram præfert amaritudinē. Sed color etiam, eius naturā designat. Nam sicuti urina naturalis modicè est pallida, sic & sudor. Porro tennes exercitatorum sordes, plus percipiūt q̄ sudor: minus autem digerunt. At ubi sudor illis p̄mixtus est, multum facultatis digerentis acquirunt. Quare tumores præter naturam discutiunt: ad phlegmonasq; uberrum, præstantissimo sunt remedio. Quod si sicciores esse sordes uideantur, cyprinum superungito: aut eodē ipsas, si ualde sint siccæ, subigito. Si uerò cyprinū ad manū non sit, rosaceū bonū miscuisse sufficit. Hoc medicamentū est admodū utile, ad restinguēdū & discuti-

Hydros.
Sudor.

Sudorē esse sal
uginosum.

Sordes exerci
tatorium.

tiendum lac à partu in mammis concreescens.

Vrina.

Vrina omnis,
facultate est ca-
lida.

Quanta est in animalibus bilis diuersitas, tanta item est in urinis. Atq; omnes quidem facultate sunt calidæ, sed plus tamen animalium calidorum; minus autem frigidorum.

Vrina humana.

Vrina huma-
na.

Hæc aliarum omnium est imbecillima, excepta illa quam reddunt porci domestici, quibus execti sunt testes. Quorum ut temperies, ita urina similis humanæ existit. At montanorum aprorum, ualida est, ut uel ex odore acerrimo cõstat. Sed et in animalibus ceteris ex odore uim eius conijcere licet. Nam degustare ipsorum urinas, planè fuerit abominandum; quum ne pueri quidem urinam uir quidã honestus uita pariter & moribus, ebibere sustinuerit, etiã si pestiferè egrotaret in Syria, ubi multi ab humanæ urine potione sese liberatos profitebantur. Etenim urina hominum, ut si quid aliud, extergendi uim obtinet; id quod satis fullo nes indicant, qui sordida uestium expurgat usu illius, atq; extergunt. Quod conspicati nonnulli Medici, ea psoras & lepras detergunt, pfunduntq; ulcera phumida, & sordida, multoq; magis, cõputrescentia. Sed & pudendis ubi sic afficiuntur, urinã infundunt, & auribus pure fluentibus. Quin & achoras & fursures ea curant, caput idẽtidem perfundentes. At nos hæc facere odimus, quum ad manum sint alia, quæ illis conducant, medicamenta. Quãq; ulcera digitorum pedis, maximè quæ ex illusione inflicta essent, sæpenumerò, ubi carerent phlegmone, et ipse urina curauit; idq; in seruis, et hominibus rusticis. Ceterũ medicamentum quod ex urina pueri cõficitur, quod quidam Chrysocollam appellat, quia eo ad auri glutinationem utuntur, ad ulcera difficilia sanatu optimũ esse assero. Fit autẽ id, ubi in mortario æris rubei, pistillo etiam ex rubeo ære confecto,

Vrine humane
potione multi
sefe liberatos
a pestiferi mor-
bo pfessi sunt.

Vrine humane
facultas.

Chrysocollæ fa-
ciendæ ratio.

puerilis urina tandiu sub calido coelo tunditur, donec ob eliquationē attritionemq; pistilli & mortarij, mellis crassitudinem contrahat.

Sielon, Saliua.

V Turina & bilis, sic etiam saliuā, sumpto quidem cibo, imbecilla est; ualida & acris eorum qui ingenti aut siti, aut inedia premuntur: in medio utriusq; est, eorum qui probè concoxerunt quidem, nōdum tamen cibum potum'ue hauserunt. Hac ergo saliuā nutrices pueris lichenas curant, paruum uidelicet digitū rigantes, ac deinde cutem affectam confricantes. Sed & triticum mandentes rustici non pauci furūculis imponunt: nam celeriter eos digerit, concoquitq;: quum si macerarent aqua, non eque prodesset. Ex quo liquet saliuā iuuandi robur adferre. Atq; corporibus mollibus, aut puerorum, panem, non triticum, imponunt ore cōmansum. Porro cōmansa omnia digerunt & sugillata, & cetera ecchymomata omnia, maximè ubi panis simul cum pauco radicula fuerit cōmansus. Iam uerò uniuersa substantia sua uel maximè aduersa est saliuā bestijs hominem interficientibus.

Stercus caninum.

S Tercus omne uim maximè digerentē obtinet. Cæterum canis, qui solis ossibus fuerit integrū biduū nutritus, durum, candidum minimeq; foetens stercus est: quod quidem exiccatum, redactumq; in pollinē, ad anginam, dysenteriam, & summè inueterata ulcera optimè accommodatur. Ad anginam quidem, ijs mistum, quæ alioqui huic affectui conueniunt: ad dysenteriam autem, iniectum lacti decocto, & quod filices candentes, aut cylindros ferreos extinxerit.

Stercus humanum.

S Tercus pueri siccū, & cum melle Attico ad læuorem tritum, illitumq;, sanat gutturis phlegmonas.

Stercus lupinum.

Oooo ij

Sielon.

Saliua ieiunientriculi ad quā conferat. Triticum mansum furūculos quæ celerissime concoquit.

Saliua humana aduersa bestiis hominem perimentibus.

Stercus caninum quibus affectibus conferat.

Stercus humanum.

Stercus lupinū
qbus conferat

Lupi & canes
quomō & me
iānt, & cacent.

Quidam lupinum stercus candidum, quale ubi ossa ederint, lupi solent excernere, quodq; non decidisset in terrā (lupi enī ut canes suspēso altero posteriorū crurum, & meiunt & cacāt, in eminente quopiam ex terra loco) aut uino albo, aut aqua distemperatum, colicis potandum dabat: nec tantū in ipsis paroxysmis, sed etiam in interuallis, si quidem uacarent phlegmone: felicissimeq; cedebat illi negotium. Verū illud etiā in eo mirabar, q; uel appensum illis uinculo confecto ex lana ouis à lupo laniatā, aut ex ceruina pelle, euidenter aliquoties iuuisset,

Stercus capril-
lum.

Stercus caprillum.

Omnium creberrimē utimur caprillo stercore, digerētis & acris facultatis: adeo ut induratis scirrhorum in modum tumoribus cōgruat, non lienis modo, sed etiam aliarum partium. Miscere tamen illi solemus farinam fabaceam, necnon oxycratum. Quin & ad aquam inter cutem, & ad spleneticos, uariē caprillo stercore utimur. Sed & ustum tenuioris quidem essentia, uerū haud manifestō redditur acrius. Quamobrem sanē ad alopecias cōgruit, & omnia uitia, quæ extergentia medicamenta postulant, ut psoras, lepras, lichenas, & hoc genus alia. Miscetur & digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt quæ accommodantur ad parotidas, & diuturniores bubonas. Est enim uis eius tū usti, tum non usti, abstesoria, & digerens, nec eam paruiam habet digerendi potentiam. Nam eo etiam ex acetō quidam medicus utebatur in agris ad uiperarū morsus, ac multo magis aliarum bestiarum: ac profectō ex ijs complures seruauit. Idem etiam ad auriginem spyrrathos ipsas propinauit ex uino: & ad profluuium muliebri cum thure apposuit. Acrius tamen est medicamentum, q; ut mulieres urbanas, aut pueros, aut omnino qui tenera sunt carne, sanare possit. Iam uerō animalium temperatura sicciorum, exiccantius stercus est,

Morsus a uiperā
stercus capril-
lum auxilio
est.

sicuti & calidiorū, magis excafactorium. Verū nū-
lum omnino stercus refrigerat, sicuti neq; ullum hume-
ctat. Pro natura etiam eorum quæ edūtur, multa repe-
ritur diuersitas. Proinde in hominibus maior est, q̄ in
cæteris animalibus; quandoquidem hoc animal diuer-
sissimis maximeq; uarijs utitur cibus.

Stercus bubulum.

Facultatem habet exiccatoriam, atq; attractoriam
etiam, ut sanè ostendit, dum apū, uesp̄arumq; mor-
sibus auxiliatur. Quidam autē medicus aqua inter cu-
tem laborātes bubulo stercore oblinens, in solē expo-
nebat. Idem partibus rusticorū phlegmone obsessis,
humidum illud Vere collectum, dum herbam boues
pascūtur, admouit. Est enim id moderatius alio, quod
à paleis comestis excernitur; ac proinde accommoda-
tius ad phlegmonas.

Stercus ouillum.

Ille idem medicus, ouīū utebatur stercore ad acro-
chordonas, & myrmecias, & thymos, & furuncu-
los duros, aceto uidelicet diluens. Quin & ulcerum
ambusta, ad cicatricem illo ducebat: id cerato rosaceo
commiscens.

Stercus columbinum.

Stercore columbarū nomadum sicco, trito, & cri-
brato, unā cum nasturtij semine, uice napyos utor,
ad ea quæ rubrificari postulant: nēpe ad omnes inue-
teratos affectus, cuiusmodi sunt coxēdix, hemicrania,
scotomata, uertigines, cephalæa, & in lateribus, scapu-
lis, ceruice, ac lumbis, antiqui dolores: nec non nephri-
tides, affectus coeliacī, & podagricæ arthritides: quan-
do in articulis nondū concreti sunt tophi. Est autē hoc
stercus minimè foetidum, præcipuè si sit arefactum.

Gallinaceum stercus.

Tritum, pp̄inatumq; cum tribus quatuor ue oxy-
crati aut oxymelitis cyathis, eos celeriter iuuat,

Stercus nullū
nec refrigerat,
nec humectat.

Stercus bubu-
lum vesp̄arum
morsibus auxi-
liatur.

Stercus ouillū,

Stercus colum-
binum quibus
auxiliatur affe-
ctibus.

Stercus galli-
nacenū.

O o o o iij

Exercitata o-
tiosis sicciora
sunt.

qui à comestis fungis anguntur: nimirum per uomitū
crassissimos humores eliciens. Est autem hoc stercus
minus calidum colūbino. Porro ut animalia quæ exer-
citantur, otiosis sicciora sunt: & quæ cibis utuntur cali-
dioribus siccioribusq;: ijs quæ frigidis atq; humidis:
sic etiam eorum & excrementa, & partes. Quare colū-
barum domesticarū stercus multo imbecillius est eo,
quod à montanis excernitur. Gallinarū præterea quæ
conclusæ seruantur, & furfuribus alūtur, longè etiam
infirmius stercus est, q̃ earum quæ in agris pascuntur.

Stercus anserum, & ciconiarum.

Stercus anseri-
num.

Stercus cico-
niarum.

ANserinum stercus præ nimia acrimonia inutile
est. Colligo etiam ita esse & accipitrum, & aquila-
rum. Sunt qui ciconiarum stercus morbo comitiali
mederi scriptitent. Quo epoto credulus quidam nihil
adiutus est.

Stercus murium.

Stercus muriū.

Sic enim & murium stercus alopecias curare pro-
ditum est.

Stercus crocodilorum terrestrium.

Stercus croco-
dilorum.

Stercus sturno-
rum.

Crocodilorum terrestrium stercus, & sturnorum,
cum solam oryzam ederint, utrūq; abstergēdi,
desiccādiq; moderatam facultatem sortitur: ac multo
moderatorem sturnorum stercus. Porro crocodilorū
stercus, quod mulierum iuxus pretiosum reddidit, ut à
facie ephelin tollit, ita & uiriliginem, & lichenas.

Rhypos, Sordes hominum.

Rhypos.
Sordes homi-
num.

Quod aurium sordes paronychys sit utilis, pro-
ditum est. Quæ uerò in tota cute puenit, illius
sordis quam paton uocant nō nihil actionem adiuuat.
utpote desiccandi uim habens, cum nonnulla calidita-
te. Porro ea sordes quæ lanis ouīū inhæret, ex qua cesy-
pon constat, similē butyro concoquendi uim possidet:
paulum etiam digerentis facultatis sortita.

Oesypon.

GALENI PERGA

MENI DE SIMPLICIVM
MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber XI.



LER Æq̃ ptes sunt animalibus uni-
uersis communes: nulla tamē est equē
communis, ut caro. Hanc enim habet
omne animal. Cæterum eam quæ re-
peritur in musculis, solam Medici car-
nis appellatione dignantur. Nam car-
nem uiscerum nonnulli parenchyma uocandam cen-
sent, propterea q̃ ex uenis effusus sanguis, circū uasa
omnia (ut ipsi arbitrantur) concreascit. Sed nos nomi-
num contentione neglecta, persequamur propieta-
tes particularum.

Caro uiperæ.

Non omnes animalium carnes hominem nutriūt,
sed quorūdam etiam letales sunt. Tum inter eas
quæ hominem nutriunt, quædam tantū sunt nutriti-
um: quædam etiam medicamētum. Nam uiperarum
carnes palam uidere est excalfacientes, & exiccantes,
ubi condiuntur, ceu anguillæ, oleo, sale, anetho, porro,
& aqua: horum omnium seruato modo. Quòd autem
totum corpus per cutim uacuent, uel hinc tibi discere
licet, q̃ elephantici quidam prorsus sint restituti, ex po-
tu uini, in quo uipera quædā fuerat extincta. Præterea
nos elephāticum quendā, misso prius sanguine, atraq̃
bile medicamento purgata, uiperis quas capiebat uti
iussimus, præparatis in olla, anguillarum more. Atq̃
ita sanatus est, euaporato per cutem affectu. Porro ui-
perarum caro, adeò ualentem obtinet desiccandi uim
ut quidam qui eam esitarūt, uehemētissima fuerint siti

Oooo iij

Carnem omne
animal possi-
det.Caro pprie q̃
dici mereatur.

Parenchyma.

Carnis uipe-
ræ facultas, et
cōcinnādē mo-
dus.Elephantiasis
curatio.Viperarū esus
sitim maximā
infert.

Viperę cur ap-
pellenur di-
psades.

Carnes anima-
liū cum cibis
mutari.

Viperę caput,
nō caudā abii-
cere oportet ad
cōficiendos ar-
tiscos theria-
cos.

Artiscos the-
riacos cōficiē-
di ratio.

Carnis viperę
vires.

Caeochymia
symptomata.

cruciati. Quamobrem eas dipsadas nomināt. Sunt ta-
men qui dicāt demorsos à uiperis satiari potu nō pos-
se, sed dirumpi potius q̄ liberari siti. Cauendum autē
est, ne ī locis mari proximis, saluginosis ue, uenemur
uiperas, seu ad esum, ceu ad Theriaces antidoti prepa-
rationem. Quum uerisimile sit, earum quæ in id genus
locis capiuntur, carnes salsas existere. Siquidem cum
cibis etiam animalium mutantur carnes. Porro quo-
niam ex more dū artiscos Theriacos paramus, non tā-
tū caput, sed earum etiam caudam abijcimus, subiit
mihi frequenter rationabile fortassis esse, caput quidē
totum abijci, ob uenenum quod ore continent; uerū
à ratione alienum esse adimere & caudam. Theriacos
autem ipsos artiscos sic preparamus. Purgatas illas in
aqua cum anetho elixamus tandiu, donec à carne sepa-
rari facilē possint spinæ. Mox pani purissimo, probē
cocta in clibano, salisq; & fermenti quod sit satis ha-
benti, ac breuiter reficcato, & ad læuorem trito necnō
macerato cum ipso uiperarum decocto, carnem prius
in mortario tufam miscemus. Postea uerō paruos ar-
tiscos fingentes, atq; in ædibus calidis & siccis siccan-
tes, in talibus eos tandem reponimus. Hos ergo ineun-
te æstate conficimus, sicuti & salem ex deustis uiperis,
quo potissimum tempore optima ipsarū est caro. Ut
mur eis postea cōtusis denuō & cribratis, rursusq; ad
læuorem redactis, adijcentes nonnihil & salis, ad sua-
uitatem compositi; cuius etiam aliquid ipsi theriacæ
inijcimus. Itaq; caro uiperę ficcatur, ualenterq; digerit;
excalfacit uerō mediocriter. Properat enim uis eius ad
cutem, per eam uidelicet, quę in corpore sunt recremē-
ta exigens. Quibus igitur copia mali succi in corpore
abundat, ijs pediculorum numerosa multitudo exoritur;
& à cute ceu quædam squama abscedit, deciditq; cu-
ticula extrema, ad quam utiq; solēt sisti crassi terrosiq;
humores; à quibus sanē psoræ, lepræ, & elephātes na-

scuntur. Quòd autem ad animalia cetera pertinet, pro
 portione qua in temperatura excedunt, & carnes quoque
 eorum differunt atque exuperant. Proinde talium anima-
 lium carnes perpetuò exhibere oportet, quale uolumus
 corpus humanum reddere. Nec parua existit carniū
 differentia, dum quasdam sale cōdimus. Nam interdū
 animalis temperie humidissimi, caro salita, longè exic-
 cātor euadit ea, quæ sicca natura existit. Verū inter
 eas quæ salitæ non sunt, siccior est asina, quæ in aqua
 est elixa. At uerò caro mustelæ, arefacta, ualenter dige-
 rit, desiccaturque: proinde morbo comitiali afflictos iuuat
 epota. Salitorum etiam heluorum carnem ad leuorum
 contritam, palos & spicula educere aiunt, impositam:
 sicuti & Mutulorum carnem ulceribus à mordēte ca-
 ne inflictis cōgruere. At cochlearū caro, prius in mor-
 tario contusa, ac postea ad læuorem redacta, omnium
 ualentissimè desiccatur partes superfluo humore graua-
 tas: adeò ut conueniat hydericis. Ipse autem humor so-
 lus, thuri, aut aloe, aut myrrhæ permixtus, quo ad cera-
 ti accipiat crassitiē, medicamen fit tenax, desiccaturque pu-
 rulentos aurium humores. Sed & fronti impositum he-
 ret, oculorum fluxiones exiccans. Quidam etiā ad pa-
 los eximendos utuntur totis unā testis ad læuorem tri-
 tis: alij ad sistendos menses. Carnes etiam solæ cum fa-
 rinæ polline trite, contusorum uulnera glutinant. Ipsa
 cochlearum humiditas pilos superciliorum præter na-
 turam habentes glutinat.

Pinguedo & adeps.

Differt à pinguedine adeps, quæ crassior sit: ac pro-
 pterea animantibus totam naturam terrosiorē ha-
 bentibus, ut bobus & capris, adeps prouenit: humidio-
 ribus autē, ut suis benè habitis, ipsa pinguedo. Pro-
 inde pinguedo celeriter in ignem posita, colliquescit:
 nec facile ubi semel liquata fuerit: rursus cōcrescit, aut
 cogitur. At adeps, nec facile funditur, liquescit uero &

hæc caro enina u-
orum

Carnes asinæ
 sunt sicciores
 elixis.
 Mustelæ caro
 epilepticis au-
 xiliatur.

Cochlearū car-
 nes, & succus.

Pinguedo.
 Adeps.

Dysentericæ au-
xiliatur capril-
lus adeps.

Adipum disse-
rentiæ.

Castratus ma-
sculus eiusdem
generis fœmi-
næ semp affi-
milatur.

fusus celerrimè congelatur. Porrò adeps suillus, alio-
rum omnium est humidissimus, ob idq; actione sua ui-
cinam oleo uim possidet: q̄q̄ oleo magis tum emol-
liat, tum concoquat: quamobrè cataplasmatibus quæ ad
phlegmonas accommodari solent, miscetur. Qui uerò
mordicationes perpetiuntur, aut in recto intestino, aut
in colo, ijs potius caprillum adipem q̄ suillum injici-
mus: nō q̄ plus acrimonias obtundat, sed q̄ concreascit
citius: suillus autem instar olei defluat. Quare capril-
lus potius dysentericis & tinesmosis injicitur, quando
morsum eorum mitigare est consilium. Quamq̄ ob te-
nuitatem essentia nonnulla magis acrimonias retun-
dunt, ubi in alto mordicatorum corporum, quod mole-
stum est, hæserit. Hac ratione adeps anserinus magis
obtundit quæ in alto corpore mordicant: præterea suil-
lo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaceo-
rum & gallinarū adeps. Porrò calidior semper & sic-
cior est masculorum animalium adeps: & horum ipso-
rum exectorum minus tum calidus, tum siccus. Quip-
pè mas castratus eiusdem semper generis fœminæ af-
similatur. Omnis igitur pinguedinis facultas est hume-
ctatoria & excafactoria humanorum corporum. Cæ-
terum pinguedo suis, ut ad nos quidem, largius hume-
ctare potest, sed nō æquè excafacere, sicuti neq; oleū:
talem quippè caliditatem obtinet, qualis spe catur in
nobis. Taurorū adeps suillo multo calidior & siccior
est. Sic & adeps uitulinus taurino minus tum calidus
est, tum siccus: & hœdorum q̄ caprarum. At caprarū
minus q̄ hircorum. Rursus taurorum minus q̄ leonū.
Nam horum adeps omnium propemodum adipe po-
tentius digerit. Quippè & caliditate exuperat, & par-
iū tenuitate. Quare nimis ulcera & phlegmonas irri-
tat. Inueteratis tamen tumoribus, atq; scirrhi in morē
duratis, tum neruorū curuaturis aptissimus est, in qui-
bus sanè suillus uidetur minimè efficax. Taurinus au-

tem, quanto calidior sicciorq; suillo est, tãto superatur à leonino. Itaq; tanquã in medio consistens, meritò utriq; medicamentorum miscetur generi, & ei scilicet quod scirrhis medet, & ei quod phlegmonas ad supurationem perducit, cuiusmodi est tetrapharmacum, ex cera, resina, pice, & adipe constans. Verũ omnibus quibus caro est mollior, adeps suillus cõuenit magis. Duram autem & siccam habentibus, taurinus. At uerò adeps dũ inueterascit, seipso & calidior, & acrior, & tenuior efficitur: ac proinde ualētius siccans & digerens, id quod omnibus inueterascentibus accidit, nisi interim computrescant. Porrò urforum adipem alopecias curare uerè est proditum: quũ tamen ad eum affectum probatiora remedia habeamus.

Myelos, Medulla.

Vim habet corpora indurata & scirrhusa emolliendi. Optimam semper sum expertus ceruinã: dein uitulina. At hircorum et taurorum, tum acrior est, tũ siccior. Itaq; durities scirrhusas mollire nequit. Ex uitulina igitur et ceruina pessi componuntur ad emolledos uteros. Et extrinsecus uteris medicamenta imponuntur, quæ ex medulla parantur, uim emolliendi habentia. Accipitur autem nō solũ medulla ex ossibus, quæ sanè re uera est medulla: sed ex spina etiam: quæ tũ durior, tum siccior est altera. Vtranq; autem hyeme collectam, in sicca editaq; domo cum folijs lauri siccis repono: ne uidelicet computrescat. At si quando ambiente existẽte calido, austrinoq;, medullas aut adipẽ uelis reponere, uteris ad id cubiculo q̃ maximè fieri poterit temperato, quodq; ad aquilonem obuersum, apertas habeat paruas fenestras, ut perpetuò flatus in spirantes excipiat.

Caput mænidum.

* **M**ænidum sale inueteratarũ capitibus uistis ad sedis fissuras utebatur quidã: et ad columellam

Myelos.
Medulla.

Medullas reponendi ratio.

Caput mænidum.

diu induratum. Videtur ergo uis illarum esse desiccatoria, non admodum acris. * Nam ut acrimonia adustarum nonnullis inest, sic omnibus uis exiccandi.

Caput leporinum.

Caput leporis

Alius capite leporis usto utebatur ad alopecias cum adipe ursino.

Caput saurarum.

Caput sauræ

Sauræ caput contritum quidam palos & spicula extrahere prodiderunt memoriæ: tum myrmecias, acrochordonas, & clauos eximere.

Cerebrum leporis.

Cerebrum leporis.

ID attritum & esum, utile dicimus esse pueris detinentibus. Quidam etiā aduersus tremores utiliter edidit cerebrum hoc prodidere.

Cornua ceruina & caprina, usta.

Cornua ceruina & caprina usta.

Dentes candidos reddunt, fluidasq; gingiuas contrahunt. Quod si ceruinum ab ustione lauatur, dysenteriam, & sanguinis excreationem, præterea coeliacos affectus sanat. Aurigini etiam dicunt id esse utile. Ex quo quidem duo exhiberi cochlearia ad omnia ista præcipiunt. Quidam etiam ipsum miscuerunt collyrijs desiccantibus oculorum fluxiones.

Pulmo agninus & porcinus.

Pulmo agninus, porcinus, vulpinusq.

Intertrigines à calceamentis curare credit. At uulpinus si bibatur siccatus, asthmaticos iuuat.

Iecur canis rabidi.

Iecur canis rabidi.

Si assum edatur, remediū existere ijs qui ab ipso rabiente cane fuerint emorfi, quibusdā proditum est.

Iecur caprinum.

Iecur caprinū.

Quidam ipsum assantes, sanientq; excipientes fluentem, ea utuntur ad nyctalopas. Vaporem autem eius, dum elixatur, oculis apertis excipiendum præcipiunt. Quin & assum si edatur, & ad eosdem affectus accommodari aiunt, & eos qui comitiali morbo sunt obnoxij, coarguere. Idem potest hircinum hepar,

Iecur lacertæ.

E Rosis impositū dentibus, eos dolore liberare nō
nulli scriptis mandarunt. Iecur lacertæ.

Venter mergi.

Q Vod de hoc & de interna tunica uentriculi gal
linarum proditum est, id uanam esse promissio
nem comperimus. Venter mergi.

Castorium.

T Esticulos castoris uocant castorium, medicamen
& celebre & multi usus. Euidenter siquidem cal
facit. Quum autem calfacientia omnia, quæ consisten
tia sunt sicca, ubi contactæ substantiæ quippiam dige
runt, continuò etiam illa desiccant: manifestum utiq;
est, castorium etiam desiccare haud obscure: id quod
illi cum multis est medicamenti cōmune. Quia uerò
impensè subtilium est partium, ob id plus ualet q̃ alia,
quæ similiter ut ipsum tum calfaciunt, tum siccant. Nā
quæ tenuium sunt partium medicamenta, ijs quæ sunt
crassarum, efficaciora sunt, etiam si parem sortita sint
facultatem: nimirum quia magis penetrant. In conuul
sione igitur à plenitudine, quæ in neruis est, orta, & bi
bendum castorium exhibe, et cuti foris etiam impone.
Vbi uerò ex siccitate nimia conuulsio obuenerit, scito
hoc medicamen illic esse aduersissimum. Ad eundem
modum ijs qui præ plenitudine aut tremūt, aut singul
tum patiūtur, est utilissimum: aduersissimum uerò ijs,
quibus id ab inanitione, aut acrium humorum morsu
accidit. Vbi itaq; excalfactione, aut resiccatione, aut
utraq; simul actione est opus, maximam in usu casto
rii experire cōmoditatem: nec ullam parti alicui noxā
afferet, potissimū si homo non febriat, aut febrim non
admodum calidam perpetiatur, sed tepidā, quales ma
ximè in cataphoris & lethargis accidit. Ac multis sanè
castoriū unā cum pipere albo, utrūq; mensura cochlea
rii, ex melicrato propinauimus: nec quisq; ullam per
Lethargicorū
febres esse te
pidas.

Menses educē
di ratio.

cepit noxam. Sed & retentis mensibus, ubi per uenam
que in talo est, modicè euacuassent sanguinem, oblato
castorio unà cum pulegio, aut calamintha, semper me-
dicamen hoc sum expertus, purgationē ciere, citra ullā
assumentis læsionem. Præterea locos morantes eiicit;
eaq; omnia ex melicrato potū efficit. At quibus ab oc-
casionē frigida ita uenter flatu distenditur, ut ægrè cu-
rationem admittat, eos ex oxycrato potum castorium
adiuuat. Quæ porro iuuat in corpus intrò sumptum,
ijs prodest quoq; cuti impositum, cum sicyonio, aut ue-
teri oleo. Quæ uerò ampliori calore indigent, ijs etiam
per se infricari debet. Iuuat etiam, si quis suffitum eius
prunis impositi, inspiratione hauriat, illos p̄cipuè affe-
ctus, qui in pulmone consistunt, aut capite. Attamen le-
thargicos & cataphoricos affectus, qui quidē habent
adiunctam febrim, p̄stat nō dictorum oleorum aliquo
macerātes curare, sed potius ex rosaceo capiti colloq;
imponere.

Lumbi scincorum.

Scincorū lūbi.
Semen q̄ pro-
moueant, & ar-
ceant.

QUæ circa renes scincorum sunt, bibuntur, tanq̄
pudenda intendere ualeant. Cōtrarium autem
moliri uidetur semen lactucæ potum ex aqua.

Vngues caprarum & asinorum.

Vngues capril
li, asininiq;.

QUIDAM ungues caprarum deustos, moxq; ace-
to perfusos, alopecijs illinunt. Itaq; fuerit & ta-
lis cinis facultatis exiccatoriæ. Sunt qui combustos asi-
norum ungues comitalem morbum curare dicant, si
scilicet assiduò bibantur. Si uerò macerati oleo appli-
centur, digerere choeradas. Sed & ipsum cinerē, si sic-
cus inspersus fuerit, sanare perniones.

Ossa combusta.

Ossa cōbusta.

ADmodum digerentem, exiccantemq; uim obti-
nent: maximeq; (ut quidam ferunt) humana. No-
ui siquidem nostratium quosdam * combusta ossa hu-
mana potui exhibuisse, ac multorum sic epilepsiam

& arthrim curasse.

Seneſta ſerpentis.

Hanc ſcripſere quidam in aceto bullitam, dentiū Exuuium ſer-
mederi doloribus. pentis.

Pellis ouina recens detracta.

Circumpoſita uerberatis, eos die ac nocte una p- Pellis ouilla.
ſanat. Concoquit enim & diſcutit ſub cute con-
cretum ſanguinem.

Equorum lichenes.

Eas aceto tritas comitiales curare ſcriptum qui- Equorum li-
busdam eſt. Alij uerò & ad cuiuſuis fere morſum chenes.
adhiberi conſulunt.

Tela aranei.

Hanc ſcribunt nonnulli à phlegmone tueri ſum. Tela aranei.
mæ cutis ulcera.

Coria uetera uſta.

Eorum cinis exiccatorius exiſtit. Quare ulcera ex Coria vetera
attritione, & ambuſta, et intertrigines, quæ in foe- uſta.
minibus ſunt perſanat.

Oſtreia.

Oſtreia quidam nuncupât teſtacea omnia: oſtreū Oſtreia.
autem, unam tantum teſtaceorum ſpeciem.

Buccinæ & purpuræ.

Buccinarum & purpurarum teſta uſta, redacta; Buccinæ.
in tenuiſſimum pollinem (quod ſit tibi commune Purpuræ
præceptum in teſtaceis & lapidoſis omnibus) deſiccâ
di uim obtinet, ac proinde ulceribus malignis opitula-
tur: id quod etiam cômune eſt omnium quæ citra inſi-
gnem morſum uehemêter deſiccant: quippè quâ alio-
qui fluxionum cauſa exiſtant. Hoc etiam eſt omnium
id genus commune, quod ex aceto, aut oxycrato,
aut œnomelite, aut oxymelite, idonea ſint ulceribus
putreſcentibus.

Oſtrea.

Oſtrea quidam nuncupât teſtacea omnia: oſtrea Oſtrea.
autem, unam tantum teſtaceorum ſpeciem.

testis, tametsi minus crasse. Etenim omnia id genus cogendi quandam in se facultatē obtinent, per quam cōdensata eorū essentia, dura terrosa q; sunt reddita. Quā ubi per uestionem posuerint, digerentem facultatē asci-
scūt. * Quod si ea, ubi uista fuerint, laueris, quicquid habebant igneum, in aqua ponūt. Quare aqua sanē ipsa excalfaciens cum tenuitate redditur, adeo ut putrefaciat interdum: reliquū uerō terrosum, morsus expers efficitur; maxime q; implendis & cicatrice claudendis humidis ulceribus auxiliatur. Cæterū ulceribus ca-
uis et fistulosis, fluxioni q; obnoxijis ulceribus, ex suillo adipe inueterato foris circūpono ipsum; in sinum autē aliquid eorum quæ talia cauere implent, impono, quale existit diaphanes ustum. Quin & dentes splendoribus testarum cinis efficit, non tantū extergendi potentia, sed & asperitate substantiæ, ueluti & pumex, & testa clibani. Verū in usu eiusmodi nō est necesse quæ sic uista sunt, admodum læuigare, sicuti dum insperguntur ulceribus. Porro excrementiam mediocriter exterrūt, comprimunt q;. Ad hæc, uista omnia id genus cum sale, dentium sinegma efficacius reddūt, ut non modō laxitatē molliem q; gingiuarum desiccet, uerū etiam ulcera putrescentia adiuuet.

Testarū cinis.

Sepiæ testa.

Sepiæ testa.

SEpiarum testa ad modum laxa est, non ut ostreorū lapidosa. Itaq; absterfio illi cum alijs testis cōmunis est, ueluti & desiccatio; cæterū partium tenuitas eximia illi præ cæteris inest. Quocirca uista ea utimur ad uirilignes, ephelin, lentes, & psoras. Quin & fossili sali mista, in oculis existentes ungues, & sycofis uocatas eliquat. At anteq; uratur, dentibus splendorē conciliat, & ulcera desiccet.

Purpurarum opercula.

Opercula purpurarum.

EA quidam prodiderunt memoriæ turgidos lienes sanare; suffitu eas quæ uteri suffocatione periclitantur, iuuare;

iuuare: præterea retentos ejicere locos.

Lana succida.

I Donec excipit irrigationes, quæ adhibentur contu-
sis, aut quouis modo percussis, ut quæ utilitatē ex
illis proficiscentem promoueat: idq; propter æsypon.
Lota uerò, apta est humoribus qui irrigantur, excipien-
dis. Porro uista uim habet acrem, pariter et calidā, unā
cum partium tenuitate. Itaq; molles præhumidasq; ul-
cerum carnes celerrimè eliquat. Inditur & in medica-
men desiccatorium. Vrito eam tanq̃ alia plurima, ol-
lam implens nouam, quam tegat operculum multis fo-
raminibus pertusum.

Pili usti.

S Imiliter ustæ lanæ excalfaciendi exiccandiq; pos-
sident facultatem.

Ouorum facultates.

O Va partes animalium non sunt, sed proportionē
respondent ipsæ quæ agnoscuntur. Sunt autem fa-
cta ad propagationē generis, perpetuitatemq;: ac sunt
utilia, ceu nutrimenta. Porro ouorum album & tenue
illud, quo item ad ophthalmias utimur, ex numero est
medicamentorum mininè mordicantium. At unā pra-
uitatem solū patiuntur oua, quam scilicet affert uetu-
stas: eamq; facillimè effugas, si utaris recentibus. Est
autem ouum symmetro temperie frigidius. Utendum
autem est oui albumine, non tantū ad oculos, sed ad
alia omnia, quæ medicamenta requirunt suauissima:
ut sunt uniuersa sedis & pudendorū ulcera contuma-
cia. Miscetur quoq; idoneè medicamētis profluuium
sanguinis ex cerebri inuolucris reprimētibus, quæ ni-
mirum citra morsum illinuntur, astringuntq;. Cæterū
& ipse uitellus assimilis est naturæ, ac proinde miscet̃
ceratis morsus expertibus. Verū quanto plus defic-
cant quæ sunt assa oua, tanto minorem mitigandi uim
obtinent. Miscetur & cataplasmat̃ phlegmonem ex-

Lanæ succidæ
usus.

Osypōn.
Lana uisā.

Lanam uisā
ratio.

Pili usti.

Ouorum facul-
tates.

Oui tēperies.

Albumen oui
quibus affecti-
bus conferat.

Vitellus oui.

Ouo toto ad
quæ uiatur.

Tomus IIII.

Pppp

Ouū in aceto
percoctū, et sum
p, dysenteriae
auxiliatur.

Ambustis ouū
opiulatur im-
positum.

Anacollemata

Ouum forbile
quibus conue-
niat.

Echinus.
Erinaceus.

Cochleæ.
Limaces.

Dysenterig
optimum me-
dicamen.

tinguentibus. Iam uerò crudo toto ouo, utimur admi-
sto rosaceo, ad palpebrarum aurium, māmaram, alia-
rumq; omnium partium phlegmonas. Adhæc, in ace-
to coctum ouum si edatur, uentris fluxiones desiccet.
Quod si etiam eorum quippiam, quæ ad dysenteriam
aut coeliacum affectum cōueniunt, adiunxeris, atq; in
igne modico, fumiq; experte frixeris, edēdumq; ita p-
beas, nōminimè sanè ita laborātes adiuueris. Ad am-
busta etiam ouum est, protinus impositum, utile, siue
quis seorsum albumen duntaxat ipsum molli lana exci-
piat: siue etiam cum uitello confundens, comiscensq;
applicet. Mediocriter enī refrigerat, & citra morsum
desiccet. Tale quū sit, & ad anacollemata uocata, quæ
fronti imponuntur, eo utimur, & pilos palpebrarū ag-
glutinamus: nimirum admisto idoneorum quopiam,
cuiusmodi est thus, potissimum pingue, ac non inuete-
ratum & ficcum. Ouum igitur, medicamentis quæ hu-
miditates desiccāt, aut elixum, aut assum, aut frictum,
tanquam materia miscetur: ijs uerò quæ lentorem hu-
morum in pectore pulmoneq; incidunt, forbile: id qd
in aqua eo usq; elixari debet, donec incalescat. Simili
modo sumptum gutturis, stomachi, uentris, intestino-
rum, atq; uesicæ medetur asperitatibus.

Echinus, hoc est, erinaceus combustus.

ERinacei utriusq; tum marini, tū terrestris corpus
ustum, cinerem efficit facultatis tum extergentis,
tum digerentis, tum extrahentis.

Cochleæ: siue limaces.

COchleæ si totæ cum testis urantur, admista galla
omphacitide, simulq; pipere albo, mirè prosunt
dysentericis, in quibus ulcera computrescere non cœ-
perunt. Conuenit autem ut piperis sit pars una: gallæ
uerò duæ: quatuor cochlearum. Hæc ubi ad unguem
læuigaueris, cibus inspergito, bibendumq; aut ex aqua
aut ex uino albo & austero, præbeto. Cæterum absq;

gallæ mistione cinis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obtinens item nonnihil ex uztione calidum. Porro cochleg quæ uztionem non sunt experte, si unâ cum testis tritæ imponantur, & toti uentri aqua inter cutem laborantium, & in articularum tumoribus, ægrè quidem diuelli poterunt, cæterum impensè deficiant: uel si uiscidus crassusq; humor in alto contineat. Et sanè inhærere sinere oportet, donec sponte decidât. Idem faciendum in tumoribus ex ictu natis, difficile solubilibus.

Carcini, hoc est cancri, usti.

Fluuiatilium cancrorum cinis, q̃ similiter prædictis exiccatorius est: substantiæ tamen proprietate mirabilis est eius in ijs q̃ à rabiente cane sunt morfi, effectus: isq; tum solius, tum cū gentiana, & thure multo præstantior. At thuris partem esse unam oportet: quinq; gentianæ: cancrorum decem. Ex quo quidem medicamine Æschrion Empiricus, conciuis atq; preceptor meus, ijs qui à rabido cane emorfi fuerant, quotidie diebus quadraginta mensuram cochlearis magni cum aqua bibendam dabat. At si non protinus ab initio, uerū aliquot post dies, curâ cepisset demorfi, tūc quotidie duo cochlearia aquæ inspergebat. Ad ipsum uerò uulnus applicabat emplastrū, qd ex pice brutia, opopanace, acetoq; cōficitur: habēs picis libram unā: aceti acerrimi sextarium unum Italicum: opopanacis uerò uncias tres. Hæc itaq; monita uolui de cancris, quum nullus eorum qui usi illo medicamento fuerunt, extinctus sit.

Chelidones, siue hirundines, ustæ.

Sed & hirundinum cinere permisto melli permulti utuntur, cōtra omnes affectus gutturis. Utuntur et ad acuendū uisum nonnulli hoc cinere. At aliq̃ are factas drachmæ pondere bibendas exhibent.

Cicadis etiam nonnulli utuntur ad colicos affectus,

Tettiges: hoc est cicadæ.

Pppp ij

Carcini.

Cancri usti.

Galenī præceptor fuit Æschrion Empiricus.

Morfos a rabido cane curandi ratio.

Chelidones.

Hirūdines ustæ

Tettiges.
Cicadæ.

cum paribus numero piperis granis. Alij assas edēdas offerunt, quibus affecta uesica est.

Corydos, Galerita.

Corydos.
Galerita.
Corydalis.

Galerita, auis illa pusilla, quæ in capite ueluti gale-
rum ex pilis habet conflatum, in iure elixa colicos
adiuuat, ueluti & ipsa herba corydalis appellata. Verū
assiduē eam simul cum iure esse est necesse.

Alectorides, Gallinæ.

Alectorides.
Gallinæ.
Gallorum ius.

Gallinarum ius simplex retinendi uim possidet, uti
gallorum subducendi. Concoquendi autem sunt
cum sale diutissimē.

Gale, hoc est mustela.

Gale.
Mustela.

Ei ius cinerem cum aceto illitum podagricos iuuare
est proditum: ipsam uerò arefactam prodesse co-
mit'alibus morbis.

Ranæ uisæ.

Ranæ uisæ.

Ranarum inspersum cinerem sanguinis eruptio-
ni mederi referunt; cum liquida autem pice sana-
re alopecias.

Hippocampus.

Hippocampus

Huius etiam cinerē alopecijs prodesse est proditū:
facultatisq; exiccantis & extenuantis existere.

Tellinæ salæ.

Tellinæ salæ.

Salæ tellinas uistas, adeò urērem efficere cinerem
aiunt, ut is cum cedria euulsos radicitus ex palpe-
bris pilos, instillatus in locum, eos renasci prohibeat.

Intestina terræ, siue lumbrici.

Intestina terræ.
Lumbrici.

Contrita, neruisq; diuisis imposita, mirum in mo-
dum ea prodesse est proditum. Præterea cum ui-
no pota, medicamen esse mouendæ urinæ idoneum.

Cimices.

Cimices.

Eas cum aceto bibitas, eijcere hirudines aiūt: quas
nos semper esu alliorum eiecimus.

Cantharides.

Cantharidarū
facultas.

Cum idoneis emplastris impositæ, adeò, scabros

ungues educūt, ut toti cadant. Præceptorum meorum quidam, earum nonnihil solet diureticis medicamētis inijcere. At nonnulli solas alas & pedes inijciunt: alij contra. Cæterum nos totas indimus. Porro aptiores sunt ex cantharides, quæ inuēte in frumēto, lutea trāsuerſim in alis cingula obtinent.

Cantharidas elī
gendi ratio.

Buprestis.

A Nimal est cātharidi tum specie, tum uiribus siſe.

Buprestis.

E Pityocampe, Eruca picearum.

Eruca picearum.

Iusdem sunt facultatis.

Salamandra.

Salamandra.

S Alamandræ cinerem quidā septicis, lepricis, pso-
ricisq; miscent facultatibus.

Narce, Torpedo marina.

Narce.
Torpedo mar-
rina.

S I applicetur uiua cui caput dolet, fieri potest ut do-
lore liberet, siſt alij quæ sensum obſtupeſaciūt.

Draco marinus, & Trigle, & alia id genus.

Draco marinus
Trigla.

V Iuas etiamnum hæc animantes apertas, & pro-
tinus partibus affectis appositæ prodeſſe traditū

est. Nempe draconem marinum in suum ipsius ictum

Mus.

impositum: similiter & Trigla in draconis: mures do-

mesticos in ictum scorpij, ueluti & sauram: mygalem

in suum ipsius & sauram chalcidicā, quam ex uino bi-

bendam præbent, tanquā suum ipsius morsum sanet.

Porro scorpium suum ipsius morsum curare, si tritus

imponatur, necnon si assus edatur. Congruere autem

aiunt & ijs qui à uipera sunt emorſi: ascalabotā uerò

Saurā.
Mygale.
Scorpius.

Ascalabotā.
Assiracus.
Cybius.

Pityocampe.
Uruca marina
Lepus mari-

& scolopendro marino: ad aurium uerò dolorem, siſ-

nus.

Pppp iij

Silphi.
Onisci.

phis in oleo coctis, & ijs quos Græci oniscos, Latini
multipedes uocant.

Vulpes.
Hyæna.

Vulpes, & hyæna.

Oleū. vulpinū
summe auxi-
liari morbis ar-
ticularibus.

Oleum in quo elixa uulpes est, non est potentio-
ris in digerendo facultatis, q̄ in quo hyæna: quæ
si similiter in oleo elixetur, oleum ipsum lōgè potentis-
simæ facultatis in digerendo redditur. Talia autē me-
dicamenta uim habent ea quæ in alto corpore delite-
scunt, ad extimam cutē trahendī, atq; eo nomine quan-
doq; dolores sedandi. Quare qui utuntur uulpibus, &
ipsi oleum digestorium efficiunt, atq; inde impletis eo
alueolis, totos arthriticos in eos demittunt, multo tem-
pore inibi immorari iubentes. Ex quo fit, ut non tantū
qui circa articulos sunt tumores uacuentur, sed etiam
uniuersum corpus. Vnde certē magnum consequitur
cōmodum, quum nihil p̄terea amplius in affectas par-
tes sit defluxurum, nimirum euacuato iam corpore.

Adarcion.

Adarcion.

Essentia quidem sua ueluti spuma est aque salse cō-
creta, id q; circa arūdines & farragines. Est autem
acerrimum, simulq; calidissimum pharmacum: proin-
de & per se inutile. Verū cōmisceri solet ijs que uim
eius retundunt: sicq; fit multo utilissimum in ijs affecti-
bus, qui exalferi postulant, foris impositum. Nam id
intra corpus sumi impossibile est.

Alcyonia.

Alcioniorū fa-
cultates et dif-
ferentiæ.

Alcyonia omnia detergunt, ac digerunt, qualitātē
habentia acrem & calidā. Est autem eorum unū
densum & graue, odoris prauī. Olet enim pisces putri-
dos, spongiæ in specie simile. Alterum uerò figura lon-
giuscula, leue, & rarum, odorem habens similem phy-
cns. Aliud tertiū uermi simile specie existit: colore pur-
pureo, consistentia molli: uocāt id Milesium. Post que
quartum secundo quidem iam posito similiter & leue
& rarum, uerū lanis succidis simile. Deniq; et quin-

tum extima superficie læui, cæterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparens acre. Quod sanè omnium alcyoniorum est calidissimum, adeo ut pilos deurere possit. Itaque quum duo prima lichenas, alphos, psoras, leprasque adiuuent, preterea cutem splendidiorem efficiant, idem præstare non potest hoc ultimo loco positum. Nec enim proinde ut illa cutem durat summam extergit, sed etiam ex coriat, ita ut ulcera inducat. Porro quod tertio ordine recensuimus, omnium tenuissimum est. Quare ustum alopecias curat illitum cum uino, colore quidem fuluo, tenui tamè essentia. Quartum autem eiusdem cum hoc speciei, uires obtinet, uerum haud parum imbecilliores.

Sal.

Sal eiusdem genere facultatis est, siue fossilis sit, siue marinus: uerum hoc differunt, quod salis est terra effossi substantia magis compacta sit, ac proinde in eo maior partium crassities, et astringendi potentia. Marinus itaque affusa aqua liquefcit protinus, id quod non accidit fossilis. Eiusdem speciei cum marino est qui in stagnis quibusdam falsuginosis nascitur: æstate uidelicet aquis ex his æstu absumptis: cuiusmodi est Tragalius, non procul à Sminthio. Igitur quum qualitas falsa digerat simul & contrahat contactam ab ipsa substantiam, aphronitrum in hoc differt, quod in ipso unum saporem exuperantem sit uidere, quem uocant amarum, uim habentem digerendi: haud item contrahendi, uti sal. Nam hic, quicquid in corporibus humidum est, id totum absumit: et quod reliquum est substantiæ solidæ, astrictione contrahit: ac proinde etiam conditura sua carnes seruat, à putredineque tuetur. Quippe quæ putrescunt, excrementitium humorem continent, substantiamque tum dissolutam, tum minimè compactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsum uest supflua humiditas, ceu melli optimo, & substantia solida & compacta est, ut lapidi-

Salis differentiæ

Salis qualitatis facultas, Aphronitrum.

Salis facultas.

Putrescentium substantia.

Putrescere quæ nullo modo possint.

Pppp iij

bus, ea ut putrescant est impossibile. Quare in ijs salis non probatur usus: sed in illis tantum, in quibus suspecta est putredo.

Sal ustus.

Sal vltus.

Digerit quidem potentius, q̄ ustionis expers, quanto scilicet subtilius ipsius corpus, accepta ab igne facultate, redditur.

Litrum, Nitrum.

Litrum.

Nitrum.

Ostensum est hoc medicamen in medio salis & aphronitri vires habere.

Halos anthos, Flos salis.

Halos anthos,

Salis flos.

Liquidum est medicamen, tenuiusq; q̄ sal ustus: præterea qualitatis acris, facultatisq; admodum digerentis.

Halos achne, Spuma salis

Halos achne.

Spuma salis.

Spumosa est salis efflorescentia, multo tenuioris naturæ, q̄ ipse sal. Quare & extenuare, & digerere q̄ ille multo plus potest. Verum quod substantiæ est reliquum, contrahere ut sal nequit.

Asphalton, Bitumen.

Asphalton.

Bitumen.

VNum & ipsum est ex ijs que in aqua marina proueniunt, & in alia quapiam quæ non est marinæ dissimilis, ut in Apollonia Epiri, ubi reperitur hoc medicamen in aquis sponte nascētibz, ueluti spuma quædam innatans. Quo sanè tempore est molle: postea uerò reficcatum, pice sicca durius efficitur.

Bitumen proueniens in mari mortuo.

Bitumen quod
i mari mortuo
nascitur.

Optimum uerò bitumen in mari quod mortuum uocāt, prouenit. Cuius medicaminis uis est tum reficcatoria, tum excafactoria in secundo excessu. Merito itaq; utuntur eo ad cruentorum uulnerum glutinationem, & ad alia omnia quæ exiccari debent, ceu modica excafactione.

Spongos, Spongia.

Spongia vsta.

Spongia usta, acris est & digerentis potentiæ. Vtebatur ea præceptorum meorum quidam, ad sangui-

nis eruptiones, quæ manuali opera indigent. Por-
rò admovebat eam partibus sanguine profluentibus
etiãnum ardentem, ut & crusta parti induceret, & ip-
sum spongię corpus, ceu operculũ adhæreret. At uerò
spōgia noua, nō sicut lana aut lanimentũ, materia dū-
taxat est, q̃ humores irrigãdos excipiat, sed etiam ma-
nifestè desiccat. Quare uulnera glutinat, si aqua, aut
oxycrato, aut uino admoveat imbuta, à qua sanè, quæ
antiqua est, longo spatio relinquatur.

Spongiã ardē-
tem auxiliari
eruptionibus
sanguinis.

Garus.

E Acultatem habet admodum calidam atq; siccam.
Proinde eo quidam ad ulcera usi sunt putrescētia:
tum dysentericis ischiadicisq; iniiciunt.

Garus


Halme, Salsugo.

S Imiliter garo ad putredines accōmodatur: & ad is-
chiadas & dysenterias iniicit. Etenim acrimonia
sua humores coxam infestātes attrahit: ob idq; per in-
testina eua cuat: putrescentia uerò ulcera in dysenteria
colluit, & siccat. Maximè tamen salsugine salsorũ silu-
rorum & mænidum ad talia Medici utuntur.

Halme.
Salsugo.

G A L E N I L I B E R

D E S V B S T I T V T I S .



S V B S T I T V T A medicamenta
dicuntur, quæ in alterius locum sub-
stitui possunt: quorum sanè cognitio,
plurimum ad medendi usum confert.
Plerunq; siquidem destituti Medici
ijs quæ ad morbum exterminandum
maximè expedire arbitrantur, neq; expēdentes ea
quæ similem ferè uim obtinentia, uice illorum assumi
possunt: ægris opitulari nesciūt. Quod ne tibi aliquan-
do contingat, en subdimus omnia pharmaca substitu-
ta, ordine literarum disposita.

Pro

Substitues

A Abr ototo	Origanum.
Abfinthio	Abrotonum.
Acacia	Succum lentisci.
Acoro	Radicem asari.
Ærugine	Atramentum sutorium.
Amianto	Aphronitrum.
Agallocho	Calamum odoratum.
Agarico	Euphorbium, aut epithy- mum.
Alga	Anchusam.
Aloe Indica	Aloes uiridis folia, folium, uel glaucium, uel finum ibis, uel Lycium, uel cē- taurium.
Alumine	Salem fossilem.
Ammi	Anisum.
Ammoniaco thym,	Propolim.
Ammoniaco sale	Cappadocum salem.
Amomo	Acorum.
Amylo	Gyrin siccam.
Amygd. amar.	Absynthium.
Anchusa	Hyacinthum.
Aniso	Daucum.
Arace	Sesamum.
Aristoloch. rot.	Aristoloch. long.
Argemone,	Sisymbrium.
Armenio lapide	Atramentum Indicum.
Asbesto	Adarcem.
Aspalatho	Ericis semen, aut uiticis.
Asphodelo	Succum betæ.
Asaro	Zingiber.
Asio lapide	Gagatem, aut salem Am- mon. tostum.
Auripingmento	Sandaracham.

S V B S T I T V T I S

235

Pro

Sustitues

Balauftio	B	Malicorium
Bdellio		Sphagnum odoratum.
Bitumine		Picem Brutiam hum.
Brutia pice		Picem in aceto feruefactā.
Buccina		Ostreum.
Buprestis		Lasus, aut hirudinem.
Butyro		Lac bubulum coactum.
Cadmia	C	Leucographin Aegyptiā.
Calamo odorato		Sphagnum.
Canchri		Baccas lauri.
Cantharidibus		Phalangia.
Capparis radice		Ericæ radicē aut myricē.
Cardamomo		Fructum myrti.
Casia		Cinnamomi dimidium.
Castorio		Silphium.
Cedria		Ladanum.
Ceraunio		Leucographin.
Ceruina adipe		Anseris adipem.
Cera		Fabam fresam cum propo li coctam & tritam.
Cerui cornu,		Caprinum.
Cerussa		Scoriam plumbi.
Chalbane		Sagapenum.
Chamaedry		Lapathi radicem.
Cicuta		Semen coriandri.
Cinerula Cypria		Cienerem fol. oliuæ.
Cinnabari		Rosaceos pastillos.
Cinnamomo		Cassiae duplum.
Clinopodio		Heliotropium.
Cnico		Viticis semen.
Colocynthide		Ricini semen.
Colophoniam pice		Apochyma.
Corallio		Moly, aut symphytum.

Pro

Substitues

Costo	Cedri fructum.
Cotiledone	Anagallin.
Crinanthemo	Aphrodisiam.
Croco	Crocomagma.
Crocomagmate	Agallochum Indicam.
Crocodili adipe	Canis marini adipem.
Cumino	Brassicæ semen.
Cynosbato	Solani uesicariæ semen.
Cyperii	Iuniperum magnam.
Cyphi	Caricam ustam.
D Damasonio	Eryngium.
Dauci semine	Sij semen
Dictamno	Saluiam.
Diphryge	Phrygium lapidem.
Dorycnio	Alterci semen.
Dracontio	Aron.
E Ebena	Loti arb. lignum.
Ebisci radice,	Folia mori.
Elaterij succo	Eiusdem herb. succum.
Elleboro nigro	Papyri radicem.
Enneaphyllo	Potamogitonem
Epithymo	Colocynthidis semen.
Ericis fructu	Gallam immaturam.
Erini folijs	Stercus ibis.
Erucae semine	Erysimi semen.
Erucis pini	Vespas cum cedria.
Eryfimo	Struchij succum.
Euphorbio	Stercus columbe agrestis.
Eupatorio	Chamæpityn.
F Felle camelli	Fel Ascalaboti.
Felle mustelæ	Fel cameli.

S V B S T I T V T I S

337

Pro

Substitues

Felle hyænæ Fel perdicis.
Felle uiperæ Fel ichneumonis.
Flore æris Squammam æris.

Galla G Palæstræ sordes.
Gentiana Radicem apij odorati.
Glycyrrhizæ succo Mori succum.

Hederæ succo H Persex succum.
Hedychroo Amaricinum.
Hyacintho Flos Isatidis.
Hyenæ adipe Vulpis adipem.
Hyoscyamo Solani uesicariæ semen.
Hippuri Aiugam.
Hyperico Anethi semen.
Hypocisthide Acaciam.
Hyssopo Thymum.

Iri illyrica I Helenium odoratum.
Iunco odorato Cardamomum.
Iunco palustri Polygoni radicem.

Lapathi radice L Pyrethri radicem.
Lapide Phrygio Lapidem argyritem.
Lapide Asio Gagatem lapidem.
Lapide pyrite Lapidem pyrobolon.
Lauri baccis Serpillum aridum.
Lathyri Granum Cnidium.
Lentisco Terebinthum.
Lepidio Rubiam.
Lepidiij radice Folia capparis.
Lepore marino Leporem fluuialem.
Lini semine Fabulum.
Loti semine Betæ semen.

Pro

Substitues

Lupi adipe

Vrſi adipem.

Liguſtico

Paſtinacæ ſemen.

Lyſimachio

Spinæ Aegyptiæ ſemen.

M

Magneſe

Hematitem lapidem.

Malabathro

Nardum Indicam.

Malo cydonio

Melilotum.

Malua

Fœnumgræcum.

Mandragora

Dorycnium

Manna

Thuris corticem.

Maſtiche

Lentiſci caulem.

Medulla cerui

Vituli medullam.

Meliloto

Lotum herbam.

Melle

Sapam.

Melle Attico crudo

Mel deſpumatum.

Mæo

Myrobalanum.

Myrſinite

Succum mori.

Molybdæna

Lithargyron.

Mori ſucco

Rubi folia.

Myrobalano

Glaucium.

Myrrha Trogloditide

Calamum odoratum.

Myrti oleo

Mori ſuccum.

Myſi Cyprio

Ochram Cypriam.

Myſi toſto

Diphrygem.

Nardo Syriaca

Iuncum odoratum.

N

Napi

Rapæ ſemen.

Nepita

Agreſtem mentham.

Nucleis pineis

Cucumeris ſemen.

Nuce pinea

Gallam.

O

Ochra

Myſi Cyprium.

Ocymo

Siſymbrium.

Ocymoide

Mentam agreſtem.

Oenanthes ſucco

Vitigineum ſuccum.

Pro

Substitues

Oesypo	Vituli medullam.
Oleo Cicino	Laurinum aut uetus oleū.
Oleo ueteri	Feruefactum duplum.
Oliuæ lachryma	Hypocisthidis succum.
Ompace,	Gallam immaturam.
Opobalsamo	Guttam myrrhæ.
Opopanace	Lac sycamini.
Oryza	Farinam hordei.
Orminio	Lini semen.
Ormithogali.	Anthyllin.

Papaueris succo	P Mandragoræ succum.
Phu	Sphagnon.
Pipere	Zingiber.
Pipere albo	Nigri duplum.
Polij semine	Erucae semen.
Polypodio	Chamæleonis radicem.
Polytricho	Absinthium.
Pompholyge	Cadmiam ustam.
Populi gemmis	Sampsuchum.
Propoli,	Ladanum.
Psyllio	Lentem palustrem.
Punice	Terram Creticam.
Pyrethro	Zingiber.

Quercus uisco	Q Chamæleonis uiscum.
---------------	-----------------------

Rapa	R Heliotropium.
Raphanino oleo	Ricini oleum.
Resina pini	Terebinthinam.
Roseis pastillis	Sinopidem.
Rosis siccis	Perseæ folia sicca.
Rhu Syriaco	Oxycanthæ fructum.
Rubigine	Squammam ferri.

Pro

Substitues

S Sagapeno	Resinam pini siccam.
Salvia	Calamintham.
Salamandra	Lacertam uiridem.
Sale ammoniaco	Salem Cappadocium.
Sambuco	Spinæ uiridis folia.
Sampsucho	Rhus coquinarium.
Santonico	Abrotonum.
Satyrio	Eruca semen.
Scammonio	Ricini semen.
Scylla	Bulbum esculentum.
Scoria plumbi	Plumbum productum.
Scoria Cypria.	Melanteriam egyptiam.
Semperuiuo,	Lactucam.
Sepiæ crusta	Punicem.
Sesamo	Lini semen.
Sesamoide	Amaranthi cremorem.
Sinapi	Nasturtium.
Sifone	Anisum.
Sisymbrio	Ocymum.
Solano uescaria	Semen solani hortensis.
Sphagno	Iuncum odoratum.
Spondyllo	Folia oliuæ.
Stercore uulturis	Columbinum stercus.
Stercore turturis	Stercus columbi.
Stercore felis.	Ichneumonis stercus.
Stibio	Æris squammam.
Struchi radice.	Ellebori nigri radicem.
Succo calpasi	Succum myrti.
Succo peucedani	Glycyrrhizæ succum.
Succo rhododaphnes	Viscum quernum.
Succo cyrenaico	Syriacum succum.
Succo papaueris	Mandragoræ succum.
Succo salicis	Hederæ nigræ succum.
Succo gallæ	Succum mori.
	Succo

Pro		Substitutes
Succo panacis		Lac sfsamini.
Succo polygoni		Succum plantaginīs.
Sulfure uiuo.		Sandaracham.
Symphyto		Centaurium.
Seri		Lithargyrum.
Terra Samia	T	Leucographem terram.
Terra erethria		Calcem Thebaicam.
Terra alana		Plumbaginem.
Terra asteri		Cimoliam.
Terebinthina		Masticem.
Thapsiæ succo		Chamæleonis nigri succū.
Thymo		Satureiam.
Tithymallo		Chamæleon.
Thure		Ampelitin terram.
Veruenaca	V	Chamæleucem.
Viola		Florem radiculæ.
Vino rhodio		Austerum uinum.
Vino Falerno		Vinum Mendesium.
Visco quercino		Chameleonis albi uiscum.
Vulpis adipe		Vrsinum adipem.
Vulturis stercore.		Columbinum Stercus.
Vua domestica		Pulpam palmularum Syriacarum.
Xylobalsamo	X	Radicem uiolarū albarū.
Zingibere	Z	Pyrethrum.

F I N I S.

Tomus IIII.

Qqgg

GALENI PERGA

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum genera Liber Primus.



VANDOQVIDEM ex com-
mentario quem iam pridem de com-
positione medicamentorum conscri-
psi, priores duo libri, qui exierant, in
lucem, una cum alijs in apotheca, que
ad uiam sacra est, perierunt: dum Pa-

Pacis delubrum
conflagrasse cli,
et cu eo biblio-
thecas palatii,
& nonnullos co-
mentarios Ga-
leni.
Sophistas ex-
terminandos
esse.

cis delubrum totum, & ingentes Palatii bibliothecae
maximo conflagrarunt incendio: equidem amicorum
precibus uictus, cogor nunc illos eosdem recudere: idq;
ab eodem initio auspicatus, a quo in illis exorsus fue-
ram. Siquidem statim in auspicijs primi commentarii
monebam, esse exterminandos sophistas, qui traditio-
nem medicaminum compositorum e medio tollunt: non
nullisq; simplicium peculiare quasdam facultates in-
esse inficiantur: eos etiam excipientes scomate, qui de il-
lis aliquid prodiderunt. Qui quidem adeo vires medi-
camentorum ignorant, ut nesciant prorsus, a marino
lepore pulmonem solum exulcerari: uescam solam, a
cantharidibus. At uero Empirici cognoscunt quidem
ex aerugine cerato simplici admixta, confici optimum
sarcoticum medicamentum: tamen si neutrum eorum per se,
carnem gignere possit: qua autem ratione id contin-
gat, ignorant.

Sarcoticum opti-
mum confici ex
aerugine cera-
to simplici ad-
mixta.

Resinae omnes
calfaciunt.

Sunt igitur vires medicamentorum simplicium, non
generatim tantum, sed particulatim etiam inuestigan-
da. Siquidem non sat est nosse hoc pharmacum calfa-
cere, nisi etiam quo gradu id efficiat noris. Calfaciunt
quippe resinae omnes: attamen maioris minorisq; ra-
tione plurimum inter se earum calores differunt. Atqui

In curatione particulæ impensè refrigeratæ, medicamē admouebimus admodum calfaciens: illi uerò quæ paululum ab habitu naturali recessit, calore modico præditum. Merito itaq; nos quatuor excalfaciētium ordines statuimus, separantes à modicè calidis ea quæ euidenter eiusmodi qualitate præcellunt; tum quæ magnatim quæ uehementi adeò, ut urere iam uideantur: atq; in singulis hisce ordinibus latitudinem momentaneā constituētes: similiq; in excessibus reliquarum qualitatum, ratione. Porro medicamētorum materiæ, quædam sanè à plantis: quædā à metallis: nonnullæ ab animalibus proficiuntur. Iam uerò, præter simplicium omnium medicaminum facultates, omnium etiam præter naturam affectuum differentias ad unguem nouisse expedit. * Quippe primus curationis scopus à morbificis dispositionibus nascitur: cum quibus simul indicat curationem natura particulæ affectæ. Sed aeris etiam nos ambientis temperiem, constitutionemq; præterea ætatem, tempus, regionem, uitæ studia, & mores, multi præstantissimi Medici unā cum illis inspiciunt.

Ergo si simplicibus tantum medicamentis, uniuersos præter naturam affectus curare liceret nobis, nunquam egeremus compositis. Quum autem sæpe numero aliquatenus calfacere corpus uolētes, simplex nullum, quod præstare id possit habeamus, ex uarijs unum conficimus medicamen, quod eodem, quo affectus, gradu, à mediocritate recedēs, id quod ex usu est, moliatur. Taceo nonnulla simplicia, citra alterius medicamenti miscellam, nō posse adhiberi in emplastrū: alia, nisi retūdant, aut mitigent, administrari nō posse. In morbis etiā q cōtrarias simul facultates desyderāt, ut repellendi et digerēdi: detergendi ac læuigandi: uel attenuādi simul & incrassandi humores; maximus cōpositionis medicamentorū est usus: nec secus ubi uni-

Calfaciētium ordines quatuor, quos etiā reperire est in cæteris qualitatib;

Medicamentorum materiæ uariæ de proficiuntur.

Scopus curationis primus à morbificis dispositionibus nascitur.

Cōpositis medicamentis utimur.

Qq q q ij

Phoenicini
pharmacii com-
positio et usus.

Romæ inuale-
scere cōplures
dispositiones
rheumaticas.
Phlegmonarū
generatio.

cum medicamē habere cupimus, qđ multis uenenum
eiaculātibus feris, ac pharmacis exitialibus aduerfet.
Quum autem oleum uetus & adeps, uim digeren-
di sortiantur; chalcitis autem & palmę succus, repel-
lendi, astringendiq; ex his ipse pharmacum phoeni-
cinum dictum composui, glutinandis ulceribus, cica-
trice obducendis, & phlegmonis curandis accommo-
dum; quo iam complures utuntur. Etenim ratio com-
positionem inuenit; experientia, de inuentorum uirtu-
te decernit. Cum prædictis autem debet coqui lithar-
gyrus, donec consistentiam consequatur emplasticā.
Adeps porrò ipse sit tum insulsus, tum uetus; quemad-
modum etiam oleum; quę sanē quo uetustiora fuerint,
eo digerent promptius, phlegmoneq; diuturniori atq;
contumaciori erunt magis accommodata. Verū ad in-
cipientes atq; augescentes phlegmonas, ut quas astringe-
re atq; refrigerare oportet, præstat emplastrū ipsum
ex uino, uel aceto, uel aqua, uel oleo imaturo, uel astringe-
nte, liquare. Cōmunis autem compositionis modus
est talis. Vetus adipis, lib. ij. Olei ueteris, lib. iij. Li-
thargyri, tantūdem. Chalcitidos, vnc. iij. Liquato adi-
pi reliqua eleganter atq; artificiosē misceantur, ferue-
scantq; simul, ac rudicula palmæ uiridi & succulenta
moueantur, donec sibi emplastri consistentiā contra-
xerint. Quo quidē medicamine, ad ulcera quæ non fa-
cilē cicatrice obducuntur, & ad cruenta est utendum.
Auxiliatur etiam inflammationibus, articulorum mor-
bis, bubonibus, phymatis, ambustis, pernionibus, fra-
cturis, contusionibus, rheumaticisq; uniuersis consti-
tutionibus, cuiusmodi plures solent Romæ inualesce-
re. Cæterū in phlegmonarum principijs uim repul-
soriā esse ualidiore oportet; in incrementis uerò, hæc
imminuenda; quæ digerit uirtus, augenda est. Vigen-
te phlegmone, pares inuicem esse conuenit facultates,
nisi uehemens dolor, pharmacum leniens requirat. At

Inclinante phlegmone, uim digerēdi augebis. Qua ex
 methodo licebit tibi secundum uarias indicationes uti
 p̄dicto emplastro uarijs oleis, atq; succis liquato. Ego
 uerò ad phlegmonas erysipelatodes soluto ipso ex ro-
 faceo utor. Cui etiam, si æstas fuerit, uuæ acerbę simul
 & portulacę, uel semperuiui, succum immisceo. Quip-
 pè uuæ acerbę liquor per se, plus q̄ oportet, astringit:
 tanta autem astrictio lædit erysipelata: ut quæ calorē
 ipsorum, cutē densando, includat. Igitur in exactis ery-
 sipelatis, ea quæ aduentitia sua frigiditate auxiliantur,
 ubi cœperint incallescere, sunt mutāda. Postea uerò q̄
 incendium cōquieuerit, aut si nec perfectum planē ab
 initio erysipelas fuerit, * haud amplius ascititiam fri-
 giditatem desyderabimus: uerūm ijs succis diluemus
 phœnicinum emplastrum, qui moderatē refrigerent.
 Ab his iam & lini seminis, & chamemeli succum mi-
 scebimus: ipsoq; solo, sed fuso postea utemur empla-
 stro: nihil aliud illi miscntes. Quod si quādo liuidum,
 ob refrigerantium usum, erysipelas ipsum euaserit: so-
 lum phœnicinum emplastrum, ueteri oleo liquatum, id
 discutere potest: quo tempore partes liuidę, aqua souē-
 tur calida, atq; etiam scarificantur. Sunt qui calcis uiuę
 nonnihil ipsi pharmaco immisceant. Intrepidē itaq; in
 rheumaticis affectiōib⁹ hoc utitor medicamē: utpote
 quod tum astringat, tum digerat, tum robur particula-
 rum confirmet. Etenim non semper ob calorē immo-
 dicum fluxione affliguntur particulę. Sæpe siquidem
 ob propriam imbecillitatem, quæ ab intemperie frigi-
 gida ut plurimum proficiscitur, tali corripuntur affe-
 ctu. Quare si humectet eas quispiam, calfaciatq; medi-
 camentis laxatibus, dissolutę prorsus & imbecillę fiēt.
 Sin tumores uehementer astringat, initio quidem, iuua-
 re uidebitur: cætetū quod ex eis reliquum est, contu-
 max atq; scirrhosum reddiderit. Sed neq; id genus di-
 spositiones ferunt nimis astringentia medicamenta:

Omphacii fa-
cultas.

Erysipelatis
curatio.

Liuentis erysi-
pelatis curatio

Emplastri phœ-
nicini facultas

Fluxionū cāx.

Qqqq ij

Dolor inflāma
ta exasperat,
fluxionibusq;
occasionē prę-
bet.

ut à quibus dolore & tensione affligātur. Atqui omnis dolor, inflammata exacuit, irratq;, & fluxionibus occasionem prębet, uel si rheumatica intemperie æger non afficiatur.

Lithargyri fa-
cultas.

Sunt autem complura medicamenta, quæ phar-
ma-
co cui miscentur, uim nullam, aut per exiguam exhi-
bent: cōmoditatem uerò materiæ præstant, ut uel em-
plastri, uel cerati speciem referat. Atq; ex eorum san-
e genere existit argenti spuma: nullā insignem possidēs
facultatem, præter siccandi modicam. Quā ratione at-
trita femora ex itinere adiuuat. Est autē ex ijs pharma-
cis quæ liquefieri possunt, etiam argenti spuma, quam
Græci lithargyron uocant: ut chalcitis quoq;, & misy.
Cæterū chalcitis quidem omnium celerrimē fundi-
tur: tardissimē argenti spuma: at in horum medio æru-
go & misy consistūt. Porro candidū medicamē, quo
ad parua ulcera utor, ex oleo, aqua, & argenti spuma,
conficitur: ita ut libris duabus aquæ, tres q; purissimi,
splendissimiq; olei, totidemq; spumę argenti injcian-
tur. Debent autem simul coqui ad ignem minimē su-
midum, idq; in loco sub dio atq; soli exposito. Siquidē
ut aer nubilus pharmacum ipsum denigrat, sic synce-
rus ad candorē eius plurimū confert. Hoc autē fiet glu-
tinātius id medicamen, quo plus liquoris indideris.

Chalcitis om-
niū celerrime
funditur.

Candidū medi-
camē Galeni.

Ærem nubilū
denigrat phar-
maca, syncerū
conferte ad eo-
rū candorem.

Aquæ propria
facultas.

Cādidū empla-
stri Galeni fa-
cultas.

Vlceribus ni-
hil humectans
est uile.

Aqua etenim substantia ppria semper humectat,
refrigeratq;. At oleum si recens sit, pharmaco mi-
nimē reluctatur. Permanet itaq; humidum, ac mo-
dicē frigidum: quali maximē tenera corpora & caco-
chyma indigent. Ergo huiuscemodi emplastrum, pru-
ritus, desquamata, & ut uno uerbo expediā, ulcera exi-
gua p̄sanat: utpote exulceratis partibus ne quid isfluat,
impediens: & quod iam influxit, denuo ad partes cir-
cumstantes retrudens. Aduerte autem, nullum hume-
ctans nec propria ratione, nec ex accidenti esse ulce-
ribus utile.

Conficitur etiam pharmacum id ex oxelæo & lithargyro. Cæterum medicamen mediocriter siccans fit, si utriusq; nempe olei & aceti, duplo maior portio quàm argenti spumæ misceatur. Copiosior uerò duplo utriusq; mensura, ualentius facit pharmacum. Ipse enim triplam utriusq; nonnunq; miscēs, tota die medicamē coquere soleo. Atq; hoc sanè modo confectum, colore atro splendescit, maximaq; siccandi potētia pollet: ita ut curet ulcera contumacia, cruenta glutinet, fistulasq; in callum nbn induratas, adducat, ac breuiter, citra morsum exiccet.

Ex œnelæo etiam lithargyroq; similiter medicamē paratur. Equidem per æstatem sub sole ardenti, ex uino Falerno, aut alio tenuium partium, lithargyrum conterere soleo, idq; continuis quindecim diebus. Quibus exactis, medicamen ipsum exiccans, repono: quo postea ex oleo soluto, in rheumaticis affectibus utor: necnon ad uulnera glutinanda.

Cruda itaq; ac per se, argēti spuma, attritiones corrigit. Ex aceto autem aut uino trita, siccataq; , ulcerum quæ ob humiditatem ægrè cicatricem recipiunt, remedium fit. Quod si ipsam cupis rosionis expertem, elota utor.

Ac minimum quidem rosionis exhibet, si uino uel aceto abluatur. Conuenit tamen curiosè toto die contritam, cum liquore per noctem relinquere: quem postero die mane effundemus, alium denuò instillantē, ac postea rursus tundētes: id quod singulis diebus facere sub feruenti sole (hoc enim sit commune præceptū in lapidosis omnibus) minimè desistemus, donec unā cum humore ceu quidam flosculus ipsius argenti spumæ cernatur.

Quæ ex lithargyro componuntur, fieri possunt etiā ex molibdæna. Cæterum molibdæna substantiæ crassioris, ac frigidioris quàm lithargyrus est: ac medi

Lithargyri præparandi ratio.

Lithargyri facultates.

Lithargyrus reddit expers rosionis, si ex uino uel aceto abluatur.

Lapidosa omnia quæ abluimus, sub ardēti sole sunt ex humore aliquo laudanda.

Molibdæne facultas.

Qqqq iij

camenta quæ ex ipsa parantur, cineritia redduntur. Quum igitur discutere quid uolueris, lithargyro potius quæ molibdæna utitor.

Cerussæ vñs.

Terebinthina.

Larix.

Ceræ ablucendæ ratio.

At cerussam uel coloris causa ad emplastra candida conficienda Medici lithargyro immiscunt: uel ut quidam astringendi refrigerandi; uim medicamento concilient. Sed resinam etiam iniicere assolent, quo sequax ac sibi continuum fiat pharmacum. Verum quum mitissimæ omnium resinæ sint tum terebinthina ipsa, tum illa quæ larix dicitur, has miscere præstiterit, dum conficere tale medicamen est animus. Multo etiam leniora tactu omnia fiunt, tum quæ resina constât, si ceræ quid adiciatur: tum quæ ex cerâ, si modicum resinæ recipiant. At candido emplastro alba cera desideratur. Quam, si sponte sit nata, prius ablucere oportet: nimirum liquâtes ipsam, ac mox in aqua fontis mergentes, commouentes, & repurgâtes: qua ratione etiam pix, resina, & phylæma, ablucenda sunt.

Vlceribus incipientibus potiora eæ astringentia.

Anodynū pharmacum.

Thus carnem gignit.

Laxantia plethris et cacochymis admota, fluxū ad affe-

Ubi igitur cerussæ, spumæ; & argenti, adeo præcoctis, ut minimè inficiant manus, cera simul cum resina fuerit admista, candidum emplastrum habebis: cui aquam aut oleum miscere poteris. Ex oleis autem, Omphacium, Hispanicum; & pharmaco uim astringentiam adiciunt. Histricum uero cum exigua astringentia quâdā amaritudinē refert. Atqui principio ulceris, finiq; potiora sunt astringentia: dulcia autem in mediis.

Pondus ergo huiusce emplastri sit tale. Cerussæ, lithargyri, singulorum lib. j. Olei, lib. ij. Ceræ, lib. s. Terebinthinæ, vñc. ij. Quibus omnibus licebit tantum thuris, quantum & terebinthinæ, aut etiam dimidiā portionem addere. Qua industria medicamen maximè anodynum reddet: sed ad cicatricem inducendā ineptius: quâdoquidem ex ipsius usu caro ulceri excrescet, quum thus sit facultate sarcoticum. Taceo laxantia medicamenta corporibus plenis & cacochymis admota, fluxū

xum ad affectas partes citare. Satius itaq; fuerit, tñ ad cicatricem inducendam, tum ad digerendum exactius, aluminis scissilis, candidiq; , vnciam unam : piperis semunciam miscere.

Candidi ex pipere medicamenti, quod ad senum ulcera, & eorum qui mollem sortiuntur cuticulam, persananda est efficax, quodq; refertur ad Attalum Regem nostrum, qui olim Pergamensibus imperabat, compositio habet in hunc modum, Argenti spumæ, cerussæ, sing. lib. j. olei, lib. ij. ceræ, lib. S. terebinthinæ, vnc. ij. thuris uel tantumdem, uel media pars. aluminis, drach. vj. piperis, drach. ij. Verum apud Romanos, librari quidem dicuntur solida: ut mensurari humida. Metallica in primis sub sole coquuntur, donec duriusculam consistentiam adipiscantur: quibus reliqua postea misceri debent artificiose. Hoc pharmacum ulceribus humidioribus, atq; abrasis medetur.

Alba quæ oleo receti & aqua citra piperis atq; thuris misturam confici docuimus, uehementer commorsas partes offendunt. At minus illis Attalicum lædere solet: eo qd terebinthina, oleum uetus, thus, & piper adiecta sunt. Ad commorsa namq; minimè alumen conducit: quum opus hinc sit non astringentibus, sed abundè extrahentibus ea quæ in alto neruos punctos affligunt, & uenenatam animalium saluam. Distinguenda autem sunt cacoethe ulcera, ab ijs quæ non facile ad cicatricem perueniunt: quum non omnia cacoethe ulcera ægrè cicatricem admittant. Porro si blandius medicamentum, ad sedandumq; dolorem commodius, conficere uis, aliquid adipis anserini, uel gallinacei, uel porcini imiscebis. Sic namq; magis anodynum effeceris: minus tamè idoneum cicatrici inducendæ. In uniuersum autem, nemmo probè uti possit medicamento composito, qui simplicium uires prius non accuratè didicerit.

Aliud album Andromachi, Lithargyri, cerussæ, sing.

atq; partes conciliant.

Attalus Rex Pergami, patriæ Galeni. Candidi ex pipere compositio

Librantur solida. Mensurantur humida.

Commorsis quæ conueniunt medicamenta.

Cacoethe ulcera non omnia dyspneulotica esse.

Compositis recte nemo uti poterit, qd simplicium uires prius non didicerit.

Candidum Andromachi.

Minam Atticam. j. ceræ partem quartam. resinæ terebinthinæ tantundem. olei heminas. iij. aquæ heminas duas. conficito. Nonnulli porrò vncias. xx. minam cōtinere tradunt. Nonnulli sedecim. Atqui miret quispiam quomodo Romæ degens, pro libris nominare heminas. Cui urbi sunt familiaria uocabula libra, sextarius, & vncia. Ex multis autem medicamentis iā pridem conscriptis, prius q̄ potentia Romanorum usq̄ adeò creuisset, sum coniectura assequutus, quam illi uocarent heminam, fuisse æqualem nouē vncijs vnius libræ Romanæ. Aliud album Andromachi.

Heminā fuisse æqualem nouē vncijs libræ Romanæ.

Candidū aliud Andromachi.

Argenti spumæ drach. clx. cerussæ drach. cc. ceræ, drach. so. terebinthine, drach. xxiiij. olei hem. S. aquæ cyathos. vj. conficito.

Candidū Heras

Aliud candidum ab Hera descriptum. Ceræ albæ pont. lib. ij. lithargyri chrysitidis, lib. j. cerussæ tantū dē. myrrhæ, medullæ ceruinæ, sing. vnc. ij. thuris insecti, vnc. j. olei ueteris, sextarium unum. Lithargyrus oleo incoquitur: ubi uerò sordium crassitudinem acquisierit, cera, mox cerussa, aspergitur, moueturq̄. Vbi unita fuerint, nec iam polluāt, ab igne extractis medulla iniicitur. Postq̄ refrixerit medicamentū, myrrha & thus alijs miscentur. Dein emollitū, subactumq̄; manibus, ad usum seruatur. Etenim rabidorū morsibus auxiliatur, tum uulneri impositum, tum mole auellanæ nucis, catapotij instar exhibitū, quadraginta diebus. Ad hæc abrasa suggillata, & ulcera quæ difficulter admittunt cicatricem, psanat; ad aliaq̄; pleraq̄ est utile. Ego tamen propinare pharmacum hoc contra canis rabidi morsus, nunq̄ fui ausus: quum haberem aliud, nempe ex cancris confectum, medicamentum, ad sanandos illos maximè efficax. Ijs enim remedijs ipse uti semper conatus sum, quæ licet nonnunq̄ præsidij quod allatura essent, dubiā spem promitterent, neutiq̄ tamen obesse possent. Porrò Heras cum heminā scribit, sextarij

Morsui rabidi canis auxiliari medicamē ex cancris confectum.

Romani dimidium indicare uidetur, continentis vñcias uiginti, quas cornibus maiori ex parte metiuntur, incilis extrinsecus lineis quibusdam orbicularibus.

Sextarium Romanū cōtinere vñcias.xx.

In uniuersum autē, nisi metallica medicamenta plenus coquantur, emplastrum ex eis cōstans adeo friabile edetur, ut adhærere cuti absq; deligatura nō possit. At coquuntur largius, dum maiorem liquidorū mēsuram in mistura cōtinent. Quod uerò ad adipis differentias pertinet, in omni animantium genere iuuenilia perfectis humidiorē, minusq; calidū adipem possidēt.

Metallica plenus coquenda esse ut adhæreant.

Album quod ad Mnasæum refertur, ad diuturna et difficilia conferens. Lithargyri, Cerussę, singulorum drach. c. cere, drach. 50. terebinthing, thuris, sing. drac. xxv. aluminis fissilis, drach. xij. olei heminas. ij. Nec uerò differre putetis si drachmas. c. alicubi scriptas loci unius librę inueniatis. Libra siquidem drachmas sex habet ad nonaginta. Selibra, octo & quadraginta. Sic & huius rursus dimidium, uiginti quatuor.

Candidum Mnasæi.

Librā cōstare drachmis. 96.

Porrò quę ulcera ex humorum confluxu, uel multorum, uel acrium oriuntur, ita tamē ut locus affectus huiuscemodi in se dispositionē non habeat, qua influentem humorem, quāuis bonum, corrumpat: ea dyssepulotica, hoc est, ægrē peruenientia ad cicatricem appello. At quę dictā dispositionē sortiunt, singulari uocabulo cacoethe, hoc est malignātis naturę, uocant. Quibus sanē omnibus illa medicamentā conueniunt, quę absq; rosione & morsu desiccant: quęq; præter q̄ q̄ non erodant, aut manifestō astringāt, detergere etiam possint. Siquidem plurima eius generis ulcera, ceu ab exesione malignorum humorum sint caua reddita, impleri postulant. Atqui omnia quę carnem gignunt medicamenta, detergendi facultatem sortiuntur. Multa etiam alia siccā possidēt uim, ulceribus id genus curandis commodam. Eorum tamen meminisse impręsentiarum oportet, * quę aut tueri confecti emplastri

Dyssepulotica ulcera quę dicantur.

Cacoethe ulcera quę.

Vlceribus dyssepulotitis atq; malignis, q̄lia medicamentā conueniant.

Cera Tynhe-
nica.

Metallica ab-
luendi modi di-
uerſi.

Vnciâ cōflare
octo drachmis

candorem poſſint: aut non uſq; adeò uitare. Talia au-
tem ſunt, cadmia, pompholyx, calx, oſtea combuſta,
purpura, buccina, & ſæpiæ pars oſſea. Parum officiet
colori, & æris ſquama: & ex uſta chalcitide id quod ci-
nereum eſt, aut ſubalbidum. At uerò dictorū quodq;
ſi lauetur, totam roſionem amitter: quemadmodum tū
cera, quæ medicamini conſiciendo admiſcebitur: tum
reſina. Cæterū ut cera Tyrrhenica, uel pōtica eſt ad
candidi emplaſtri præparationem præſtantior: ſic re-
ſina, tum quæ larix, tum quæ terebinthina appellatur,
ad ulcera malignātia magis conducunt. Sed thuris ali-
qua portio etiam indenda eſt, ut ulcerum malignorū
ipſa diſpoſitio coquatur, & ad ſuppurationem perue-
niat. Iam uerò ad prætumida ulcera ex aceto & mari-
na curioſè leuigari debent metallica. In quibus autem
acre & mordax eſt quod in ulcera fert, ex aqua potius
maceranda ſingula ſunt: quemadmodum magis ex ui-
no, ubi copioſus humor ulceribus influens apparet.
Vbi igitur lithargyri cetuffæq; utriuſq; libram unam
cum tribus olei, & ſelibra aquæ ſimul & accuratè co-
xeris, reſinæ terebinthinæ, aut eius quæ larix dicitur,
ternas uncias inſcito: ceræ autem duplum ſufficit: nā
thuris ſat erit ſi unciam & ſemiſſem poſt ceram & re-
ſinam indideris. Deinde metallicorum tres vncias ad-
des, quas drachmæ quatuor & uiginti conſtituunt. Im-
pones autem duorum, trium, plurium, atq; oium que
numeraui: ita ut ſi omnia habeas, æquam ſingulorum
portionem inſcias: cadmię nempe, pompholygis, buc-
cinorum cineris, uel oſtreorum, & æris ſquamę ſingu-
lorum denarios ſetpē. qui tres vncias abſolunt. Quod
ſi calcem lotam immiſceas, ſingulorū drachmæ quin-
ponentur. Si uſtam chalcitidem, ſingulorum drachmę
quaternæ: ſic ut ex omnibus in unum coeuntibus, tres
tantū vnciæ conſentur.

Candidum emplaſtrum Damocratis, ad abraſa,

ambusta, & ulcera summa in cute suborta.

Cerussę lib. j. lithargyri, trypherg, sing. vnc. xvj. ceræ ponticę, vnc. v. terebinthinę purissimę, vnc. j. thuris mannę, uel thuris vnc. v. olei candidi, lib. j. aquę sextarius. Conficiatur ut decet. Porro in ijs qui molli sunt carne, in senibusq; aut ijs qui malo sunt præditi corporis habitu, aluminis licebit etiam quatuor uncias miscere.

Cadidum Da
mocratis.

GALENI PERGA

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN

dum genera. Liber secundus.



VT IGITVR si quando perdiderimus librum, cui inscriptę insint medicaminum cōsuetorum compositiones, similia reficere amissis ualeamus necessarium in primis est, nos uniuer-salem quandam uię formulam didicisse, qua propositum inueniamus: dein uerò secundū hanc in multis particularibus exerceri; scientes absq; tali exercitio nullum posse rectę opus absolui. Proponatur itaq; nobis cauum ulcus curandum. Etenim docti ab ipsa ratione, cauorum ulcerum curationem subministrari succrescente alia carne loco deperditę, ex ea uidelicet quę subiecta est; cogitamus fieri hoc non posse, si in ulcere sordes, aut copiosa humiditas subsit. Verū sordes medicamina detergentia auferunt; humorem, exiccantiā discutiunt. Quocirca necessum est huiusmodi pharmacorum materias cognoscere, idq; non simpliciter secundum genus eorum facultates cōsiderantes, sed inuenientes etiam quo ordine, quo uegradu, aut excessu, singula suas uires fortiantur. Finga-

Cauī ulceris
generalis cura
tio.

Cerā p se non
congruere vl-
ceribus fordi-
dis.

Ærugo per se
adhibita, rosio-
nem & phleg-
monē excitat.

Corpora vali-
da validiora
medicamenta
pferre posse.

Medicamenta
omnia ei esse
optima, qui af-
fectus quibus
exhibetur, co-
gnovit.

Viride medica-
men Galli.

Terebinthinæ
progiatua.

mus ergo nobis ad manum tantū adesse ceram, ærugi-
nemq; quibus cauum ulcus repleamus. Quum enim
compertum habeamus, ceram quidem solam, ulceris
sordes minimè prohibitorum esse, ut quæ nec deterge-
re, nec exiccare possit: æruginem autem per se adhibi-
tam, excitaturam tum rosionem, tum phlegmonē: utiq;
horum utrunq; vitabimus: medium autē ex ambobus
constituemus, ut imbecilius æruginē, sic cera ualētius.
Quia uerò paulo hæc interuallo relinquitur, ab eo qd
cōmodē administrari possit: ærugo autem magno id ip-
sum excedit: ob id sanè multæ cere modicam æruginē
admiscebimus. At quantam quantē miscere oporteat,
certē ante experientiam exactē quidem nemo inueni-
re poterit: conijcere autem poterit, iudicareq; & ita cō-
ficere pharmacū, ut primò nullum infelicē successum
sit habiturum: quemadmodum aliquando ego in quo-
dam uico confeci, cū ceræ fusæ ex oleo rhodino, libra
unica, unciam unam æruginis temperans. Ceterū
ualida corpora ualidiora medicamenta sustinent: quæ
uerò imbecilliora existunt, hoc est humido & molli ha-
bitu prædita, haud item talia perferunt. Dura itaq; cor-
pora ex copiosiori æruginē cerato admista, recipiunt
carnem: mollia ex pauciori. Quare ipsa experientia do-
cebit, quatenus uel augere, uel remittere, uel tueri phar-
maci facultatem expediat. Sunt namq; omnia medi-
camenta ei optima, qui affectus quibus singula offe-
runtur, cognoscit.

Viride medicamen Galli, ad glutināda maiora uul-
nera potentissimum, ab Andromacho scriptum.

Resinæ strobilinæ drach. ccc. cere drach. c. æruginis
rase, drach. so. thuris, drach. xxv. Aceti quod sit satis.
Hæc Andromachus. Ceterū quum strobilina resi-
na aliarum omnium longē calidissima sit: ambabus au-
tem qualitatibus moderatissima, quæ terebinthina uo-
catur: certē multò satius uidet hæc oibus medicamen-

tis, quæ rectè curabunt ulcera, permiscere: quâdoquidē primus, præcipuusq; in eis scopus est, ut id quod offer-
tur, non mordicet. Cōmendanda est autem ipsius thu-
ris cōmistio, q̃ emplastri consistentiam adiuuet, dolo-
rem simul leniens & concoquens. Quare si in ea com-
positione æqua ipsius portio coniuncta grugini esset,
tenacius & mitius ipsum redderetur medicamentum:
æruginis tamen exiccantem facultatem exolueret, quæ
ulceribus ægrè admittentibus curationem desyderat.
Meminisse autem oportet, fortium medicamentorum
ex aceto diebus pluribus contritorum, morsum & acri-
moniam obtundi: vires augeri. Eadem ratio est in me-
tallcis medicamentis combustis. Hæc tamen ex ignis
cōmercio nonnihil mordax, siue erodens perseruant:
quod elota deponunt, ac lenia prorsus redduntur.

Proposito itaq; emplastro, si ex rosaceo liquefacto
utaris, pderit fordidis, humidisq; ulceribus. Pura ue-
rò erodit: ac proinde miscendum ei est ceratum liqui-
dum ex cera & resina confectum: uel ex rosaceo, uel
oleo liquatum. Est autem oleinomen unum: quali-
tas & facultas diuersa. Quippè omphacinum frigi-
dus est: ex maturis oleis pressum, calidius. Temporis
autem progressu, calfaciendi uim auget. Sic etiā quod
salem habet, quantum ex illo sumpserit, tanto calidius
est: magisq; siccatur, q̃ quod ipsius est expers. Iam, quod
furculos oleæ continet, ualētius astringit. Indicabit au-
tem quod utilius est, & ulceris forma, & corporis egri-
natura. Vlcus siquidem, cōtrarijs remedijs curabitur:
corpus ulceratum, similibus. Rosaceum uerò prestan-
tissimum esse nosti, quod solis rosis pluribus oleo citra-
salem præparato plenius maceratis confectū est. Quæ
omnia si quis memoriter teneat, nec oblitus sit uirium
medicamentorum simplicium, is, & uaria emplastra ui-
ridia componet, & compositorum singulis q̃ rectissi-
mè utetur. Porro durioribus corporum, magis exiccā-

Thuris facul-
tas.

Fortium medi-
camentorū ex
aceto tritorū,
morsum quidē
obtundi, vires
autem augeri.
Elota acrimo-
niā amittere.

Olei differētiæ

Vlcus esse cu-
randū contra-
rijs, vlcera-
tum
corpus simili-
bus.
Rosacei opti-
mi præparatio.

Exiccātiū uim
intendi p mel-
lis miscellā, re-
mitti aut oleo,
aut cerato.

Viridis medi-
caminis opti-
ma tēperatura

Viride hecatō
drachmon di-
ctum.

Viride Epigo-
ni.

Viride Passio-
nis.

Viride Lite di-
ctum.

tia medicamenta exhibēda sunt: minus autem, mollioribus. Ad hæc intēdemus exiccantis medicamēti uim, ubi opus esse uideatur, admisto melle: remitemus autem & mitigabimus, ex oleo, & cerato, uel oleoso quopiam. Igitur cauū ulcus in sano corpore, uiridi emplastro, quod ex erugine, cera, & resina conficitur, liquato ex rosaceo curabitur. In cuius medicamenti compositione, equidē ceræ & resinæ soleo portiones pares miscere; eruginis autem duodecimā uel decimā, uel octauam; nimirum pro ulcerum corporumq; diuersitate. Atq; erit sanē duodecima, si ceræ pondo, & resinæ tantūdem, æruginis vncias duas temperemus: decimaq; & octaua ad portionem.

Viride Hecatondrachmon dictum, quod centum drachmas medicamentorum recipiat, ad magna uulnera glutinanda, & purganda sordida, maximè utile.

Ammoniacy drach. viij. squamæ, drach. xij. manne, drach. viij. resinæ siccæ, drach. xij. eruginis drach. viij. seui uitulini, drach. xiiij. resinæ terebinthinæ drach. viij. ceræ drach. xxx. olei quartam cyathi partem, aceti, quātum satis esse uideatur. Conficito.

Viride Epigoni, ad carnem gignendam efficax.

Æris squamæ, æruginis, guttæ ammoniaci, aristolochiæ, thuris, sing. vnc. j. Aloes, myrrhæ, chalbani, sing. vnc. s. Aluminis rotūdi, drach. vj. resinæ colophonice, drach. cc. ceræ drach. c. olei hemine dimidiū. Misceto.

Viride Passionis ad extrahendū & digerendū, utile.

Resinæ colophonice, drach. ccc. ceræ, drach. cl. æruginis, drach. viij. aluminis rot. tantūdem, squamæ eris, drach. xij. thuris, drach. xvj. æris combusti, drach. viij. Salis Ammoniacy tantūdem. Olei dimidiū cyathi. aceti quod satis esse uideatur. Conficito.

Viride Lite appellatum.

Resinæ lib. xij. ceræ lib. viij. æruginis rasæ, * Lib. ij. seui uitulini, lib. ij. aceti lib. so. Ego autem māne librā inijcio.

Injicio. Liquet igitur acetum cum duabus æruginis libris, & una ipsius mannæ, læuigandum esse: ac dein liquida ipsis miscenda. Hoc medicamentum emollit, cōcoquitq; adipis atq; manne ratione.

Porro ad efficienda uiridia medicamēta, gruginem non modicam immittere oportet, ut cetera in suum colorem permutet. Quare que pertinaciter proprium colorem tuentur, ea simplicia ab hac miscella abigenda sunt. Sed neq; inter coquendum est injicienda ipsa grugo: uerū ubi in mortario unitas facta est, tūc miscēda.

Consilia igitur curandorum ulcerum sunt, sordidis adhibere abstergētia medicamenta; pfluentibus exiccantia; atq; id quod in fluxu est, repellētia. At si copiosum & contumax sit quod fluit, fluoris causa prius est amputanda. Constat autem, inflammatorum ulcerum prius esse sanandam phlegmonem; carnem intemperatam, reducēdam esse ad temperiem; cui sanē quatuor modis simplicibus, totidemq; compositis, per contrarias qualitates succurritur.

Porro ubi sinum implere proponimus, medicamētum Isis uocatum, aut Machæronis emplastrū liquidum ex copiosiori oleo, per foratum cornu infundendū est: ad quod etiam pyulcis utimur. Est autem ipso medicamento tunc meraciori utendum, quā sinus oppletus est sordibus; ut soluto ex oleo largiori, dum magis purus existit. Cæterū si parue adhuc phlegmones sinum infestantis suspicio adsit, medicamētum ex rosaceo liquabitur. Pari modo & medicamentum siccum, quod ex charta combusta constat, rosaceo copiosiori diluentes, ipsi sinui infundimus. Quemadmodum uerò sinus liquidioribus pharmacis indigent; ita quæ superficie corporis caua ulcera infestant, crassius medicamentum postulant. Meritō igitur in id genus uitij, ceratum ualidē abstergētibus admiscemus; in sinibus oleum, uel rosacei plurimum. At uerò medicamē-

Viridia conficiendi ratio.

Ulcera curandorum uniuersalia consilia.

Ulcera inflammata curatio.

Sinus implendi ratio.

Sinus liquidiora pharmaca postulant.

Salis facultas.

ta quæ ex salibus constant, ubi animus est carnem gignere, offerenda non sunt. Sal quippè magis astringit quàm purget: siccat uerò nihilo minus quàm nitrum. ac aphronitrum. Melina emplastra.

**Melinorū atq;
uiridiū discer-
gunt.**

Quemadmodū uiridium emplastrorum plurima, propter æruginem præpollentem talia fiunt, ita quoq; melinorum nonnulla. Sed uiridia æruginem incoctam, habent: melina uerò coctam, sed mediocriter. Andromachus igitur complura melina scripsit, ad glutinanda ulcera, carnem gignendam, inducendamq; cicatricem idonea: quale est quod subdam.

**Melinum An-
dromachi.**

Lithargyri drach. C. iij. olei, heminā quidem, æstate: hyeme autem tres cyathos. ceræ, drach. xlviij. colophonix, tantundem. ammoniaci thymiamatis, drach. xxiiij. æruginis rasæ, chalbani, myrrhæ, sing. drach. viij. conficito. Aliud simplex. Lithargyri drach. C. axungie, drach. lxxv. olei ueteris tantūdem. misce. Conuenit enim carne molli præditis: digeritq;. Aliud Heraclidis, interiores abscessus sine dolore discutiens. Lithargyri, cerussæ, sing. drach. c. ceræ drach. lxxx. resinæ aridæ, drach. lx. ammoniaci thymiamatis, drach. so. chalbani, drach. xvj. olei ueteris, heminas. ij.

Melinum Menæti.

**Melinum Me-
næti.**

Lithargyri, lib. iij. olei lib. iij. tereb. lib. ij. ceræ, lib. j. æruginis, thuris, chalbani, sing. vnc. iij. ammomiaci thymiamatis, vnc. vj. conficito.

**Melinum Se-
rapionis.**

Melinum Serapionis, ad uulnera, & ad resoluendū. Lithargyri drach. c. ammomiaci thymiamatis, drach. xxviij. ceræ, drach. lvj. æruginis Cypriæ, drach. ix. myrrhæ, drach. j. colophonix, drach. lvj. chalbani drach. viij. olei, heminam. S. Quod si æstas sit, quartam partem heming. Aduerte autem myrrham non sustinere coctionem: quam nec thus, nec aloë ferunt.

**Coctionē non
sustinet myr-
rha, nec thus,
nec aloë.**

Hygieni emplastrum ad multa: quo ad ulcera uix cicatricem ducentia nullum melius extat.

Lithargyri chrysitidis, minam; cere tantūdem: chamæleontis nigri, radicis, drach. xxxvj. æruginis rasæ, drach. xvij. chrysocolle. drach. xl. olei ueteris heminas iij. Conficito. Preparatur optimè argenti spuma, si intrita uino Phalerno sub estu caniculæ, dein afficitur.

Emplastrum ex chamæleonte, quod cicatricem ulceribus difficillimis, callosis, & inueteratis inducit. Lithargyri Minam. j. ceræ, minas. vj. æruginis minas iij. chamæleontis minas. viij. olei minam unam. Conficito ut decet.

De ruffis emplastris.

Quemadmodum propter crudam quidem æruginē sunt uiridia emplastra: propter mediocriter autem coctam, melina: sic ruffa euadunt, ubi liberalius ea coquuntur. Manifestum igitur est, melina, ruffa q; oleum copiosius, q̃ uiridia, recipere. Ruffum porrò, quo semper mea industria parato utor, in hunc modum coquit. Argenti spumę cum oleo prius coctę, metallica ex aceto læuigata immitto, & sic coquo, donec amplius manus non polluat. Impono itaq; olei uetustioris libras quatuor: argentę spumę lib. iij. aceti q̃ acerrimi, lib. ij. Horum trium metallicorum, squamę gris nigri, æruginis, chalcitidis, sing. vnc. ij. Ceterū hyeme plus olei q̃ per estatē miscendum est. Ac sanē hoc medicamen cruenta uulnera glutinat, magis q; in duris corporibus. curatuq; difficillima ulcera p̃coquit. In sūma uerò, solū hoc sinus glutinat, astringit fistulas, exiccat, et p̃sus claudit. Ipsum tñ iuuat spongia recens ueteri uino respersa. Deligatura in sinibus ab imo fiat, uersus ulceris osculum.

De ijs quę cicatricem obducunt.

Quanto autem glutinantia sarcoticis magis dicuntur siccare, tanto glutinantibus epulotica, siue cicatricem facientia. Ea tamen ex aliquo astringenti oleo (cuiusmodi rosaceum, aut myrteum est) solent administra

Rrrr ij

Hygiēi emplastrū multi vsus

Lithargyri p̃parandi ratio. Emplastrū ex chamæleonte.

Ruffa emplastrum fieri per longam coctionē æruginis.

Ruffum emplastrum Galeni

Deligatura q̃lis adhibenda sit sinibus.

Cicatricem obducuntia.

ri. Porro inter ea quæ apud omneis magnificè cōmendantur, inducendę cicatrici præstantissimum est quod ex cadmia, quodq; ex ladano constat.

Emplastrum ex cadmia.

Epulotici ex
cadmia.

Cadmia ustæ, & ex uino præparate, chalcitidis tostę, sing. drach. lxxx. picis colophoniacę, vnc. viij. uini Phalerni, quod satis est. Conficito ut decet.

Aliud etiam ex cadmia.

Cadmia tostæ, chalcitidis tostæ, diphrygis, sing. drach. xvj. cere, resine frictæ, olei myrti, sing. selibræ uini Italici, quod sit satis.

Aliud ex cadmia.

Argenti spumę, cerussæ, cadmiæ, diphrygis, resine, sing. drach. viij. chalcitidis, drach. ij. ceræ, drach. viij. myrtei olei, & uini amingi, quod satis esse uideatur.

Emplastrum ex ladano.

Emplastrum ex
Ladano.

Chalcitidis, argenti spumę, ladani, singulorū drach. xxiiij. bituminis drach. viij. ceræ, vnc. ix myrti heminam. uini tantūdem.

Emplastrum Pyricauton dictum.

Emplastrum py
ricauton.

Olei heminam, aluminis fissi, manne, thuris, argenti spumę, chalbanı, singulorum drach. 50. ceræ, drach. xxiiij. anchusæ, drach. viij. medullę ceruine, adipis suillę, æruginis, cerussę, sing. drach. ij. ouorum trium lutea. Conficiatur ut decet.

Medicamē ma
gne dictum.

Medicamen Magne dictum, ac uerè magnum contra ulcera quæ difficulter cicatricem admittunt; quod ex rosaceo dilutum, etiam sedis affectus sanat.

Argenti spumę, drach. c. cere, drach. 50. Cerussæ drach. c. terebinthing, drach. xxv. thuris tantūdem. aluminis fissi, drach. xij. olei heminas duas. Conficito.

Emplastrum
Thelamonis.

Aliud Thelamonis accommodatum carbunculis, sinusq; exiccans. Pityinæ, ceræ, calcis uiuę, lithargyri, sing. drach. 50. cerussę, drach. xxv. olei tris cyathos.

Aliud Moschionis unicè conferens ad amouendum

MED. SEC. GEN. LIB. II. 261

ulceris callum, sanandosq; sedis affectus. Argēti spumę, cerussę, calcis uiuę, sing. drach. viij. medullę ceruę, cerę, utriusq; drach. xvj. olei myrtei quātū sit satis.

Emplastrum
Moschionis.

Epuloticum medicamen Andromachi.

Cadmig, lib. j. chalcitidis uste, cerę, sing. tantūdem. resinę aridę, lib. iij. Myrtei tantundem. Vinum sic-
cis immiscetur.

Emplastrum
Andromachi.

Aliud eiusdem candidum epuloticum.

Argenti spumę, minam. j. cerussę tantūdem. cerę, re-
sinę, sing. minas. iij. olei heminas. iij. aque heminam.

Candidum Thelephanis.

Argenti spumę, drach. lxxx. cerussę, drach. cxx. myr-
rhę, drach. iij. obo. ij. Sagapeni, drach. v. thuris. drach.
vj. obo. iij. olei heminas. ij. S. Omnia simul coquito.

Candidū The-
lephanis.

Aliud ad herpetas, carbunculos, condylomata, &
rhagadas maximē ualēs: quod etiā phlegmonas arcet.
Adipis suilli, drach. lxxxviij. cerę cādide, drach. xlviij.
cerussę, drach. xij. argenti spumę, tantūdem. conficito.

At uerō nōnulla emplastra cephalica, & catagma-
tica nominant, potissimū à caluarię fracturis, quibus
solent opitulari. Sunt autem talia, abstergendi, digerē-
di, & siccandi potestate prædita. Pleriq; tamen paulu-
lum ex astringentibus pharmacis eis admiscunt: ut id
quod affectis partibus influit, repellatur: & abster-
gentium facultas in altum usq; descendat. Cæterū
nisi astringentia conterantur in tenuissimum pol-
linem, magis obsunt, q̃ profint, ijs quę trahendi uim
obtinēt.

Cephalica
pharmaca vñ
de dicta, et quę
facultate præ-
dita.

Catagmaticum optimum ab Asclepiade traditū,
ad confirmanda fracta ossa Argenti spumę, bituminis
sing. drach. cc. picis aridę, cerę, sing. drach. c. terebin-
thing, drach. 50. aluminis fissilis, propoleos, singu. dra-
ch. xxx. ammoniaci thymimātis, drach. xxiiij. ærugi-
nis, drach. x. olei sextarios quatuor.

Catagmaticū
Asclepiadis.

Moschionis catagmaticum ad fracturas, contu-

Rrr r ij

Catagmaticū
Moschionis.

siones, atq; recentia uulnera, aliosq; affectus complu-
res celebre.

Argenti spumę, minam. j.

pice, tantundem. seui uitulini, tantundem. Terebi-
thinę, drach. octoginta. manę thuris, tantundem. cere,
drach. xl. eruginis, opopanacis, chalbani, sing. drach.
viij. olei cicini, aceti, liquoris sycamini, sing. heminam.
pice liquide hemine dimidium. Conficiatur ut decet.

Mina cōtinet
vncias. xx.

Vncia constat
viii. denariis.

Cephalicis ad
quę Medici
tantur.

Pro mina in presentiarū intelligo vncias uiginti: qua-
rum singulę pendent octo denarios. Sic itaq; contine-
bit mina centum sexaginta denarios.

Proprię autem dicuntur emplastra cephalica, ea q̄-
bus Medici in ijs capitis fracturis, quę ad diploen pe-
netrarunt, utuntur, ad extrahenda ex alto, superficiem
uersus, non ossa modò, sed his multo magis humores
crassos & uiscidos, intus delitescentes. Quare acrimo-
niam quandā fortiantur oportet. Itaq; catagmaticis ce-
phalica generosiora existunt: quę quidem mista cera-
to, carnem possunt producere. Quocirca, sarcoticis
quodammodo sunt similia.

Cephalicum
Hera.

Cephalicum optimum ad capitis fracturas ab
Hera descriptum.

Squamę aris, drach. xxv. aluminis, aristolochię lon-
gę, sing. drach. xx. ammoniaci thymiamatis, thuris, sin-
gu. drach. xxv. myrrhę, drach. xij. seui taurini, terebin-
thinę, pitying, singu. lib. iij. olei heminam. aceti quan-
tum sit satis. Conficito.

Aliud eiusdem, arcens phlegmonē, maximeq; ad
fracturas, & puncturas neruorum conducens.

Argēti spumę, drach. xxv. bituminis aridi, drach. c.
pice aride, drach. 50. cere drach. 50. resine pitying, dra-
ch. xxv. ammoniaci thymiamatis, æruginis, aluminis
fissi, propoleos, sing. drach. xv. olei ueteris, lib. iij. con-
ficito.

Andromachi catagmaticum.

Catagmaticū
Andromachi.

Argenti spumę, pice, cerę, seui taurini, thuris, sing.
minam. pice liquidę, heminę dimidiū. liquoris sycamini.

mini, heminā, terebinthinā, minā, opopanacis, chalbanī, æruginis, sing. drach. viij. ricini heminā. Ammoniaci thymiamatis, drach. xxv. Ex uino austero diluitur.

De emplastris glutinantibus.

Quidam hæc ἐναιμα & τραυματικά nominant: estq; opus eorum coniungere, & diuisas partes conglutinare, reducereq; ad pristinam integritatem. Sunt autem sarcoticis ipsa glutinatoria sicciora. Ad hæc, sarcotica quidem, detergendi uim, sed absq; rosione possident. Glutinantia autem, tantū desiccantia esse debent. Cæterū cicatricem inducentia medicamenta, præter q̃ q̃ astringunt, sicciora etiam sunt glutinātibus. Etenim glutinantium est finis, nullā inter coitura subnasci humiditatem permittere: cicatricem uerò inducentium, non modò hanc prohibere, sed consistentem etiam in ijs, quæ cicatricem sunt receptura, cōsumere: præterea callo obducere, & astringendo obdurare. At sarcotica sanguinem ad refectionem idoneum tam quantitate, q̃ qualitate tuentur. Iam quod nullius sit mordicationis particeps medicamen, purū ulcus cōseruat, si quidem tale illud acceperit. Porro molliora humidioraq; corpora, imbecilioribus medicamentis indigent: ut uehementioribus, quæ prorsus contraria existunt.

Glutinatorium ab Andromacho scriptum, nomine Barbarum.

Picis, resinæ, bituminis, sing. drac. cc. thuris, drach. xxiiij. olei heminam. Conficito.

Aliud eiusdem.

Picis lib. ij. bituminis, ceræ, sing. lib. j. Ammoniaci thymiamatis, mānæ, sing. vnc. vj. cerussæ vnc. iij. olei heminæ dimidium, aceti heminas. iij.

Aliud enæmon Iuliani.

Argentī spumæ, bituminis, cere, picis, brutiæ, sing. drach. so. resinæ frictæ, drach. xv. æris squamæ, drach. xij. thuris, drach. xiiij. chalbani drach. viij. chalcitidis

Rrrr iij

Glutinantium medicaminum usus. Sarcoticorum facultas.

Epuloticorum opus.

Molliora corpora imbecilioribus medicamentis indigent.

Glutinatorium Andromachi, Barbarum nomine.

Enemō Iuliani

drach. iij. aloes drach. vj. gallæ, drach. iij. myrrhæ tā-
tūdem. aristolochiæ longæ, drach. vj. aristolochiæ ro.
drach. iij. olei ueteris, heminas. iij.

Enæmō nigrū
ab Hera.

Nigrum Enæmon ab Hera conscriptum.

Ceræ, picis, bituminis, pityinæ, singu. lib. j. mannæ
vnc. vj. cerussæ vnc. iij. chalcanti tan tūdem, opopa-
naxis, vnc. ij. olei semiminam. aceti heminas duas. Cō-
ficio ut decet. Valet ad diuisiones notatu dignas, ma-
ximè capitis: ad fistulas, sinus, fracturas q;. Cohibet mi-
rifice sanguinē erumpētē. Canum hominum q; mor-
sibus auxiliatur: ac prorsus phlegmonem arcet.

G A L E N I P E R G A M E N I D E C O M P O S I T I O N E M E D I C A M E N T O R V M S E C V N- dum genera. Liber tertius.

Putrescentium
curatio p quæ
fieri debeat
medicamentā.



Nudatū nerui
quā medēdi ra-
tionē postulet.
Pūcti nerui q;
lia medicamē-
ta postulent.

VANDOQVIDEM quæ pu-
trescunt omnia, ex humiditate & calo-
re id patiūtur, certè in uulneribus ob-
noxijis putredini, curationem per sic-
cantia & refrigerantia moliendā esse,
semper mecum existimaui. Rursum
apud me contemplatus, frigidum neruis ab Hippocra-
te inimicum dici, optimum fore medicamen neruorū
uulneribus intellexi, quod & siccaret, & medium esset
inter ea quæ calfaciunt, & refrigerāt: uel quod parum
ad calfacientium latus ab ipso medio recederet. Posse
etiā calidum abundè esse pharmacū, modo siccandi
facultate polleret. Quippè calor citra humiditatem hu-
mectare non potest. Cæterū ubi nudatis neruis me-
demur, tunc prædictam auxiliorum integram indica-
tionem assumi ratio est. Vbi uerò pūctis, ita ut partes
interiacentes sint sang, tenuius pharmacum inuenien-
dum est, cuius uirtus interiacentes particulas pmean-

do non dissoluatur, sed in altum penetret. Hoc autem facere poterit pharmacū uehementer exiccans. Quod quidem, etiam si non sit in calore & frigore symmetrū, offendere neruum læsum non poterit; quā facultas calfaciendi aut refrigerandi (quæ illi inest) admodum imbecillior reddat, dum particulas neruoso corpori prepositas permeat. Porro inter omnia quæ refrigerandi uim habent, tenuiorum partiū acetum est q̄ acerrimū: quod etiam caloris modici est particeps. Inter calfacientes autē liquores, qui partiū tenuitate sint p̄diti, primæ tribuuntur partes Cyrenæo succo. Cæterum si eius facultas non detur, utemur Medico, uel sagapeno uocato, uel euphorbio. Panacis etiam, & tithymallorum liquores, & opobalsamum tenuandi facultatem sortiuntur. Ex terrestribus etiam nitri spuma, aphronitrū, beroniceum nitrum, petra asia, eiusq; flos, partium tenuitate insigniuntur. Ex metallicis auripigmentum, & sulfur, tum subtilia, tum calida sunt. Quibus succedit moly, æris squama, & chalcitis, parum simul astringētia. Citra calorem uerò manifestum tenuis essentia metallica sunt, spodiū, pompholyx, & psoricū. Subtilis abūde est, & chrysocola. Ex succis, laurinus ualenter calfacit, ac præterea tenuandi uim possidet. Nihil autem minus eo cedrinus calfacit: calore tamen qui sensibus subiicitur, propter substantiæ tenuitatē, illi cedit. Eiusdem generis cum cedrino est lixiuia, quam stactem uocant. * Quæ quidem si ex tenuiorum patium materia uista fiat, cedrinum oleū uirtute superat. Iam ex cerealibus, subtilissimus est eruus, sine insigni calfaciendi uis: lolium uerò, cum insigni. Hordeum nequaquæ calfacit. Mediam inter ea materiā obtinent, qualitatibus amara: ut quæ multū tenuibus substantia cedant, & crassi nihil possideant. Igitur medicamentorum materię non semel aut bis, sed frequenter sunt explorandę: quando quidem sensibilibus rerū cognitio, inspectione sedula

Aceti facultas.

Succorum calfacientū differentia.

Terrestria, partium tenuitate prædita.

Sensibilium rerum
cognitio, inspe-
ctione sedula
confirmatur.

Medicamenta
reponendi 16.
Galenus ex oi-
regione cura-
bat sibi ad fer-
ri omnigena
medicamenta.

Nervosarum par-
tium doloribus
quid medeat.

Putrescentium
circa articulos
partium curatio.

Nervi vulnera
ti curatio.

confirmatur. Cuius rei indicium evidentissimum est, quod gemelli per omnia similes esse nobis uisi, differetes appareant istis, qui non per transennam, atque obiter, sed accuratè inspicere eos consueuerunt. Itaque herbarum, fruticum, arborumque materiam, prius quam è terra eximatur, contemplari pulcherrimum est, dum fructus uide licet futuri sunt, dum eduntur, dum augescunt, dum uigent. Ex hac namque speculatione assequeris, quando excerpenti sint, in siccisque domunculis reponendi. Etenim commodè reponuntur in locis nec subterraneis, nec sub tegulis, constitutis: sed medijs, atque ostia ad meridiem conuersa habentibus: propè quæ tamen reponi medicamenta non debent. Amicos autem omneis adhortor, si artis opera pulchrè obire uoluerint, ut me imitentur, qui ex omni natione quotannis præstantissima medicamenta ut mihi adferantur curo, eo quod perditum illi omnigenarum rerum coemptores, illa indies adulterio contaminant. Conuenit præterea medicum, non modò affectionis, quam singula medicamenta inducunt, qualitatem, sed etiam ipsius (ut ita dixerim) quantitatem coniecturare. Quippè quod humore copioso est auctum, non simpliciter humectari postulat, sed opus est, ut siccitatis quantitas, copie humiditatis respondeat. Porro nervosarum partium doloribus à frigore obortis, unice opitulatur emplastrum ex euphorbio, oleo, & liquata cera, confectum: ad computrescentes autem circa articulos partes, confert cataplasma ex hordei farina & stillatio lixiui paratum. Perfundendæ autem liberaliter partes circumiacentes sunt oleo calente: postea uerò, ubi lana sicca, totus mador fuerit exhaustus, humido cerato, & cui euphorbium admixtum sit, illinendæ. Porro secunda die, pro hordeacea farina, miscere eruina consueui: atque ubi iam totum quod computruit exemptum sit, paulatim primò quidem ad carnem gignentia: dein ad obducentia cicatrice, transire. Quando autem mihi

neruus aliquis uulneratus occurrit, interim per liqui-
da pharmaca curationem molior: interim per empla-
stra: lanam extrinsecus q̄ mollissimā, imbutamq; oleo
calente, applicans. Quod si medicamentum ex aceto
usurpem, aceti modicū oleo admiscens, bis ter ue quo-
tidie soluo, & oleo calēte foueo. Si noctes lōge fuerint,
etiam in his soluere consueui, idq; magis, dum ulcus à
medicamētis eroditur. Oleum autem quo fouebimus,
satis calens esto: uerū ita, ne uulneratā partem offen-
dat. Nam ut frigidū huiuscemodi affectibus aduersissi-
mum est, sic tepens non omnino utile. Nam quemad-
modum aqua ipsa, quatenus calet, aut friget, maximē
cōtraria facere natā est, ita quoq; oleū. Frigidū si qui-
dem, corpori admotum, perspiratum ipsius obstruit,
& prohibet: calidum uerò, digerit, extenuatq;. Porro
ab aquæ usu in tota curatione ita tempero, ut ne attin-
gat quidem ulcus. Proinde, quū sanguis initio statim
à uulnerata parte abstergendus est, ex oleo id facere
expedit. Iam uerò acetum, si quando ipso ad affectos
neruos utamur, in se nihil uinosum contineat. Oleum
autē omni astrictione uacet, sitq; omni ex parte tenuis-
simum: quale Sabinum existit. Memini autē me, quū
alia remedia deessent, neruorū uulnera propoli recēti
curasse: interdum etiam antiquiori fermento. Quæ
ambo aliquando commiscui.

Vetus etiam euphorbiū oleo læuigans, instarq; ca-
taplasmatidis adhibens, aliās tendinem punctum sana-
ui: id quod, euphorbio recenti adhibito, neutiq; succes-
sisset: quum calorem magnum, mordicationemq;, atq;
dolorem excitet. Eorum tamen euphorbium est, quæ
calorem caducum, atq; statim euanescentem sortiun-
tur. * Cæterū alijs multis pharmacis accidit, ut pau-
culis annis eorum uis resoluat: id quod, post thapsiā,
nullo minus euphorbio contingit. Quippe thapsia bi-
mula, expirat penitus: quum euphorbij uires, ad sextū

Tepidum oleū
cēsis neruis nō
congruit.

Aquæ usum vul-
neratis eē ner-
uis inimicissi-
mum.

Euphorbiā ad
punctos tendi-
nes facere.

Euphorbii uis
cito euanesce-
tur.

Thapsiā bimū-
lam expirare
propterea.

Resinarū differe-
rentiæ.

Propolis vires.

Fermenti facul-
tas.

usq; annum seruari possint. Porro ubi pharmacū cō-
sistentia simile acopis dictis unctionibus habere vo-
lueris, oleum sit quadruplū ceræ. Vbi uerò emplastrū
speciem referet, parem ceræ portionem oleo expedit
temperare; maximè si sicca & uetusta fuerit; ac tum sa-
nè ipsi ceræ sic temperatæ, poteris sextam partem eu-
phorbij recentis adijcere; ita ut illius sex drachmæ; ce-
ræ sex; atq; item olei sex misceantur. Licebit etiam re-
sing, aut picis, aliquid emplastro ipsi adijcere, ut gluti-
nosius euadat: tunc tamen minus infundendū est olei.
Ac resinarum quidem omnium siccissima est, quā alij
phryctem, alij colophoniam appellant. Huic succedit
quæ ex figulinis impura sumit: quā si purges, in phry-
ctem mutabitur. His ambabus siccior est, quæ dicitur
pitynon physema. Ego tamen ad rem propositā phry-
cte utor, & liquidis. Harum rursus nōnullæ diutius li-
quidæ permanent, quemadmodum terebinthina; aliæ
cito inarescunt, ut strobilina; media utriusq; est abietina.
Quin etiā facultate calidior est quidem strobilina;
mox uerò abietina; deinde terebinthina. Poteris autē
medicamen quod euphorbium receperit, experiri in
tuo crure, uel brachio; atq; ita ex affectu quem inferet
aut remittere ipsum, aut eius uireis intendere: remitte-
re quidem, mistura cerati; intendere uerò, appposito eu-
phorbio. Quod si propolim pinguem habueris, eam om-
nibus resinis aptiorem fore tibi intelligito: ut quæ ua-
porosam spiritus crassitiem, humoresq; superfluos eli-
ciendi, atq; ex alto foras extrahendi, à natura uim ha-
beat: quæ facultas ueteri etiam fermēto inest. Iam uerò
ad uulneratos nervos nōnunq̃ sum usus sulfure uiuo,
sicuti & arsenico, & sandaracha, & calce tū uiua, tum
extincta, lota q; & illota; singulis nimirum horum per
se cum tetrapharmaco temperatis. Porro Empirici ex
casu unum aliquod simplex medicamentum utile ad
proposita inueniunt. At rationalis methodus, plurima

simul inuenit, & uarias ipsorum cōpositiones. Etenim quæ ex alto humores educere, digerereq; possunt, neruorum uulneribus sunt ex usu. Quandoquidem uerò nonnulla horum qualitates habent immoderatas, alia eis immiscenda sunt, quæ ipsorum excessus, illæsa facultate, retūdant. At rectè hoc fieri nequit, nisi cuiusq; medicamenti, nō modò qualitatis genus, sed ipsius etiā qualitatis gradum, quantitatem ue cognoscas. Quocirca Empirici, quod ignorent naturam simplicium, homogenia tantūm, atq; similia cōmiscent; quemadmodum alij pleriq; q̄ excessus quantitatem non assequantur. In uniuersum autem, pharmaca liquidiora, minus molesta sunt, quum alijs, tum uel maximè neruorū uulneribus. Cauendum tamē perpetuū est, ne aquis læsa particula respergatur. Verūm qui pulchrè neruorum uulneribus prospecturus est, etiam particularum naturæ sit peritus oportet. Est autem curatio cōmunis, sicuti & periculum par, tum in contussis ac uulneratis neruis: tum in sic affectis tendonibus. Porro in uulneribus iuxta femoris longitudinē factis, deligatura uulnerati musculi partibus inuicem contrahēdis sufficit. Per transuersum uulneri accepto, nihil deligatura contulerit; sed sola sutura totum opus absoluitur. Has igit̄ nisi quis altas faciat, musculi partes permanebunt in-glutinatę. Consuēdg etiam sunt membranæ ipsæ cum musculis quibus cohærent. At tendines, membranarū instar extensos, & dilatatos, non mediocri cum periculo consues. Ligamenta autem, quomodocunq; afficiantur, ab omni sunt remota periculo: utpote īsensilia existentia, & ex ossibus, non ex musculis, ut tendines, orta: neq; ex cerebro aut spīnali medulla, ut nerui. Igitur medicinæ partes, mutuam opem requirunt: tum quæ manu, tum quæ medicamentis, tum quæ uictu medetur: maximeq; illa quæ manu curat, reliqs duabus indiget. Porro pūctiones neruorum angustā cutis diui-

Neruis vulne-
ratis conferre,
quæ humores
ex alto educe-
re, ac digerere
possunt.

Empirici cur si-
milia tantū me-
dicamenta cō-
misceant.

Aquam neruis
lēsis esse inimi-
cam.

Tēdinum atq;
neruorum ante
ctus æque peri-
culosos esse, eā-
dem p̄ medēdi
rationē desyde-
rare.

Femoris vulne-
ra glutinandi
ratio.

Tendines non
absq; periculo
consui.

Ligamentorū
affectus cur pe-
riculo vacent.
Medicinæ par-
tes mutuā opē
desyderant.

Punctiones ner-
uorum angustæ
nō in eodem me-
dicamento cu-
ratur, quibus ner-
ui nudati.

Punctionū an-
gustæ oris quo
mō dilatandæ.

Neruis vulne-
ratis quæ me-
dicamenta cō-
gruant.

Medicamenta
duo, eiusdē qui
dē generis, sed
facultatib; dif-
ferentia, ad vul-

tionem habentes, non eodem curantur medicamento, quod nudato nervo auxiliatur: sicuti neq; id quod puncturis medetur, nervo nudo est ex usu. Quippe multo calidius est, magisq; mordet, q̄ ut nudus nervus ipm perferre possit. Præcipuè autē danda opera est, ut oræ angustiorum punctuum apertæ sint, quo calidum medicamē admodum extrinsecus, per eas vapores eliciat: attrahēs humiditatem circa affectum locum intus delitescentem. Quamobrem orificium duabus in cute sectionibus ad rectos angulos dividere oportet.

Cōfectiones medicamentorū ad nervorū vulnera.

Ex metallicis astringentia vitanda sunt, præsertim ubi nervi sunt puncti. Detergentia autem conferunt: quæ tamen sub æstivo sole, ex acerrimo, vetustissimo, substantiaq; tenuissimo aceto leuigare oportet, quo felicius crassitudo partium, qua omnia metallica prædita sunt, auferatur. Quanto autem longiori tempore attrita fuerint, hoc tenuiorem consequentur substantiam: eruntq; aptiora angustis vulneribus: quemadmodum in nervis carne nudatis, admodum tenuia, exedētiaq; cauenda sunt: quibus sanè pastilli Andronis, Polyidæ, & Pasionis congruunt, ex sapa, quam Sargon uocant, appliciti. Ad punctos autem nervos, equidem compositis medicamentis omnibus, illud præstantius semper esse usu ipso cōperi, cui copiosa gris squama iesset: de in chalcitis combusta: postea misy. Porro ubi nervus qui nudus erat, ab imposito medicamento iam tectus fuerit, linamētis extrinsecus, unum aliquod ex ijs, quæ ad angusta conueniunt vulnera, superponendum est: aliudq; eiusdem materiæ toti affecti partiæ circumdandum, ita ut sanas quoq; partes, præsertim superpositas, plurimum comprehendat. Quum autem permagna differentia humanorum corporum sit, ob idq; unum cum medicamentum omnibus conuenire non possit, duo semper in promptu habeto, alterum nempe ua-

lentius, sed ex similibus genere confectum; alterum mitius & blandius: quæ inuicem temperans, dum postulat usus, pro uarietate misturæ, permulta alia media inter ipsa constitues. Esto igitur ualentissimum metallicum tale. Chalcitidis crudæ, partē. j. misyos crudi, partes. ij. gris squamæ, partes tres. Mitissimum hæc recipiat, misyos, chalcitidos, utriusque combusti, partem. j. squamæ, partes quatuor. Medium sit tale. Misyos, chalcitidos, æruginis, cuiusque usti, partem unam. æris squamæ partes tres. Præterea ceræ in ualentissimo duplum: * in mitissimo duplum, atque ipsius dupli dimidium miscetur: at in medio, duplum, ac ipsius dupli quartam partem miscere oportet. Quum igitur ualidissimum ex sex partibus constet, duodecim illi ceræ partes miscebis. Imbecillimum autem, quandoquidem ex senis etiam constabat, octodecim (quod duplum, ac dupli dimidium est) recipiet. Mediocri uero dimidium harum partium omnium inde. Atqui octodecim & duodecim triginta partes constituunt, cuius numeri dimidium continet quindecim partes. Tot igitur mediocri medicamento adicientur ceræ portiones (id quod erat duplum, & dupli pars quarta) siue ex drachmæ sint, siue uncia, siue etiam libræ. Porro mensura qua Romani metiuntur oleum, est cornea, discretaque circularibus lineis, totam ipsam diuidentibus in duodecim partes. Atque integra quidem mensura ab eis appellatur libra: ut eius duodecima portio, uncia. Iam uero predictis pharmacis omnibus, iuxta cere portionem, addatur oleum essentia tenuioris, minimeque astringens: quod quidem ceram ipsam dimidio superet: ita ut octo illius uncijs, duodecim olei misceantur. Quin etiam ubi metallica pluribus diebus in mortario trita ex aceto fuerint, commodè illis thus candidissimum atque pingue miscetur. Cuius quantitas medice omnium portioni sit par: quam licebit tibi augere aut minuere, pro ut uolueris efficere medicamentum.

neratos neru
cur in prupte
habere sempe
oporteat.

Mensura olei
erat olim apud
Romanos cor-
nea.

Resinarū disse-
rentiæ.

Emollientibus
omnibus inef-
se putrificum
quid.

Chalbanū pun-
ctis nervis con-
ducit.

Metallica om-
nia dolorem
excitant.

Adeps tenuiū
partium, lenit
dolorem.

Euphorbiū ve-
tus recentiori
esse inferius.

Medicamē ex
euphorbio ad
neruorum pun-
ctiōnes cōmo-
dum.

tum mitius, aut acrius. Cerae etiam oleo liquatae, pote-
ris aliquam resinam ex predictis inijcere; sciens acrius
futurum pharmacū, strobilina iniecta; mitius, terebin-
thina: mediū utriusq; abietina. Ex harū genere quoq;
est larix, cæterū prædictis humidior; liquidæ piceæ
substantia similis. Miscebis igitur cere, sextā unius di-
ctarum resinarum partem, si uis ut medicamentum em-
plastri formam retineat. Chalbani uerò æquale thuri
pōdus indes, ubi mitissimum reddere statuis: dum ua-
lentius, dimidium; quando ipsorum medium, id quod
inter æquale & dimidium est. Inest porrò chalbano, ut
emollientibus omnibus, etiam putrificum quid; quare
nudatis nervis non usq; adeò cōuenit. At si nudus ner-
uus non sit, haud mediocriter permistio ipsius ad dolo-
rem leniendum confert. Omnia quippe metallica exas-
perant, doloremq; excitant; ut ex humidis etiam, ace-
tum. Quare dolori ab his excitato, plurimum auxiliae
fotus ex oleo & chalbano mistis, administratus. Nihil
autem minus chalbano dolorem lenit adeps tenuitate
substantiæ p̄ditus: qualis à feris, et agrestibus anima-
libus sumitur. Nam animalium quæ conclusa in urbi-
bus degunt, adeps est & humidior, & crassior. Ex his
igitur quæ leniant dolorem, habere aliquod medica-
men expedit, quod ex metallicis composito possis in-
terdum miscere.

De medicamento ex euphorbio confectis.

Vetus euphorbium recentiori longè est inferius. Si
igitur anniculum sit, etiam Cyrenæo succo, quē nunc
habemus, & cuius irrigatione stirpes augēt, & succu-
lentas reddūt, magis excalfacit. Porrò colore quidem
vetus recenti flavidius pallidiusq; apparet; substantia
durius, & siccus. Conficitur autem ex recenti euphor-
bio calfaciens medicamentum in hunc modum. Eu-
phorbi, vnc. j, cere, vncias. iij. olei, vnc. xij. quo smeg-
mate intrepidè uti ad puncturas poteris, dum uereris
ne oscula

ne oscula ipsa * cōnieant. Quodd si imbecillius fuerit euphorbium ipsum augenda eius mensura est, pro imbecillitatis ratione. Cæterum confectura cerā euphorbij triplicatam continens, aliarum est ualētissima, quū illud recens miscetur: quincuplam autem recipiēs, in ualidissima. At quadruplā capiēs, medio inter utraq; gradu consistit. Quodd si unguenta proponas facere, qualia ἀκονίτιον nuncupantur, oleū ceræ quadruplum im miscebis: si uerō, ut in fracturis, liquidum ceratum parare, duplum. At emplastron medicamen cupiens conficere, oleum pari mensura ceræ immisceatur, si quidē ambiens fuerit calore temperatus. Si naudem ille frigidus sit, cera autē uetus & arida, paulo ampliori misceri debet. Ut autem tenacius hæreat, terebinthinam, aut colophoniam, soleo emplastro adijcere. Pix etiam, cerati consistentiam tuetur. Multo autem præstiterit medicamentum, si resinæ, picisq; loco, propolim ceræ parem adiunxeris. Quæ si pinguitudine careat, cupimusq; ut adhæreat pharmacū, terebinthinam, uel laticem, uel syncomistem pineam, uel resinas sua sponte fluentes, miscebimus.

Medicamen confectum ex liquabilibus.

Ex aceto citra ignē liquefcit ammoniacum thymia ma, sagapenum, et opopanax. Igni uerō soluuntur propolis, cera, resina, & confimilia: quæ in duplici uase liquare est melius; nempe quum in cacabo aquam calidam continente, incumbenteq; prunis, alterū uas consistit, præter liquabilia etiam chalbanum continens. Valentissimum igitur ad uulneratos neruos medicamentum sit huiusmodi. Opopanaxem ex aceto dissolutum diutius conterito. Postea liquefacta illi super igne propolim, chalbanum, & resinam terebinthinam misceto. Singulorum itaq; aliorum pars una esto. Propoleos recētis, pinguisq; sex. Qua si careas, eius loco picem pinguem indes: qualis est brutia. Quodd si hæc nō

Medicamē
varias consist
tias parand
ratio.

Liquādī med
camenta in du
plici uase, rō.

**Medicamē ex
pice, vtile ad
canis rabidi
morsus.**

ad sit, uteris terebinthina. Ego nonnuncq; uel solum me-
dicamentum ex pingui pice confectum imposui, quo
etiam ad canum morsus utimur. Id autem recipit, pi-
cis, lib. j. opopanacis, vnc. iij. aceti, in quo illa coquun-
tur, sextarium Romanum. Etenim puncturæ oras cō-
niungere nō sinit. Sic tñ cōposito, in duris tantū utemur
corporibus. Nā in mollioribus, ex aliquo molliori, sed
digerente, unguēto, uel oleo, liquādum est. Quōd si lo-
co opopanacis, sagapeno prius in pila trito ex aceto, li-
quefactā resinam, propolim, & adipem quandā acio-
rem adijcias, eiusdē generis medicamē habebis. Mol-
lius tamē est, quod ex resinis, propoli, seu is, ac cera col-
liquatis, absq; aceto, conficitur. Cæterū quod indecē
seuū, sit acre: quale est quod ab agrestibus animalibus
sumitur, quodq; uetustum existit. Porro ex medullis,
ceruina, uitulinaq; antecellunt.

**Medicamē ex
solūbino ster-
core.**

De pharmaco ex columbarum stercore cōfecto:
Columbarum turricularum sterco acris est: quo inte-
rim ruri sum usus in adoloscēte, nerui uulnere affecto.
Cuius sanē tum cōpositio, tū usus, idē est, qui medica-
mini ex euphorbio inest: alijs quidem eodem modo se
habentibus: sed euphorbij loco, stercore indito.

De medicamento ex herbis confecto.

**Medicamē ex
herbis confe-
ctum.**

Ex herbis etiam tenuium partium, amaritudinem
absq; astringione, aut acorem modicum, referētib; gu-
stu, haud inidoneum ad uulneratos neruos confici me-
dicamen potest. Tales enim sunt dictamnū, amara-
cum, aristolochia, polium, argemone, chamæpitys, cen-
taurium, atq; id genus aliæ: quemadmodum etiam ra-
dices omnium aristolochiarum, dracunculi, cucume-
ris agrestis, bryonig, altheg, iridis, acori, mei, asari, phu-
gentianæ, & panacis: quæ omnes, perinde ut collyria
arida læuigari in tenuissimum pollinem debent. Nam
quod crassa est substantia, neruis uulneratis conducit
nihil. Læuigatum autem medicamen, alio quod cerati

modum habeat, est excipiendum, idq; ea temperatura, quæ in euphorbio prius indicata est.

De sumptuosis pharmacorum cōpositionibus, uulneratis neruis congruentibus.

Ijs autem qui odoratis & pretiosis oblectantur medicamentis, in hunc modum illa soleo conficere. Cinamomi, dictamni, mari, singulorum drach. xl. amara-
ci pauxillum. Hæc redacta in tenuissimum pollinem, cum cerato ex opobalsamo optimo, & cera Tyrrhenica facto confundo. Debent autem ceræ partes octo: opobalsami decem, in id ceratum coire. Adijcio etiam partem unā terebinthinæ odoratæ, ut medicamen non sit friabile, sed sibi mutuo cohæreat. Sed ex eodem cerato, & liquore cyrenaico similiter aliud medicamen compono: mistura pro portione euphorbio facta: tertiumq; aliud ex utrisq; temperatis cōflatum: quartum deinde, quod in se myrrhā stactem recipit. In quibus autem neruus est nudus, ibi ceratum ex cera quæ uocatur myreplice, & unguentis apud Romanos foliatis, & spicatis dictis, cōpono, duodeciamā partem pōpholygis ei admiscens. Licet autem ex Tyrrhenica cera id conficere: quam solā nihil etiam prohibet ex nardo optima liquefacere, idq; in duplici uase, quod in omnibus unguentis sit cōmune præceptum. At raso cerato, spicæ nardi, amomi, folij malabathri, & elotæ pompholygis, pares singulorū portiones miscebis. Etenim in pūcturis, acriora pharmaca ex usu sunt, quæ uulnus apertum conseruent. Denudatis autem, mediocri astrictione, cū digerendi uirtute, absq; morfu, p̄dita offerre cōuenit. At amomū, astrictiōis cuiusdā est particeps. Magis autem ipso nardi spica, & malabathri folium.

Quæ alij scripserint ad sananda neruorū uulnera.

Quidam nostræ ætatis Medicus utebatur medicamento, similiter meis confecto ex metallicis. Recipiebat enim ceræ, vnc. vj. olei, vnc. ix. misyos, drach. vj.

S sñ ij

Medicamina
sumptuesa vul-
neratis neruis
congruentia.

Vnguenta om-
nia liquāda es-
se in duplici
vase.
Puncti nerui, q̄
nudi, acriora
pharmaca po-
stulant.

Digerentia q.
Mitigatoria q.

chalcitidis, drach. j. squame æris, vnc. ij. S. thuris, vnc. j. S. chalbanī vnc. j. cera & chalbanum liquata, metallicis aceto intritis superfunduntur. Porro si nervorum uulnera non comitetur phlegmone, molliora humidioraq; statim a principio sunt potiora medicamentis durioribus, ac siccioribus: præstatq; liquata ipsa in digerente quopiā, uel mitigatorio medicamine administrare. Voco digerētia quidem uetus oleum, & ricinum, & sycionium: mitigatoria autem, rosaceum, chamæmelinum, & quod ex althea conficitur. His fortiora, eoq; durioribus corporibus magis idonea sunt, quod ex cucumeris agrestis radice oleo decocta exprimit; & quod ex iride, bryonia, & aro paratur. His ualentius est, ex dracūculo, aristolochia, et panace factū. Nos frequēter uſi oleo sumus ex abietis semine, populiq; flore pfecto.

Claudij Philoxeni Ægyptia, nervorum uitijis,
alijsq; congruens affectibus.

Ægyptia Cla
udij Philoxeni

Argenti spume, ceræ, sing drach. lx. ammoniaci thymiamatis drach. lxxx. propoleos. drach. xl. resine sicce, terebinthine, squamæ æris, thuris, sing. drach. xvij. lanæ succidæ exustæ, squamæ stomomatis, sing. drach. viij. opopanax, drach. iij. ricini heminas tres. Conficito artificioſe.

Fuscum Andromachi, contra puncturas.

Ammoniaci, cere, terebinthinæ, æris cōbusti, sing. drach. viij. picis aridæ, drach. xl. lithargyri drach. iij. aloes indicæ, aristolochiæ, chalbanī, sing. drach. ij. gurginis drach. j. thuris, drach. ij. olei hyeme quartam heminæ partem: æstate octauam: aceti tres cyathos, quibus ammoniacū dissoluatur. Conficito.

GALENI PERGA
MENI DE COMPOSITIONE
MEDICAMENTORVM SECVN-
dum genera, Liber Quartus.



QVANDOQVIDEM ex dysepuloticis quædam, saniei humorumq; ulceratis partibus influentium uitio, ægrè cicatricem admittunt: quædam ipsa affecta sede influentem succum quamlibet probum corrumpentet secunda ratione ulcera dysepulotica & cacoethe ppriè nominant: in quibus interim totam partem affectam excindere, uel adurere nonnulli coguntur, aut medicamentis crustam inducētibus, aut igne utentes. Quum autem ampla utrinq; latitudo sit, in eo q; alterum altero magis dysepuloticum malignumq; est, tot sanè dyderantur auxiliãtia pharmaca, quot fuerint ipsorum ulcerum differentia. Quare duo, ut minimum, quæ idè polliceantur, eandemq; facultatem ostendant, differãt tamè maximi minimiq; ratione, in promptu adesse illi cõuenit, q oia id genus ulcera cõstituerit curare. Cæte rû ubi nullus uitiosus succus ulceratas ptes infestat, tale requiritur pharmacum, quod influentem quidè humorem, repellat: infixum autem parti, discutiãt. Atq; hæc sanè uires contrariæ præstant. Siquidem influxû reprimunt astringentia: impacta digerunt, quæ trahendi potestate sunt prædita. Porro quæ astringunt, maiori ex parte exasperãt, atq; hac occasione molesta sunt. Trahentia uerò ac digerentia ex alto humores, non citra acrimoniam id faciunt. Ac acrimoniam dolor aliquis necessariò sequitur, mordens ulceratam particulam: unde influentes humores irritari contingit, ac p inde in ulcere phlegmonem excitari. Ex quibus liquet medicamenta dysepuloticis, malignisq; ulceribus cõ-

Dysepuloticorum differentia.

Vicrib tot dyderari pharmaca, quot ipsorû sunt differentia.

Viceratarum partium, quas non infestat uitiosus succus, curatio.

S cã iij

Dyspepilot/cis
congruētia me-
dicamenta, cur
sint difficillima
inuentu.

grua, esse q̄ difficillima inuentu. Inuenienda tamen ali-
qua eorum materia est, qua ulcus citra dolorem sicce-
scat: q̄d accuratē fieri nulla ratione licet, ignorante me-
dico, quem effectū admotū medicamen ostenderit.

Quippe ex erodente simul & astringente, ualidum
conficitur pharmacū. Cæterū sordes humorq; ulce-
ri incumbēs, pharmaci rosionem exoluunt. Itaq; per-
pendendum est, quantum primus usus humiditatis ac
sordium in ulcere deficcauerit: atq; ita secundum, ter-
tiumq; uti illo debemus, donec siccum & purum ulcus
ipsum appareat. Vbi uerò id tale conspexeris, ad aliud
medicamentum te conferes, eiusdem quidem speciei,
sed priore imbecillius. Scire autem oportet, medicamē-
ta ipsa non alia ratione mederi ulceribus, q̄ q̄ in exul-
cerata particula eam siccitatem inducant, quam for-
tiebatur, quum se haberet secundum naturam: id quod
factum itelligimus, ubi neq; tenuis amplius sanies in-
fluit, nec pus producitur. Reuocanda igitur ad memo-
riam sunt ea que citra morsum exiccant: cuiusmodi cō-
plura metallica existunt. Meminisse etiam oportet, cō-
busta, & lota, acrimoniam, quam prius habebāt, amit-
tere: ac proinde ipsis utendum esse, in ijs qui molli car-
ne sunt præditi, admodumq; ad sentiendum prompti,
necnon caco-chymi. Nam in alijs corporibus illita etiā
usurpare licebit. Siccant igitur modicē, Lemnia sphra-
gis, cadmiaq; præsertim que spōte nascitur: quam sub
gestiuo sole pluribus diebus ex aceto, aut uino giluo pel-
lucidoq; interens, exiccātiorem reddo. Chalcitis com-
busta, q̄ cadmia, ualentius siccant. Per se autem nec cō-
busta, si administret, crustas excitat. Lotam igitur ip-
sam, deinde ficcatum habere est satius. Minus, enim lo-
ta q̄ combusta deficcatur, tum longē mitior est, minusq;
mordax. Per simile huic medicamentum est etiam gru-
go combusta. Nam quæ ignem non est experta, fortis-
simum medicamentum est, sicut chalcitis. Verū hęc

Ulcēribus qua
rōne medica-
mēta medeant

Vita & lota,
medicamenta,
acrimoniā, quā
prius habebāt
amittere, ob id
q̄ ipsis vtrū
esse in molli-
oribus & caco-
chymis corpo-
ribus.

Chalcitis cru-
stas excitat.

nonnihil etiam astringit, et ea multo magis chalcathū, quod inter metallica maximè siccatur. Misy autē & fori, chalcitidi sunt cognata: tenuius tamē misy apparet, minusq; mordax & urens: crassius fori: & utrisq; siccatur imbecillius: quemadmodum & stimmi maiore astringendi, siccandiq; uim, ac fori, possidet. Porro diphryges ulceribus ægrè humoris uitio ad cicatricem uenientibus, aptissimum medicamē existit: ualidè nāq; siccatur, & si sit mordax modicè. Ad hæc præter acritum qualitatem, tum potētiā, uim astringentiam possidet. Iam omnes differentiæ aluminis, ulcera satis exsiccant, generosè astringentes: quare nemo solis istis ad ulcera utatur. Igitur quæ plethora, uitiosoq; succo laborant corpora, quæq; tenera carne prædita, & ad sentiendum maximè prompta sunt, faciliè ex morfu, rosioneq; phlegmonē contrahunt: quare mitiora medicamenta desiderant. Cuiusmodi sunt sarcocolla, ichthyocolla, chrysocolla, plumbum ustum, fori, stimmiq; similiter etiam cōbusta. Insuper plūbi scoria, probè siccatur: quemadmodū ferri squama: quæ etiam abstergit, purgatq; unde pura ulcera reddit: quod reliquæ squamæ nō possunt. Quare si hæc omnia medicamēta arida ulceribus malignis, contumacibusq; insperferis, mirificè uidebis citra rosionem ea desiccari: sicuti ubi buccinorum testas concrematas, purpurarum, ostreorū, aliorumq; id genus similiter adhibueris. Lapis etiam diaphanes, siue specularius dictus, leniter ac sine morfu exsiccat. Eiusdem facultatis est uitrum ustum. Quinetiam Ægyptiæ spinæ fructus, galla immatura, rhœon, malicorium, siccādi & astringendi facultatem sortiuntur. Aristolochia etiam, iris, acorum, artemisia, panacis radix, argemone, chamæleontis nigri radix, cyperus, dracunculus, & gladiolus, affatim siccant. His euidentius adhuc centaureum & polium: quibus paulo imbecillior est terra cretrias dicta: uti ualētiore, uocata ampelitis. Porro gru-

Chalcathū

Diphryges

Alumine sola
cur non sit ad
ulcera utendū.

Siccantia citra
rosionem quæ
sint.

Siccantia simul
& astringentia.

SSA iij

Viceribus con-
tumacibus ad-
uersari tū oleo-
sa, tum acria.

Vicera quomō
sint tractanda.

Deligatura vi-
ceribus qualis
sit adhibenda,
& quando sol-
uenda.

Repellentia eē
applicanda re-
gioni suprapo-
sitæ viceri.
Varices quan-
do excidendæ
sint.

go ignē non experta, calx uiua & illota, & molle aphro-
nitrum (quod reuera aphronitrum est) sola per se non
admovent ulceribus. Nihil autem nobis in prædictis
ulceribus tam euitandum est, q̄ tum oleosa & mollia
medicamenta, cuiusmodi sunt omnes adipēs, & quæ
scirrhos emolliunt: tum acria, ut piper, zingiber, sina-
pi, & alia id genus.

Medicamentis prædictis quomodo sit utendum.

Vbi igitur ficcum aliquod pharmacū ulceri impo-
nere est animus, sordes prius sunt exprimendæ, molli,
puro, atq; sicco linteolo. Medicamento iam indito, pla-
tysma ex emplastro labris attenuādis cōmodo, extrin-
secus superdandum est. Huic rursus linamentum un-
diq; æquale foris iniiciendum: cui spongiā ex aqua aut
uino tinctā applicabimus: quæ ut frigida maneat per-
petuū, per assiduum frigidæ fotum curabimus. Porro
deligatura ipsa in ulcere inchoanda est, atq; illinc du-
cenda uersus partes supernas: quam tertio quoq; die,
non singulis, soluere expedit. Tunc autem si ambiētes
uulcus partes aliquid phlegmones referāt, meo Phœ-
nicino emplastro liquato ex oleo, cui plurimum uini
astringētis permistum sit, externas platysmatis partes
q̄ latè imbuere expedit. * Verū non ex obuiō quouis
oleo phœnicinum liquare oportet. Sed si rubor quidē,
atq; omnino caliditas dominetur in adiacentibus ul-
ceri partibus, ex aliquo astringentium atq; refrigeran-
tium id solues: cuiusmodi sunt myrteum, melinum, &
omphacinum. Sin durities aliqua conspiciatur, oleo ue-
teri, uel ricinino liquandū est, Tutius autem fuerit, uel
si nihil in ambiente uulcus loco uitiosi appareat, super-
positæ regioni ipsum medicamē apponere, ut repellat
si quid prius uel prauū, uel plus q̄ par est, influat: ma-
ximè quum in crure uulcus obortum, superpositam ha-
bet uaricem. Quæ dum sanguine melācholico turgēt,
excidenda uenit: quāuis iuxta excisionem ipsius, uulcus

malignum & contumax interdum oriri solet. Igitur in id genus uitijis præstat, uiribus egri consultis, à sectione uenæ auspicari: dein pharmaco purgare melancholicum succum, simulq; etiam pituitosum uacuare: quoniam is quoq; interdū unā cum melancholico influit, dum uarices gignuntur. Postea uenam ulceri suprapositam in longum scarificare cōmodum est. Vbi abunde uacuaris, ei ipsi uenæ sectæ, prius medendū. Postq; exactè iam cicatricem uidetur recipere, tunc aggredere maligni ulceris curationem. Iam uerò lien nonnūq; malè affectus, uitiosi talis humoris est author: sicuti & iecur: quibus ubi in primis consultum fuerit, sic tandē accedere ad curandū ulcus, oportet. Pari modo si uersum corpus plethoricum, cacochymum ue existat, id prius uacuare, expurgareq; expedit, q̃ ulceri medicamentum admoueat. Cui quidem dum mederis, à ualētioribus absterforijs pharmacis ad mitiora, lenioraq; digredere, si ulcus adamussim esse purū uideatur: quē admodum in sordidis ad magis abstergentia transire conuenit, nisi ex rosione medicamenti sint facta sordida. Sæpe siquidem ab acri medicamēto colliquata & soluta caro, in uitiosam saniem degenerat. Cæterū cautitas ulceris maior, oraq; rubentiores, & calidiores effectæ cernuntur, quum ob medicamenti acrimoniā ipsæ sordes acrescunt.

Compositio emplastrorum.

Quandoquidem malignorum & difficulter admittentium curationem, ulcerum, summus scopus est, ut medicamentum citra morsum exiccet, aqua uerò & oleum maximè omnium humectant, ab eis abstinere oportet. At cera deligenda est recens & pinguis: qua in sole emollita, aut apud ignem subacta, et in calidam aquam immersa, arida medicamenta prædicta excipimus. Mediocre autem medicamentum fiet, si quarta pars metallicorum ipsi ceræ adijciatur: ualētius autem

Vlceris cui uarix incumbit, curatio.

Sordes ab acro medicamento excitatæ, quomodo discernendæ ab iis quas ulcus, propria ratione, produxit. Vlceribus contumacibus, cur oleum & aqua aduersentur.

Viceribus con-
tumacib⁹ phar-
macum tempe-
ratū describit.

si tertia. Etenim quum haud exiguo discrimine inuicē corpora differat, unum omnibus medicamentum rectē præparari non potest. Erit ergo temperati phar-
maci compositio huiusmodi. Vtriusq; æruginis, æris
p^obusti, sing. drach. j. aluminis scissi, drach. S. cere, dra-
ch. x. conficito. Minus autem mordebit si loco alumi-
nis, integrā diphrygis drachmā adijcias. Quod si expur-
gare sordes consilium sit, sic conficiemus. Aeris, æru-
ginis ustæ, diphrygis, sing. drach. j. æris squamæ, dra-
ch. S. ceræ pinguis, drach. x. misceto. Cæterum si cera
ipsa sit siccior, emollienda est aliquo astringente oleo,
uel larice, uel terebinthina.

Ad chironia & difficilia ulcera medicamen-
ab Asclepiade proditum.

Viceribus dif-
ficilibus, phar-
macum Ascle-
piadis.

Æris squamæ, vnc. j. æruginis rasæ tantūdem. ce-
ræ selibræ. resinæ laricis, vnc. S. Quæ liquari possunt,
aridis affunduntur: quibus exceptis, ac curiosè emolli-
tis utitor. Cæterum platysma exiguum soli affectū par-
ti, ut ulcus tantū comprehendat, imposito. Ambien-
tes autem particulas pharmaco quod phlegmonem as-
ceat, circundare oportet. Inter curandum tertio quoq;
die soluere: dein fomētis mitigare: ipsumq; emplastrū
quod platysma uocatur à latitudine, abluendo emol-
lire, ac rursus imponere, donec cicatricē inducere inci-
piat. Ego certè Attico nonnunq; œsypo ceram tempe-
raui. Meminisse autem oportet, qualitates omnium ui-
cinorum corporum, mutuo in se agere: etiam si alterū
ipsorum multo ualidius sit. Vnde processu temporis
quodammodo euadunt similes. At ubi qualitas medica-
menti curando corpori specie similis fuerit, maior uti-
litas sequitur. Porro diphryges, si uel solum insperga-
tur ulceribus quæ difficulter cicatricem admittunt, p-
bè illis medetur: item & æs combustum. Aerugo autē
exedit atq; mordet insigniter. Indem calx ignem non
experta, quū insigniter mordicet, exigua portione alijs

Vicinerū cor-
porum qualita-
tes in se agere
mutuo.

Æruginis fa-
cultas.
Calcis vires.

MED. SEC. GEN. LIB. IIII. 283

medicamentis à nonnullis miscetur. Extincta medio-
cre est pharmacum. Elota prorsus lene & mordacita-
tis expers.

Pharmacum ad mītiōra ulcera cicatrīce inducēda,
ab Andromacho scriptum. Cadmīe tostæ, lib. j. chal-
citidis ustæ, tātūdem. ceræ lib. iij. resinæ aridæ, lib. iij.
myrtei, lib. iij. Vinum miscetur aridis. Quum autem
ad maligniora ulcera ualentioribus utēdum remedijs
sit, ut imbecillioribus ad mediocria: aliud medicamē-
tum subdā, quo utor ad dysepulotica. Aeruginis, &
squamæ, sing. vnc. j. ceræ vnc. viij. misceantur. Si igit̃
cauum sit ulcus, indito medicamento repleatur. Post
hoc rursus aliud platisma super accōmodabitur, quod
& labra comprehendat. Huic deinde linteus frigida
madens tātus undiq; obijcitur, ut medicamentum oc-
cultet. Postremo spongia mollis, fascia ex linteo exce-
pta, uel semel, uel bis, affectā partem orbiculatim am-
biente, tantæ magnitudinis, quo totum ulcus cum la-
bris, ac superpositorum ipsis aliquid, subiectorumq;
complectatur. Deligatio autem ipsa à duobus initijs
fiat. Vocāt sic quoties tota pars media uinculi affecto
loco incumbit: utrūq; autem crus in oppositam regio-
nem deducitur. Vbi hæc primo die peregeris, altero
aquam frigidam per spongiā irrigato. Si ambiens aer
calidus & siccus fuerit, his hoc ter'ue in dies singulos
est faciendum, ac deligatura tertio quoq; die soluen-
da: per hyemem, quarto. Affectus autem ipse indica-
bit, num fortius, uel mollius, uel simile sit imponendū
pharmacum. Emollies ipsum paululo myrtini, aut ro-
facei, aut melini, aut lētiscini, aut mastichini, aut cyprī-
ni instillato: Validius reddes, aliquid squamæ, aut eru-
ginis addens. Aliud ad obducenda dysepulo-
tica aptissimum. Chrysocollæ, squamæ, sing. drach.
ij. ceræ drach. vj. diphrygis, drach. ij. lithargyri, drac-
viij. Confundito. Aduertendum autē est, mitia phar-

Vlcera mali-
gniora, valen-
tioribus egent
remedijs, imbe-
cillioribus au-
tem, mitiora.

Deligatio ex-
ulceratis partē
culis q̃lis mo-
lienda sit.

Mitissima medica-
menta quae sint.

maca mihi dici sarcocollam, chalcitide uisam, aes, gruginemque; combustam, atque chalcanthon: quae ignem non experta, acris omnia sunt: combusta, moderata: lota post combustionem, lenia, rosionisque experta.

Aliud mitissimum. Eloti plumbi, drach. ii. spodi, cadmia, diphrygis, sing. drach. iiii. terebinthina, quae excipiuntur, drach. vj. Zeno addit chalbani drach. S. Etenim satius est modica portione misceri pharmaca id genus, quum nimirum confestim sibi saxeam duriciem contrahant. Porro in hisce omnibus, illa quae liquari possunt, liquefacta et refrigerata, ab rasaque, siccis diligenter reductis in pollinem, admisceto. Nam si liquida ipsis affundas, in grumos concrebescunt: maxime ubi inualuerit frigus. In sole autem feruenti si mistura fiat, licet ea superfundere, mouendo rudicula primum: dein, cochleario: praestat tamen ad omnia haec, ramusculus palmae.

Aliud ad desperata ulcera, ex collectaneis Primionis. Soreos drach. xxiiij. aluminis (cissilis, malicorii, calcis uiuae, sing. drach. xvj. thuris, drach. xxxij. gallae omphacitidis, tantundem. cerae, drach. cxx. seui uitulini (aut eius loco, adipis porcini & uetusti) drach. lx. olei ueteris heminam. Conficito. Porro sori, alumen, malicorium, galla, non digerendi facultate, sed astringendi eximia, sunt perditae. Etenim subastringentium genere continetur austera & acerba: sed illa quidem astringunt mediocriter: haec autem, hoc est acerba, uehementer. Omnia igitur astringentia contrahunt, ac densant meatus, uinciuntque & continent partium sibi coherentium substantiam: quo fit ut altius ipsorum uirtus penetrare non possit, nisi ab alijs acris, atque subtilium partium ducantur: id quod ipsis calx in praescripto medicamento praestat. At uero induratis ulcerum labris multo utilius medulla ceruina adhibetur: quae si non adsit, uitulina. Porro inueteratum oleum ab adipe suo illo (quem oleo communi liquatum institores pro

Astringens esse
genus commune
austeri & acris.

Astringentium fa-
cultas.

oleo uendūt) ex odore & consistētia discernes. Vtrūq;
tamen inueteratum, rosionem quandam acquirit: quo
nomine ad ulcera præter modū maligna conueniunt.
Talia enim appello, in quibus aut pars affecta tam ui-
tioso habitu est prædita, ut uel optimum sanguinē, qui
nutritionis gratia confluit, corrumpat: aut id quod in-
fluit, adēd puersum existit, ut etiam si pars rectē se ha-
beat, ab ipso tamē solo erodatur. Igitur ut citra ratio-
nalem methodum medicamenta componere, ita uim
illorum certō & accuratē cognoscere sine experientia
nemo potest.

Vicera mali-
gnantis nature
quæ sint.

Epuloticum *ἑρπὶς καὶ ἀνίου* à Critone conscriptum:
quod prætumidis, durisq; & cauis ulceribus cōuenit.
Picis aridæ, drach. C. gruginis rasæ, drach. xxiiij. æris
combusti, drach. xv. squamæ rubræ, drach. xxiiij. lada-
ni, vnc. ix. argenti spumæ, lib. iij. olei sextarium. j. S.
Etenim arida pix euidenter siccet. Calfacit autem mo-
dicē: ob idq; pus mouentibus medicamentis miscet.
At quum aliquid calidum, frigidū, humidum, aut siccū
dicimus, cum optimo corporis temperamento id con-
ferimus. Igitur cauum & purum ulcus, à mediocriter
siccantibus medicamentis curatur: sordidum uerō &
malignum, & oris duris & prætumidis quidē, sed car-
ne iuxta cutem fluida, ualidisimē siccantia requirit.
Verūm quæ metallica, ut siccet sine ullo morfu, præ-
paras, coquere diutius oportet. Sic siquidē magis sic-
cant, ac minus erodunt. Porro ladanum ipsum solum
ex uino tritum, ulceribus ægrē ad cicatricem uenien-
tibus auxiliatur.

Epuloticum. 1
Critonis ex
Ladano de sa
Picis aridæ fa
culcates.

Vicus caui &
purū, a quibus
sanetur medi-
camentis.
Metallica diu-
tius cocta, ma-
gis siccant, &
minus rodunt.

Medicamen ex chamæleonte à Critone descriptū,
inducens cicatricē periculosis & callosis ulceribus.
Lithargyri drach. C. ceræ, drach. L. æruginis drach.
xxiiij. chamæleontis, drach. xij. olei minam. conficito.
Ego tamen huiuscemodi emplastris adijcere lentisci-
num consueui: quod emolliat nonnihil, digerat, &

Medicamē Cri-
tonis ex cha-
mæleonte.

Lentiscini olei
facultas.

astringat, quæ omnia, difficilia ulcera cum labris indu-
ratis, desyderant.

Aliud Heraclidis Tarētini aduersus ulcera uetera.
Squamæ drach. j. æruginis rasæ, drach. iij. excipiantur
drachmis octo myrtei cerati. Misce. Etenim metal-
licorum facultas à quouis cerato resoluitur.

Aliud. Squamæ tritæ acetū affundito, eamq; sub
caniculæ exortu, læuigato usq; ad crassitudinem mel-
lis: uel etiam incoquito. Postea, exiccata, redactæq; in
puluerē, cerati partes octo misceto. Valet aduersus
recētia uulnera, & ulcera inueterata. Licebit etiam ad
ignem exiccare ipsam squamam, si alio tempore medi-
camentum id conficiamus. Porro subtiliora fiunt quæ ex
aceto læuigantur: atq; ob id melius purgant, attenuant,
& siccant. Verum ad cicatricem inducendam sunt ex
uino trita meliora:

Aliud Andromachi cicatricem ducens.

Ossium ustorum, drach. ij. mannæ, drach. j. cadmiæ, o-
bolos. iij. tritis utitor.

Aliud eiusdem quo
malignis cicatrix inducitur. Piceæ corticis drach. vj.
cornu ceruini usti drach. iij. cadmiæ drach. xviij. man-
næ, drach. iij. æruginis rasæ drach. ij. siccis utitor.

Aliud ad excrecentia ulcera, cicatricem absq; mor-
su ducens. Sandarachæ, chrysocollæ, arsenici, singu-
lorū partibus æquis cōfusis, aridisq; utitor. Ad vlce-
ra quibus callus obduci non potest. Ex Archigene.

Archigenis ad
ulcera cōtuma-
cia, remedia.

Cōmuni quodam oleo expurgatis, uetustissimū cum
linamentis imponitur. Ærugo rasa cerato rosaceo, qd
paulū resine habeat, excepta, imponitur. Item squame
æris rubri q̄ plurimū cerato myrteo exceptum usur-
patur. Eiusdem ad putrida & nomas.

Sori crassiusculè tritum, inspersumq; cōducit. Vel
aristolochiam rotundam, & gallam, æquali pōdere ex
oleo inungito. Vel cucumeris agrestis radicē cum fo-
lijs illigatam calido cinere recondito: quum autē emol-

lierit, contritam imposito.

Eiusdem ad cancroſa.

Cācri fluuiatilis uſti, & cadmię, pares portiones tri-
tas inſpergito. Vel cinerem cancrorū cum cerato im-
ponito.

Eiusdem ad calloſa.

Nitrum torrefactum & calcem uiuā cum lotio pue-
ri impubis læuigata circūlinito. Conferunt etiam cau-
ſtica medicamenta

Andreę emplaſtrum ab Af-

clepiade ſcriptum, oēm excrescentiam reprimēs, atq;
arcens inflāmationem. Argenti ſpumę lib. iij. ſqua-
mę æris, chalcitidis, eruginis raſę, ſing. vnc. vj. acetū he-
minam: olei ueteris. lib. viij. miſce.

Aſteris medi-

camen ad idem. Lithargyri, lib. j. olei ueteris lib. ij. S.
æruginis, chalcitidis, ſquamę rubrę, ſing. vnc. j. acetū
heminam. Conſcito.

Iſis emplaſtrum ruſum.

ad fluida, diuturna, & maligna ulcera. Argenti ſpu-
mę drach. C. minię ſinopici drach. viij. diphrygis, ce-
rę, chalcitidis cōbuſtę, ſing. vnc. j. chalcitidos crudę,
drach. ij. olei heminas. ij. conſcito ut decet.

Aliud Scribonij Lari, ad eadem accommodatum.

Cerę drach. C. lithargyri drach. L. olei myrtei hemi-
nam. j. miſyos cōbuſti, chalcitidis uſtę, aluminis ſciſſi
uſti, ceruſſę, reſinę terebinthing, ſing. drach. xij. ꝑſcito.

Aliud ex chamæleonte, ab Aſclepiade ſcriptum ad flu-
entia & ægrē curabilia ulcera. Lithargyri lib. j. olei
ueteris lib. ij. chamæleontis radicis, trientem, ariſtolo-
chię tantundem. chalbani, vnc. ij. gallę vnc. ij. thuriſ
tantundem. Conſcito.

Aliud ab Aſclepiade

ſcriptum ad ulcera quę uix curationem recipiunt.

Squamę æris, æruginis raſę, ſing. vnc. j. cerę ſelibrā.
reſinę laricis vnc. S. conſcito.

Decleonus

cephalicon ab Aſclepiade ſcriptum, à quo educuntur
oſſa corrupta. Æris ſquamę, mannę, thuriſ, reſinę
ſicę, ſing. drach. C. acetū heminas. xij. Terito ſquamā
ex aceto, & quum læuis facta fuerit, thus in pollinem

Andreę empla-
ſtrum faciens
ad excrescentia
ulcera.

Aſteris medi-
camen.

Iſis emplaſtrū.

Cephalicū oſ-
ſa corrupta
educens.

reductū adijcito, resinamq; atq; pastillos fingito: quorum assiccatorum in umbra miscēs partem unā cum cerati ex rosaceo confecti pari portione, ipsa utitor.

Aliud Hygieni scriptum ab Hera, utile ulceribus ægrè ad cicatricem uenientibus, necnon paronychijs, Lithargyri Chrysitidis, ceræ, sing. minam. j. chamæleontis nigri radices, drach. xxxvj. eruginis rasæ, drach. xvij. chrysocolle, drach. xl. olei heminas. iij. conficito ut decet.

Aliud egregium. Ceræ, picis, bituminis, sing. lib. j. manne, eruginis, galle, spine Aegyptiæ, iridis Illyricæ, aristolochiæ rotundæ, chalcanthi, singulorum. vnc. iij. aristolochiæ lōgæ, æris combusti, utriusq; vnc. ij. cōficito. Aliud, Bituminis, aluminis liquidi, sin. lib. j. picis, resine pityinæ, ceræ, sin. lib. ij. mali terre rotūdi, gallæ, spine Aegyptiæ, sing. vnc. viij. malicorij, æris usti, mannæ, mali terre longi, sing. vnc. iij. olei ricinini, aut ueteris, lib. ij. cōficito pro dignitate.

Aliud quo utor in molli carne peditis. Ceræ lib. j. rosacei tantūdem. cerussæ vnc. viij. salis ammoniaci, vnc. iij. squamæ Cypriæ vnc. ij. thuris, calcis uiuæ, aluminis, eruginis, malicorij, sin. vnc. j. cōficito diligēter.

G A L E N I P E R G A M E N I D E C O M P O S I T I O N E M E D I C A M E N T O R U M S E C U N dum genera. Liber quintus.

Pharmaca ad
multos usus u-
tilia, ex contra-
rijs constare.



Qualitates pri-
mæ & secundæ
quæ dicantur.

POLYCHRESTA medicamēta, siue ad multos usus utilia (de quibus agere in presenti cōmentario est animus) ex cōtrarijs pharmacis constāt, etiam iuxta qualitates secundas: non tātū primas. Etenim primas appello, caliditatem, frigiditatem, humiditatem, & siccitatē: tum ex harum coniugatione compositas: secundas autem,

tem, quæ has ipsas primas sequuntur.

Ex ijs est emplastrum descriptum ab Hera, boni coloris, epuloticum, glutinans, implens, ualensq; ad chironia ulcera: cuius temperies est talis. Cere lib. ij. phryctæ, lib. ij. gruginis rasæ vnc. vj. mannæ, vnc. iij. olei heminas. v. aceti sextarium. conficito.

Panacia Herg.

Panacia Herg, ad omnem malignitatem ulcerum mirè cōducēs. Rumpit atq; dissoluit quicquid corruptū est: omnem sanguinis eruptionem supprimit: hæmorrhoidas ipsas consumit & tabefacit: omniq; ulceri imposita, quāuis agresti, mitius ipsum statim reddit. Chamæpityos, chamæleōtis, symphyti, marrubij, sing. drach. iij. polij. centaurij tenuis, sing. drach. vj. Helenij, aristolochiæ, sing. drach. iij. thuris, drach. xij. S. myrrhæ, drach. iij. aloes, drach. vj. chalbanij drach. vj. obolum unū. olei drach. clxxx. mellis drach. xxx. propolis drach. xij. S. aluminis scissi, terebinthinæ, chalcitidis sing. drach. vj. obo. S. bituminis, terræ ampelitidis, lithargyri, sing. drach. L. gallæ & pulueris iridis, sing. drach. iij.

Conficito diligenter. Porro marrubio uel solo uti etiā queas in ijs qui carnem abundè humidam & sordidā circa ulcus habent. Helenion uerò haud item conuenit solum inspersum: sicuti nec aliud quoduis acre.

Nosti siquidem acria irritare, mordere, calfacere, & fluorem concitare ad affectas particulas: amara uerò exiccare citra morsum atq; calorem: eoq; exulceratis conducere. Iam uerò thus concoquit & pus mouet in tēperatis naturis: nam in corporibus humidioribus, carnē producit. Nullum autē eorum quæ concoquūt, ac pus mouēt, ualēter digerēs est, sicuti neq; acre. Sigdē eiusmodi mediocriter excalfaciunt: emolliuntq; magis, q̄ exiccent. Oleū lenit, ac ualida pharmaca obrundit. Terra ampelitis tum siccatur, tum digerit. Chalbanum emollit, concoquit, lenit, atq; dolorem sedat: quas uires thus, licet imbecilliores, sortitur. Terebin-

Acriū facultas
Amara cur ex
ulceratis con-
ducant.
Thuris facul-
tas.

Pus mouentis
facultas.
Olei facultas.
Chalbanij vi-
res.
Terebinthina.

Bitumen.
Propolis.
 Mel non putre-
 scit, putrescenti-
 busq; maxime
 congruit.
 Putredini quæ
 sint aptissima.

Isis Epigoni,
 ad multa vtile
 medicamen.

Emplastrum ex
dictamno ad
multa vtile.

thina detergit, discutit, & quodammodo concoquit. Bitumen cum calore non admodum uehementi, etiã siccatur. Propolis attrahit. Mel siccatur, & digerit, putrescentibusq; est maximè congruens, ex ijs existens, quæ minimè computrescunt; quare composita huiusmodi à putredine seruat, præter q̃ extremè ad putrescendum prompta, quæ humida sunt & calida. Myrrha & aloë citra rossionem siccant. Cæterùm aloë astringit; myrrha tenuiorum est partium, magisq; siccatur.

Isis Epigoni ab Hera traditum. Valens cōtra omnia uulnera, puncturas neruorum, hominumq; atq; canū morsus. Venenū à bestiis illapsum extrahit; curat fracturas artuū cum uulnere, fistulasq; & omnes abscessus sanat; atq; omnem fluxionem sistit. Cera drach. C. terebinthinæ drach. cc. squamæ rubri gris, æruginis rase, aristolochiæ rotundæ, thuris, salis ammoniaci, gutta ammoniacæ, sing. drach. viij. aluminis usti, drach. vj. gris usti, drach. viij. myrrhe, drach. xij. chalbanī tantūdem. olei ueteris heminam, aceti acris heminas. ij. conficito. Etenim hoc medicamine Epigonus conclusus in carcere, curauit quendam ex ualde potentibus, unde cōfestim dimissus est. Ego uerò prædictis etiam radicem dracunculi adiicio: quæ uel per se, in orbiculos secta, assiccataq; & redacta in pollinē, si inspergatur, malignis ulceribus auxiliatur.

Emplastrum ex Dictamno ad eadē faciens. Olei ueteris heminas. ij. lithargyri drach. C. æruginis rase drach. viij. squamæ drach. vj. colophonix liquidæ drach. L. mānæ drach. xij. ammoniaci thymiamatis drach. xxvj. æris combusti drach. viij. diphrygis drach. vj. gentianæ tantūdem. aloes drach. viij. chalbanī drach. xij. propolis drach. viij. cera drach. xxv. aristolochiæ drach. x. dictamni Cretici tantūdem. Conficito accuratissimè.

Emplastrum ex utraq; aristolochia, cephalicū enæmum, callosis ulceribus congruēs, atq; articulos solu-

tos confirmans. Picis, cere, bituminis, terebinthinæ, sing. lib. j. mannae, æruginis rase, cerussæ, sing. selibrā. chalcāthi, aristolochiæ longæ, iridis Illyricæ, sing. vnc. iij. malicori, gallæ imaturæ, æris combusti, sing. vnc. ij. spinæ vnc. iij. aristolochiæ rot. drach. iij. aceti hemi nam. Ricinini, uel olei cōmunis tantundem. conficito.

Porro manna, exiguam alstringendi uim possidet. Vocant enim sic quod à thure excutitur, nonnihil etiam illius corticis obtinens.

Emplastrum Azanite, malignis ulceribus, necnon ambustis conueniens. Picis aride, vnciā: cere, adipis suilli, seui taurini, œsypi, sing. vnc. iij. resinæ piceæ, vnc. v. conficito.

Emplastrum Haliei ex sinopide nihil minus quàm priora utile. Cere, lithargyri, utriusque minam. mannae, terebinthinæ, chalbanī, sinopidis, sing. drach. viij. olei ueteris heminas duas. Conficito.

Emplastrum Machæronis à Critone descriptum, phlegmonem arcens, mireque conducens ulceribus. Aristolochiæ rot. chalbanī, opopanacis, æruginis, iridis Illiricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sing. vnc. j. terebinthinæ, vnc. viij. S. cere, vnc. lx. S. olei omphacini vnc. viij. S. conficito.

Emplastrum ex salicibus à Critone in multos usus descriptum. Misys, chalcitidos, æruginis, cerussæ, galleg, aluminis scissi, & rotundi, crete sutoriæ, sing. vnc. vj. cere, resinæ pitynæ, picis, bituminis, salicis foliorum, singu. vnc. ij. olei heminas. ij. vnc. iij. chalcāthi vnc. vj. malicori tantundem. aceti sextarios sex. conficito.

Emplastrum uenatorum, ad quadrupedum ictus, morsusque, & ad reliqua uenenata.

Argenti spumæ, minam. olei ueteris, squamæ æris rubre, cere, resinæ phrycæ, sing. lib. ammoniaci thymiamatis, trientem, chalbanī, mini sinopici, sing. vnc. ij. conficito.

Viride Alcimionis, conueniens fistulis, educens ossa, & strumas discutiens. Chalbanī drach. xvj. æris usti, drach. viij. squamæ, drach. xxij. cere

Māna quid sit

Emplastrum
Azanite.

Emplastrū Ma
chæronis.

Viride Alci
mionis.

Tttt ij

drach. L. seui caprilli, uel uitulini, drach. xxx. thuris, resinae siccae, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, nitri, aristolochiæ, sing. drach. xxv. bryonig, drach. xij. orcheos drach. xij. iridis aridæ, drach. iij. aloes Indicæ, drach. xij. scissilis, drach. viij. fellis taurini, tantūdem, aceti, olei, utriusq; heminam. conficito.

Viride ad herpetas, & ad chironia ulcera ab Andromacho scriptum. Hordei combusti drach. x. æruginis drach. xx. cere, drach. lxxx. cyprini heminam. Ceterū hoc medicamen eruginem multam continet. Porro combustum hordeum, uel si per se inspergatur, chironia ulcera iuuat

Pastilli Aristarchi.

Pastilli Aristarchi πολυχυστοι, hoc est ad multos usus. Nam præter alia, utiles sunt in principio phthificis, lienosis, coeliacis, & dysentericis, tribus obolis in potu datis. Myrrhæ, drach. vj. croci, crocomagmatis, sing. drach. iij. citinorum, chalcanti, aluminis scissilis, aloes, sing. drach. vj. excipiantur uino Falerno, singanturq; orbiculi, & assiccati in umbra feruentur.

Polyide Sphragis. Malicori, drach. vj. myrrhæ, drach. viij. aluminis scissilis drach. v. thuris, drach. iij. chalcanti, drach. iij. fellis taurini drach. vj. Vino dulci excipiuntur.

Pastillus Threpti ad aures pure fluentes, carnis excrescentias, & narium ulcera. Malicori, drach. x. galle omphacitidis drach. viij. aristolochiæ tantūdem, aloes drach. iij. myrrhæ, drach. viij. fissi drach. ij. thuris drach. iij. passo excipiuntur.

Pastillus diachylon.

Pastillus δια των χυλων ad nomas & scabiosos affectus. Licij indi, aloes Indicæ, myrrhæ, gris, aluminis scissi, citinorum, thuris, sing. drach. iij. succi myrti, hemine dimidium. conficito.

Pastillus niger: quo utor. Malicori, drach. x. aristolochie, galle, sing. drach. viij. aluminis fissi, aloes, sing. drach. iij. myrrhæ, chalcathi, sing. drach. ij. thuris drach. iij. Vino excipiuntur: & quum res exigit, uino dulci diluuntur.

Ad erysipelata. Acaciæ drach. viij. misyos drach. iij.

opij drach. ij. thuris drach. iij. cum aceto excipiuntur.
Faciunt etiam ad herpetas. Ad herpetas, Tiberij

Cæsaris. Diphrygis, meconij, aluminis fissi, acacie,
sing. vnc. iij. aceto uel aqua diluens, utitor.

Aridum putrefaciens absq; morfu, ex descriptione An
dromachi. Sandarachæ, arsenici, singu. drach. ij. calcis
uiuæ, drach. iij. tritis utitor. Pastillus sanguinem

Putrefaciens
absq; morfu.

comprimens. Chalcitidis, misyos, manne, sing. dra-
ch. iij. tritis utitor. Ad ani uitia, alumine liquido

nucis magnitudine cum mellis cyathis duobus cocto
utitor. Aridum cephalicum ab Asclepiade scri-

ptū, quod tollit squamas, ossa corrupta educit, & caua
implet. Iridis Illyricæ, panacis, sing. drach. iij. aristo-
lochis, drach. ij. manne tantūdem. contusis cribratisq;
utitor. Aridum Asclepiadis, cicatricem indu-

cens. Calcis uiug, drach. vj. mannæ, thuris, squamæ,
sing. drach. iij. redactis in pollinem utitor.

Crustas inducens. Asclepiadis. Chalcitidis crudæ,
cadmig, sing. drach. iij. ieiunus ex saliuā excipito.

Medicamen Dia tessaron. Chalcitidis toste, misyos
tosti, diphrygis, chalcāthi, sing. drach. iij. Ad nomas

Medicamē dia
tessaron.

Asclepiadis pharmacum. Sulfuris uiui, auripigmenti,
squame, sing. drach. j. æris cōbusti, quātū color exigit.

Arido et ex melle utitor. Etenim putrida ulcera, quum
ambientes partes depascunt, nomas propriè appellāt.

Nomæ qualia
vlcera sint, &
qualia medica-
mēta postulat.

Qui affectus uehementissimis medicamētis indigent:
ut sæpe in eis etiam cauterijs utamur.

Apellis medicamentum διαχρηστικόν, quod nomas non
solum sistit, sed incipientes prohibet. Chartæ combu-
ste, plumbi usti, æris usti & loti, arsenici, squamæ sto-
momatis, singulorum equas portiones. sulfuris uiui, di-
midium: tritis utitor, uel cum melle, uel ex rhodino.

Medicamē ex
charta combu-
sta, nomas cō-
pescens.

Ad carbunculos. Nitri rubei, arsenici, sandarachæ,
chalcitidis, atramenti sutori, diphrygis, singulorū pa-
rem mensuram aceto læuigans, exiccansq;, postea eis

Tttt iij

Carbunculus
quid, & quali-
bus egeat me-
dicamentis.

tritis utitor. Etenim carbunculus ulcus est crustam ci-
to cum ualida phlegmone circumstantium particularū
excitans: adeo ut febres uehementes, & extrema peri-
cula inferat. Quare ipsi crustę ualidum medicamentū
imponere expedit, & ex ijs quę ad nomas conducunt

G A L E N I P E R G A
M E N I D E C O M P O S I T I O N E
M E D I C A M E N T O R U M S E C U N

dum genera, Liber Sextus.



N PRAESENTI cōmentario
ad ea πολύχρηστα, hoc est multi usus
medicamenta me conuertere est ani-
mus, quæ tum ad alia multa singula-
tim faciunt, tum ad putrescentes par-
ticulas, aliter quidem affectas q̃ illa ul-

cera, quę difficulter curabilia appellantur. In putresce-
tibus siquidem, ipsa putredo uagat̃: ob idq; tales dis-
positiones cōplures Medicorum νομάς, hoc est, depa-
stiones appellant. In illis autē, affectus secundum unū
locū est circumscriptus: absq; ulla putredine: ita ut pha-
gedenę uocatę, exedant quidem partes uicinas, non ta-
men putrefaciant ipsas, nec febres inferant, quę conse-
qui ad depascentes affectus cum putrilagine, cōsueue-
runt. Hęc igitur quę nunc scribentur omnia, mordacia
sunt, si quis ipsis solis nō cerato temperatis utatur. At
quæ cerato miscentur, purgare quidem ulcus sordidū,
& carne replere possunt, atq; etiam duritiem quādam
& tensionē discutere: non tamē difficilia curare. Quo-
circa tum plurimū cerati miscemus medicamētis acri-
bus, quum ulcus purum & siccum est: corpus autem
curandum, & molle, & ad sentiēdum promptum: pau-
cissimum uerò, si ulcus quidem ipsum sordibus, humi-
ditateq; redundet plurima: egri autem corpus sit durū,

Nomx.

Phagedenę.

Cerati plurimū
quādo acribus
medicamentis
misceat̃, & quā-
do contra, pau-
cissimum.

& parum sensile.

Anicetos Critonis, quasi di-

Anicetos Cri-
tonis.

cas insuperabile pharmacū. Extrahit, rumpit, purgat,
glutinat, pus educit, duritias discutit, lassitudines lenit,
fracturis cum uulneribus auxiliatur, curat hominum
atq; ferarum morsus, ad innumeraq; alia conducit.

Squame æris drach. lviij. pyrethri, staphisagrie, cocci
cnida, sinapi seminis, cachryos, columbini stercoris,
aristolochiæ tenuis, eruginis, cyperi, eruce seminis, cu-
mini, singulorū drach. xvj. nitri, salis ammoniaci, sing.
drach. xxxij. baccarū lauri, mannæ, iridis, sing. drach.
cxxx. aceti acris sextarios sedecim. decocti caricarum
cyathos. iij. & S. Tusa cribrataq; omnia simul cum
aceto sub æstu caniculæ laeuigantur. Vbi siccum & uiride
euaserit, ficuum decoctio adiicitur, & simul emol-
lita tolluntur, & in olla æris rubri asservantur. Vteris
autem una ipsius medicamenti parte aceto diluta, usq;
ad consistentiam sordium, permista sex resine portio-
nibus, cui nonnihil cere sit temperatum. Scribitur etiā
impetigini agresti congruere. Sic enim uocant, quæ à
medicamentis imbecilliter siccantibus nihil iuuatur:
irritatur autem à ualidis. Porro caricarum decoctum
lenissimum est, & maximè concoquit, simulq; digerit.
Acetum uerò, efficaciam aliorū medicaminum iuuat.
In quo quidem quæ macerantur sub sole estiuo, tenuē
substantiam acquirunt, eoq; altius uirtus ipsorum pe-
netrat.

Impetigo agre-
stis.

Caricarum de-
coctum.

Aceti facultas

Emplastrum Serapionis, contra omnia
uulnera, punctus, et parotidas maximè ualens. Educit
etiam pus, glutinat, seniliaq; & chironia persanat.

Serapionis em-
plastrum.

Olei ueteris heminas. iij. argenti spume drach. cc. am-
moniaci thymiamatis, drach. clxviij. resinæ, colopho-
niæ, pityinæ, singu. drach. lxxviij. ceræ drach. clxviij.
chalbani drach. xx. eruginis tantūdem. myrrhæ drach.
viij. Conficito.

Humidum Andromachi ad
nomas. Cere, resinæ, terebinthing, utriusq; drach. viij.
adipis taurini curati, drach. iij. chalcitidis, drach. ij.

Humidum me-
dicamen And-
romachi,

T t t t iij

Artium opera
frequenti exer-
cizio absoluūt.

Aegyptia An-
dromachi.

Ammoniacū
inter emollien-
tia principatū
obtinet.

squamæ æris, drach. iij. mannæ thuris, drach. ij. gallæ
immaturæ, drach. iij. olei myrtei, hem nas. v. Arida
aceto & melle excipiuntur; dein liquida superfundun-
tur. Porro q̄ auxiliiorum quædam à ratione sola inue-
niantur: quædam ab experientia, * quæ ad id ratione
non indiget: nonnulla utriusq; opem desyderēt: per se
pe iam uobis est demonstratum: sicuti & q̄ ratione &
experientia comperta, coniecturali uia ad eorum quæ
inquiruntur inuentionem perueniunt: quæ uerò per ra-
tionem sperata sunt, confirmantur experientia. Quum
igitur omnia artium opera frequenti exercitio absoluā-
tur, non satis profectò est, generalia duntaxat ipsorum
addiscere, sed etiam in particularibus subinde exerce-
ri oportet. Nam actionum usus, exercitatioq; ad perfe-
ctorum possessionem est uia. Aegyptia Andro-
machi. Argēti spumæ, drach. xliij. ricini heminas. vj.
ceræ, drach. cxliij. ammoniaci thymiamatis, drach.
lxxij. terebinthinæ drach. xxxvj. languste, drach. xvij.
squamæ stomomatis, squamæ æris, aristolochig, thuris
sing. drach. viij. myrrhæ drach. iij. opopanax drac. ij.
marinæ aquæ, ad conspergendam ceram, drach. L.
Conficito. Etenim argenti spuma, quum mediū tem-
peramenti sit, quod pertinet ad calorem & frigus: pau-
lulum ad siccitatem inclinat. At cera, materiæ locū ob-
tinet, non uirtutis efficaciam adiuuat: tametsi uis quæ-
dam ei perexigua emolliēdi insit. Iam terebinthina, q̄
cera, magis mollit, calfacit, & digerit. Porro ammonia-
cum inter emollientia principatum obtinet: in digerē-
tibus medium est. Quare compositum ex oleo ricini-
no & gutta ammoniaca medicamentū, abunde potest
digerere, emollire, & nimirum etiam siccare. Iam lana
combusta, aristolochiaq; plurimū digerunt, exiccātq;
thus autem digerit concoquitq;. Myrrha etiā non igna-
uiter calfacit, & exiccat: sed utrunq; opopanax præstat
multo absolutius. Cæterum squama æris, stomoma-

tisq; præter q̄ q̄ ualide siccant, uim etiam astringen-
di sortiuntur. Consentaneum autem est, Andromachū
pro hemina uncias nouem mensurales accipere: ita ut
sex heminae uncias quinquaginta quatuor mensurales
absoluāt: quod idem est, ac si dicas mensuræ Romanæ
libras, iij. S. Ego uerò olei Romanam libram, quam
per dissecta cornua metiuntur, ponderaui quandoq;
discere cupiens quantum grauitatis pondus cōtineret,
inueni q; duodecim mensurales, decem vncijs ponde-
ris æquales existere. Præscriptum igitur medicamen-
tū cruentis uulneribus, ulceribusq; alijs non paucis bonū
medicamentum redditur: sicuti & ad abscessus, & om-
nia quæ discuti postulant. Nec ignoratis medicamen-
ta quæ simul cum digerentibus etiam astringentia re-
cipiunt, longè tutiora esse: quæ uerò absq; abstrin-
gentibus digerunt, efficaciora quidem, non tamen perinde
tuta. Sæpe siquidem fluxiones attrahunt, dum corpus
quod curatur, plethoricum est, aut prauis succis redun-
dat. Adeo itaq; digerit generose prædictum pharma-
cum, ut etiam pus, si non admodum copiosum sit col-
lectum, discutiatur, absq; incisione cutis: emollireq; cal-
losa, & quomodocūq; indurata possit. Congruit etiam
nudatis neruis, & si in parte quapiam absecti fuerint.
Etenim præcisi nerui, tametsi periculo quod consortij
lege oboriri solet, careant, tamen eas partes, in quas in-
ferunt, sensu destituunt: taleq; medicamen desyderant:
nam quæ humectant, facile eos putrefaciunt.
Medicamen fuscum Andromachi, Athene dictum, ad
difficilia ulcera congruens. Argenti spumæ, drach. C.
terebinthinae drach. xxxvj. ceræ, drach. xxv. minij sino-
pici drach. xxiiij. ammoniaci thymiamatis drach. xxxvj.
chalbani, drach. xij. aloes, drach. viij. diphrygis tantū-
dem. æris combusti, mastiches, sing. drach. vj. aristolo-
chia drach. v. propolis tantundem. mannæ drach. vj.
squamæ gris tantūde. Lapidis asij, drach. iij. trifolij se-

Hemina.

Libram mēsu-
ralem olei, con-
tinere vnc. x.
pōderales, Ga.
expertus est.

Digerentia q̄
bus abstrin-
gentia sunt mis-
ta, esse lōge tutio-
ra, sed min⁹ ef-
ficacia illis q̄
tantū digerūt.

Humectantia, s̄
cisos neruos fa-
cile putrefaci-
unt.

Athene Andro-
machi.

Hellepontia
Andromachi.

minis, drach. ij. symphyti radicis drac. j. & obolos. iij. olei heminas. iij. Conficito: Hellepontia Andromachi, propulsans phlegmonē: strumas, panos, & parotidas curans: nec non pus maturans, abscessusq; rūpens, & glutinans. Argenti spumę drach. C. picis drach. L. ladani drach. xxv. æruginis rasę drach. viij. aris combusti, tantūdem. squamę drach. ij. olei ueteris, drach. cc. Conficito.

Tyria Damocratis.

Tyria Damocratis, ulceribus, ac moribus quadrupedum congruēs. Lithargyri lib. v. cerę lib. ij. Pityinę pinguis, lib. iij. æruginis, chalbanı, aris combusti, squamę, singu. vnc. iij. Pinguis olei, lib. xvj. curiose. conficito.

Attrahentium,
digerentiumq;
discrimen.

De emplastris digerentibus, & attrahentibus. Attrahentia medicamenta, non nihil etiam discutiunt: & quę discutiunt, pariter etiam attrahunt. Verū in digerentibus medicamentis, discussoria uirtus: in trahentibus, attractrix præpollet.

Salsum Andromachi.

Salsum Andromachi, digerens, extrahēs, ad multaq; utile. Salis communis, lib. iij. squamę vnc. iij. Magmatis, lib. s. mannę lib. j. cerę, lib. xiiij. olei cyprini, lib. xvj. quibus acetū affundit.

Medicamē ex
baccis lauri.

Aliud Ctesiphontis, partim discutiens, partim euocans, atq; detergens. Aphonitri, libram, mannę thuris, tantūdem. lixinę stactę, libram. Sunt qui addant etiam libram acetı. Aliud ex Baccis lauri. Resinę, nitri ruffi, cerę recentis, baccarum lauri, colophonię, seui uitulini, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. lxx. cyprı decimā sextam heminę partem. conficito.

Digerens Alexandri.

Aliud attrahens & digerens, ad multa utile. Argenti spumę, cerussę, chalbanı, singulorum libram. salis fossilis, æruginis rasę, singu. s. libram. olei sextarios tres. atramenti sutoriı, vnc. ij. conficito.

Aliud digerens meliceridas, Alexandri. Salis Hispani, argenti spumę, cerussę, sing. libram. Cere, terebinthi, utriusq; vnc. j. chalbanı, uel opopanacis, vnc. ij. sinapeos, vnc. vj. olei ueteris, libras tres. acetı sextariū.

confundito. Aliud Epispasticum, discutiens stru-
mas, parotidas, atq; omneis abscessus: conferensq; ad
articulorum uitia. Salis fossilis libram: strigmenti pu-
ris simi, lib. iiii. Chalbani drach. L. conficito.

Aliud quo usus est ad eadē Andromachus. Cerussæ,
salis fossilis sing. drach. lxxx. chalcanti drach. xij. olei
ueteris heminas. iij. aceti heminas. iiii. Aliud Ascle-
piadis ad eadem. Quod ualenter etiam mammarum
abscessus digerit. Cera, terebinthina, nitri, olei uete-
ris, sing. libram. aquæ heminam. Nitrum in aqua solu-
tum igni admoueto, uaseq; cooperto, coquito, mo-
uens ex interuallis. Quum autem strepere adeo de-
suerit, liquida infundito, mouēs assidue, donec non co-
inquent. Postea in mortarium transfusa, rursus tun-
dito: inde excipiens, utitor.

Digerens Ab-
lepiadis.


Aliud ad eadem.
Cera, terebinthina, sing. drach. C. nitri spumæ, olei ue-
teris, mannæ, thuris, sing. libram. lapidis asij, floris, seli
bræ. chalbani, ppolis, ammoniaci thymiamatis, sing.
drach. xij. aquæ lixiæ quod sit satis, conficito.

G A L E N I P E R G A

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum genera. Liber Septimus.



ALAGMATA siue emollien-
tia uocant Medici, quæ partes præ-
ter naturam induratas emolliunt, cali-
do omnia tēperamento prædita: non
tamen exiccantia, quemadmodū nec
manifesto humectantia. Nam quum

Malagmata q
dicantur.

exacte emollientia medium quendam ordinem inter
humectantia siccantiaq; sortiatur, indurescentiū sub-
stantiæ, ueluti fusionem quandam moliuntur. Vbi uē-
ro fusa durities fuerit, digredientium medicamentorum

Digerentibus
quādo utendū.

Adipis differē
tiæ.

usus succedit. Porro leoninus adeps ualentissimè tum
calfacit, tum digerit. Proximū locū habet pardī adeps,
ut qui modicè emolliat. Vim minorem in calfaciēdo
ac digerendo habet anserinus; habet tamē aliquatenus
maiores in molliendo: pari spatio ab hoc recedit gal-
linaceus. Suillus adeps, mollissimus, humidissimus,
atq; aliorum imbecillissimus est: quare teneris corpori-
bus conuenit. Caprarum & boum adeps, quanto suil-
lo est ualidior, tātō magis corporibus & natura durio-
ribus, & inter duriora scirrhorioribus congruit. Tau-
rinus hircinusq; adeps ualidioribus tum corporibus,
tum affectibus auxiliatur. Est autem cōmune tū phleg-
mone, tum scirrho particulis laborantibus, reniti pre-
mentibus digitis: distinguuntur tamen affectus ij sensu
doloris & indolentia. Igitur magna phlegmone cata-
plasmatis & humidis quibusdam medicamentis sana-
tur: parua, cui scirrhusa durities permista fuerit, tum ca-
taplasmatis, tum medicamentis cerati modo cōfectis:
liquidisq; emplastris atq; emollientibus.

Phlegmone q̄
bus medicamē
tis indigeat.

Parygrō Herē

Medicamen Parygron Herē. Quod medet̄ particulis
exigua phlegmone afflictis, non multo post confectio-
nem tempore. Si uerò duritiem absq; dolore pars affe-
cta contraxerit, aut si phlegmonode affectu sit libera,
paulo etiam recentī uetustius utile fuerit. Eius itaq; cō-
positio est talis. Adipis suilli recētis, curati, vnc. xliiij.
ceræ vnc. xxiij. cerussę vnc. vj. argenti spumæ tantū-
dem. conficito. Atq; duritiem in scirrhum abeuntem,
ualentiora præsidia p̄sanant: cuiusmodi sunt, tum me-
dullarum genus, tum bdellium utrūq; Arabicum nē-
pe, & Scythicum: necnon styraces: ex quibus eligēdus
est pallidus. Nam niger deterior est. Iam ammoniacū
thymiana, inter ea quæ emolliunt durities annuma-
tur: præcipuè quod pingue est, & recens. Medullarum
optima est uitulina. Ex resinis aptissima est, Chia uo-
cata, & larix. Post has pinea. nde ab Iietina. Strobilina

Styracis diffe-
rentiæ.

Medullarū op-
tima ē uitulina
Resinarū diffe-
rentiæ.

uerò uehementer est acris. Pityina, quam propriè physema uocāt, pinguitudinis expers, exiccat admodum. Has igit fugere, Chia uerò & abietina uti oportet, non ipsi per se, sed cum cera, & aliquo aliorum, quæ conducere affectui uideantur. Brutia pix & ipsa eandem obtinet uim, nonnihil pinguis & tenax. Pix alia non est miscēda, sicuti nec bitumen; utpote iusto sicciora. Exicantia quippe, mollientibus sunt contraria. Quoniam uerò & piceam, & phrycten resinam, & colophoniam appellare consueuerunt, sciendum est, & aliā colophoniam quandam haberi, chiæ mastiche similem, quæ nō nihil molliens sortitur, quemadmodum ipsa mastiche & thus. Ad hæc Aegyptia mastiche nonnihil emollit. Thus etiam, quandam molliendi uim obtinet; uerū hoc quidem, coctum ex usu est, ueluti & scenigræci semen. Hoc etenim probè coctum emollit, ac magis adhuc, si adipi temperetur. Quæ citra coctionem liquari, diluiq; ob consistentiæ siccitatem, non possunt, oleoso aliquo indigent, cuiusmodi sunt, tum oleum ipsum, cui nihil astringēs inest: tum balneorum strigmenta, & qd uocatur susinū, & hoc multo magis comaginū. Huius generis est butyrum, althegq; & scenigræci decoctum. Porro inter ea quæ sic emolliunt, & ea quæ ualidis simè (cuiusmodi existunt styrax, & bdellium) ammoniacum thymiana idem potest quod propolis. Cæterū Scythicum bdellium Arabico est multo ad emolliendum præstantius. Chalbanum & opopanax, præterq; qd digerunt, etiam aliquid molliens sortiuntur. Opopanax tamen digerendo: chalbanum molliendo, coquendoq; præcellit. Ex his igitur quæ produximus, ualida ualidis, imbecilla imbecillis sunt adhibēda affectibus. At ubi post primam pharmaci impositionem, denuò ipsum applicas, oleo pingui partē affectam fouere conuenit. Ex his autem quæ ἐχέκολλα (quod tenacius hereant) uocantur, nullum auferendū est, prius q̃ sua spon-

Colophonia
duplex.

Mastiche.
Thus.
Scenigræci se-
men.

Bdellium.
Ammoniacum
thymiana.

Chalbanum.
Opopanax.

Tenacia medi-
camēta non eē
amouēda, pri-
mū sua sponte
excidant.

Malactica pri-
mi ordinis.

Malactica se-
cundi ordinis.

Amythaonis
malagma.

te abscedant; * sed ut adhæreant semper sinenda sunt, etiam si ægrotās lauetur. Vitanda autem omnino sunt medicamentosarum aquarum lauacra: præsertim quæ chalcanthum, alumen, & sulfur referunt. Quum igitur malacticorum sint uarij gradus, & differētiæ, certè malacticis primi ordinis ad exiguas durities, atq; in molli-
libus utemur corporibus; ut secundi, ad fortiores tum affectus, tum corporū habitus: ac similiter tum tertij, tum quarti, nimirum pro illorum ratione.

Malactica primi ordinis. Butyrū, uel resina colopho-
nia, & cera candida nō uetusta, singula pondere equa-
lia, inuicem liquata, primi ordinis malactica sunt. Li-
quidum similiter medicamen, quod Parygron uocāt,
primi ordinis est. Emollientium imbecillimū est cera
cum butyro soluta, aut ex susino, aut comageno. At
his imbecillius cererelæon dictum. Iam ex ouis cera-
ta facta, exiguam quandam relaxandi uim possident.
Valentiora his, uerū imbecilla adhuc & ipsa, cerata
ex œsypo, resina, & cera pari pondere liquefactis.

Malactica secūdi ordinis. Emplastrū quod ad Mna-
sæum refertur, rectissimè secundo malacticorum ordi-
ni ascripseris, nimirum constans ex oleo ueteri, argen-
ti spuma, & suillo adipe. Ceterū si omnia illa fuerint
recentia, imbecillimum pharmacum fiet. Validius au-
tem, oleo quidem existente ueteri; adipe autem recēte.
At ualidius adhuc, ex uetustis ambobus constiterit.
Quocirca secūdum uetustatem quidem olei & adipis,
pondus autem singulorum quæ induntur: uarias diffe-
rentias ipsum medicamentum suscipiet. Copiosa siqui-
dem argēti spuma injecta, medicamen potestate mol-
lius euadet; paucior, ualidius; ac magis emolliet, si plus
adipis immittamus; digeret fortius, si augeamus oleū.

Amythaonis malagma ab Asclepiade scriptum.
Ammoniaci thymiamatis, ꝑnc. xxxvj, cere tantūdem,
terebinthine ꝑnc. viij, bdellij, tantūdem, chalbani, thu

ris, myrrhe, sing. vnc. iij. cyprini heminas. iij. Conficito. Discutit omnem durittem. Valet contra præcordiorum tensiones, impeditosq; articulorum morus.

Malagma Dioscoridis, ad eadem. Cerae minam unā. resing phrycæ, chalbani, iridis Illyricæ, sin. ming dimidium irini fecule quod satis est. Vini quantū uolueris. Conficito.

Malagma
Dioscoridis.

Malagma Lucij omnem duritiem digerens, articulosq; impeditos relaxans. Bdellij, seui uittulini, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ, sin. drach. xvj. opopanax, chalbani, cachryos, styracis, thuris, sing. drach. viij. piperis grana clx. irinæ fecule, qd sit satis, cerae, resing terebinthinæ, sing. selibram. Vini quod satis esse uideatur. Conficito. Est enim extremi emollientium ordinis: ut quo nullum durescentia magis emollire comperias.

Malagma Lu
cii.

Malagma Neapolitæ ab Asclepiade scriptum, contra omnes durities: quod etiā pleuriticis auxiliatur. Vini pissitæ, sextarios sex. cerae lib. sex. ammoniaci thymiamatis, phrycæ, utriusq; vnc. iij. terebinthinæ. thuris, myrrhe, aloes, aphronitri, lapidis Asij floris, gentianæ radicis succi, sing. vnc. vj. sagapeni, sulfuris uiui, propolis, sing. vnc. iij. panacis rad, psamyschi, piperis albi, sing. vnc. iij. Conficito, & utitor.

Malagma
Neapolitæ.

Malagma Andromachi. Picis lib. iij. cere lib. ij. resing, libram. chalbani vnc. ij. ammoniaci thym. tantūdem. manne vnc. iij. aceti sextarios. iij. Malagma Andromachi ex meliloto. Nardi Gallicæ drac. x. cyperi, cardamomi, ireos Illyricæ, myrrhe, sin. drach. viij. croci, drach. iij. meliloti drach. xxv. ammoniaci thymiamatis, drach. viij. terebinthinæ drach. L. cere recentis, drach. C. cyprini, heming dimidium, aceti quod sit satis. Conficito.

Malagma An
dromachi.

Emplastrū ex
meliloto.

Malagma ex baccis lauri Andromachi. Cerae, picis brutæ, baccarum lauri, nitri, resing phrycæ, sing. drach. lxxv. chalbani, ammoniaci thymiamatis, cachryos, ameos, singu. drach. xij. piperis albi, drach. xvj. cyprini hemi. vj cōficito.

Malagma ex
baccis lauri.

Ischiadicis ca-
taplasma.

Ad Ischiadicos generosum. Rutę agrestis seminis, silphij, baccarum lauri, aphronitri, abrotoni, colocyn-
thidis, cardamomi ameos, sing. drach. iij. Rutę uiridis,
picis, terebinthinę, ammoniaci thym. cerę, seui, sing.
minę partem octauam. chalbani, drach. vj. opopana-
cis drach. iij. sulfuris uiui tantūdem. Conficito.

Lienosis opti-
mum cataplas-
ma.

Ad Lienosos. Cerę minam. ammoniaci thymiamatis, minę dimidium. aluminis liquidi, drach. L. strig-
menti, heminam. Capparis rad. calaminthę rad. myro-
balani fecis, quod magma uocant, sing. drach. L. aceto
aridis, oleo adiecto liquidis, utitor.

Hepaticis con-
ueniens malag-
ma.

Malagma ad Hepaticos. Ammoniaci thymia. bdellij, singu. drach.
cxliij. croci, myrrhę, sing. drach. xij. cerę drach. cxliij.
aceti, quartam partem heminę, cyprini, heminam.
conficito.

Rheumatismis
uētriculi & in
testinorum, ma-
lagma.

Malagma ad rheumatismum stomachi
& intestinorum. Oenanthę, vnciam. omphacij, vnc.
iij. phœnicobalani carnis, vnc. ij. acacig, rosarū, aloes,
sing. vnciam. gallę, aluminis, picis, sing. vnc. iij. cerę
vnc. iij. Vinum aridis affunditur.

Hydropicis cō-
ueniens malag-
ma.

Ad Hydropi-
cos, & flatuosos. Picis liquidę, cere, utriusq; libram,
nitri, sulfuris uiui, aluminis fissi, sin. vnc. vj. p. misceto.

Colicis malag-
ma Antipatri.

Malagma Antipatri ad colicos. Silphij, drach. ij. he-
leliphaci, casię, melanthij, staphidis agrię, chalbani,
struthij, sulfuris uiui, sing. drach. iij. panacis, propolis,
pyrethri, ammoniaci thymiamatis, nitri, singu. drach.
vj. Asij floris, drach. xxv. cerę drach. cl. resinę, tantū-
dem. olei heminam. Conficito.

Anodynōn ad
podagram.

Anodynōn Nico-
strati ad podagram. Cerę libram. Ammoniaci thy-
miamatis, vnc. ij. opopanacis, vnc. iij. S. mecōij, vnc.
iij. cyprinum ad contusionum eorum adhibetur.

Arthriticis au-
reū malagma.
Pleuritidi con-
ueniens malag-
ma.

Aureum malagma ad Arthricos. Resinę strobiling,
lib. ij. chalbani, drach. xij. axungię porcine tantūdem.
cere drach. xxiiij. baccarum lauri, drach. xij. incoquito
ut decet.

Aliud ad Laterum dolores. Cyperi,
cardamomi, mannę, ammoniaci thymiamatis, tere-
binthinę

binthinæ, ceræ, irini, singu. libram. Misceto. Porro phlegmones, scirrhiq; eadem quodammodo generatio & curatio est. Nascitur enim ex confluxu humorū uterq; affectus; curatur iisdem uacuatis: quāq; euacuationis modus utrobique idem non est. Quippe inflammationis quidem particulis tum repulsoria medicamentorum qualitas, morbi initio, tū discussoria semper ex usu est. Scirrhis autem, sola discussoria sine repellente. Itaq; summè indurata scirrhus, prorsus, insanabilia sunt. Dignosces autem ipsa hinc, qd nullus sensus partibus affectis supersit. At in quibus sensus quidē est, sed obscurus, hæc curantur pharmacis digerentibus incrassatum humorē; non tamen ualidē, ac uniuersim hoc agentibus; quod epispastica solent. Quocirca minimè sanè oportet mirari, si partes inflammate scirrhum interdū contrahant: dum uidelicet humor quidem influens est simul crassus & uiscidus; curatio autem medicamentis ualde exiccantibus administratur. Nam quemadmodum in externis rebus, permulta corpora quæ ignem contingunt, ab ipso torrētur; atq; rursus ab aqua emolliuntur; ita in particulis inflammationis, ex humore ipso, à calfacientibus & exiccantibus acerrimè deficcato, relinquitur quippiam crassum & uiscidum, nimirum omni tenui discussio. Atq; hac sanè ratione in morbis articularibus pori gignūtur; nec secus per nephritidas calculi. At si fluxio, quæ phlegmonem gignit, tenui substantia sit, curatioq; eius per siccantia & calfacientia pharmaca administretur, nihil scirrhum relinquit; imò refrigerantia uehementer, astringentiaq; scirrhos procreare tunc solent. Vnde multis per erysipelata uehementer refrigeratis, occalescere solent humores. Igitur primus usus in dolentibus inflammationibus est, qui medicamentis abundē humidis simul & modicè calidis administratur. Alter paulo crassioribus, & sic cantioribus constat. Tertius relaxantibus nominatis,

Inflammationis curatio.

Scirrhi curatio

Scirrhi incurabiles, ab iis qui possunt curationem suscipere, quomodo discernantur.

Phlegmonæ quando in scirrhum degenerent.

Pori quomodo generent.

Calculi ut gignantur in renibus

Refrigerantia quando scirrhos producant.

Inflammationibus quæ medicamenta conuenire videant.

quæ nonnulli inter malagmata collocant. Sunt autem inter ea, maximè emollientia quidem, quæ consistentiam cerati referunt, quum ex butyro, cera, adipibus, oleoq; relaxante conflantur. Temperatur ipsis cæsypii, resinæ, & picis, modicum: sicuti & thus, & chalbanum, & nonnihil ireos Illyricæ.

Acopa medica
mina qualianā
esse debeant.

De Acopis, siue labores lenientibus. Acopa medi-

Resinarum dif
ferentia.

camenta omnia, liquidæ cōsistentiæ necessariò esse debent. Inter quæ sanè oleū per se, eos laboribus qui summam cutem infestant, persanat: altius autem ingruentes, uehementioresq; alicui relaxanti, & mediocriter calfacienti cōmixtum: ut chalbano, resinæ terebinting, colophonixq; phryctæ appellatæ. Quibus calidiores sunt abietina, & strobilina. Terebinthinam uerò larix nonnihil calore superat. Cæterū id genus omnia relaxantibus oleis miscentur, quale est Sabinum: iniecta interdum & cera. Iam uerò ἀκονιον unguen est, ubi dolor altius infestat, medicamē ex semine abietis, chamæmeli, anethi, & floris populi: præterea susinum, gleucinum, & comagenum: & quæ tum ex medulla, tum adipe componuntur: suillo quidem, moderatissimè relaxante: gallinaceo autem, his uehemētius, & hoc adhuc magis anserino. At adeps leoninus, & pardi, ualidior est, ut iam uehementer calfaciat, eoq; discutiat insigniter. In medio horum, bubuliq; & caprilli, consistit uul-

Adipis diffe
rentia.

pium atq; hyænæ adeps. Meminisse autem oportet. In medio horum, bubuliq; & caprilli, consistit uul-

Dura corpora
uentiora me
dicamenta po
stulat, q̄ q̄ mol
li carne sunt
prædita.

dura corpora requirere ualentiora pharmaca: mollia uerò & humida, minimè talia medicamenta perferre posse. Nec ignoratur, quæ dicuntur myracopa medicamenta, ex acoporū cum unguentis temperatura fieri, nihilo cæteris præstantiora, nisi odoris fragrantia.

Acopon The
misonis.

Acopon Themisonis ab Asclepiade scriptum. Sam-psuchi, rorismarini foliorum, scœnigræci, sing. sextariū unum. cardamomi, brathyos, sing. sextarij dimidium. vini dulcis sextarios tres, olei yenafrani, trepōdo, cere

MED. SEC. GEN. LIB. VII. 307

libras.ij. conficito ut decet.

Acopon ex melle.

Mellis, irini, rosacei, cyprini, gleucini, ceræ, terebinthi
næ, sing. vnc. ij. conficito.

Acopon ex
melle.

Acopon Aphrodæ, *δυσώδης*, hoc est foetidū appellatū.

Acopō Aphro-
dæ, foetidum.

Ceræ, terebinthinæ, sing. drach. viij. chalbani, drach.

vj. olei ueteris, heminas duas, medullæ ceruinæ drach.

vij. conficito.

Aliud ad omnem neruorum do-

Acopō ad om-
nem neruorum
dolorem.

lorem. Resinæ terebinthinæ, drach. lvj. ceræ drach.

xxvij. ammoniaci thymiamatis, drach. xxxij. chalbani

tantūdem. medullæ ceruinæ, drach. xxiiij. olei ueteris

heminas duas. conficito.

Aliud *διὰ τὸν καστορέον*

Acopen ex ca-
storio.

hoc est ex castorio: quod solutis, & omni diuturno ma-

lo auxiliatur. Oesypi, vnc. iij. medullæ ceruinæ, vnc.

iiij. terebinthinæ, vnc. iij. ammoniaci thymiamatis, chal-

bani, castorij, piperis albi, euphorbij, adarces, nitri spu-

mæ, opopanacis, sing. vnc. ij. olei styracis, vnc. iij. unā.

olei irini, vnc. ij. olei ueteris, heminam unam. cere feli-

bram. conficito.

Vnguentum dolores articu-

lorum discutiens. Thuris, piperis albi, sing. drach. x.

aphronitri, drach. viij. myrrhæ, drach. iij. ammoniaci

thymiamatis drach. vj. aceti, quod sit satis. olei cypri-

ni heminam unam.

Medicamen ex populo.

Acopon ad ar-
ticulares, dolo-
res.

Populi nigræ surculorum minam. cucumeris agrestis

rad. lib. iij. casia fistule, lib. ij. vnguenti crocini, lib. ij.

croci, vnc. iij. uini odorati sextarios. xij. olei sabini sex-

tarios. x. sampsuchi, ceræ, sing. lib. iij. Surculos populi

diligenter contusos in uase duplici unguentario conti-

neto: quibus sampsuchum, cucumerisq; radices concī-

sas adiicito. His uinum superfundito. Omnia diebus

nouem macerari finito. Sequēti die oleum adiiciatur,

& rursus accuratè tunsa, igne non acri incoquito. Po-

stea liquori expresso ceram subactam, & medullam li-

uem factam indito. Igni imposita coquito. Vbi liqua-

ta fuerint, ab igne tollens, crocinum adiungito, moue-

toq; continuè. Crocinum uerò læue factum, terrestres

Medicamē ex
populo ad arti-
culares dolo-
res.

Vuuu ij

testudinis sanguine excipito, ut olei ueteris crassitudi-
nem habeat. Liquata croco iniecta, rursus tūdito, atq;
exceptis utitor. Arthritide, & ischiade liberat.

**Podagricū me-
dicamē flauū.**

Aliud flauū Clemtiens. Cuius usu nouimus homines
toto distortos corpore, conualuisse à podagra, chira-
graq;. Olei Sabini, lib. xij. cucumeris agrestis rad. lib.
xij. ceræ, terebinthing, medulle ceruine, chalbani, sing.
lib. j. Oleum diuidimus, & seorsum in eo ranas, seor-
sum item radices incoquimus. Dein liquore percola-
to, ad pharmaci confectiōem utimur.

Acopō Haliei.

Acopon viride Haliei. Ceræ, terebinthinæ, olei uete-
ris, sing. selibram. aphronitri, vnc. iij. chalbani, ærugi-
nis rasæ, sing. vnc. iij. opopanacis, vnc. vj. ammoniaci
thymiamatis, manne, sing. vnc. iij. acetī, melini, cypri-
ni, irini, sing. vnc. ij. seui caprilli, vnciam. conficito.

Acopon Casti.

Casti Acopon, ad diuturnos affectus & conuulsiones.
Pysselæi, Syriaci vnguenti, utriusq; sextarium. ireos
Illyricæ, parem modum. terebinthinæ, libram. axun-
gig tantūdem. Rasuræ naualis, vnciam. Incoquito, ru-
ta uiridi mouens. Gleucini confectio Androma-

**Gleucini con-
fectio.**

chi. Myrrhæ, nardi Indicæ, cuiusq; lib. ij. costi, lib. iij.
styracis, libram. bdelli, sampsuchi, xylobalsami, iun-
ci odorati, cardamomi, spathæ, ireos Illyricæ, misyos,
asari, sing. lib. ij. meliloti, nardi Gallicæ, sing. libram. as-
palathi, calami, sing. selibram. aristolochiæ longe, tan-
tundem. roris marini seminis, sextarios duos. thuris, ca-
sæ, sing. lib. iij. scenigræci sextarios duos. sphagni, a-
momi, sing. lib. ij. corticis thuris, libram. rosarū sicca-
rum, lib. ij. carpobalsami tantūdem. croci vnc. iij. bac-
charum lauri, libram. piperis albi, tantundem. opobal-
sami, uascula tria. malabathri foliorum, lib. ij. nucleos
pineos uirides duos. rutæ uiridis vnc. ij. salis amonia-
ci, nitri, cuiusq; vnc. iij. uini ueteris, sextarios. ij. mu-
sti boni, uascula duo. S. olei ueteris. lib. v. præparato
diebus quinquaginta. Ad dolorem lassitudinemq; tol-

lendam, medicamen est longè accōmodatis simū.

Acopon Heræ, ad diuturnos dolores coxendicos, ar- Acopon Heræ.

ticulos impeditos, & paralyfin, admodum efficax.

Olei ueteris, irini, laurini, pyracini, ceræ, sing. lib. vj.
terebinthine, piperis, euphorbij. singu. vnc. ij. ammo-
niaci thymiamatis, vnc. iij. castorij, opopanax, chal-
bani, medullæ ceruinæ, sing. vnc. ij. Liquabilia liqua-
ta siccis affundito, & unitis utitor.

G A L E N I P E R G A

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum Loca Liber Primus.



QVOD non modò affectus ipsi, sed
etiam ægri tēperies, naturaq; partis
affecte, ipsam curationem common
strent, alibi à nobis est demonstratū.

Curationē quę
indigent.

In hisce autem cōmentarijs, de com-
positione pharmacorum ad singulas
corporis partes congruente, differere est animus: ad
quod iam negotium accingimur, à uitijs capillorum
exorssi. Porro generatio pilorum, eadem est quæ plan-
tarum. Nam quemadmodum ex istis quædam arte &
arbitrio agricolæ: quædam, iuxta naturales causas pro-
ueniunt: eodem modo & in animalium corporibus, ar-
uo qdem alicui, triticum, aut hordeū, aut aliud quod-
dam cerealium seminū in se insita habenti, caput assi-
milatur: alijs uerò herbis quę in * aridioribus crescūt
regionibus, reliqui totius corporis pili similem genera-
tionem sortiuntur. Siquidem non secundum primam
rationem, sed per accidens quoddam natura ipsos con-
suevit gignere. Igitur affectus pilorū sunt, tum deper-
ditio omnimoda: tum coloris mutatio: qualis in uitili-
gine alba, quam leucen uocāt, fieri consuevit. In id ge-

Pilorum gene-
ratio, eadē est
quæ plantarū.

Pilorum affe-
ctus.

Vuuu iij

LIBRO II. GAL. PER. DE COM.

Medicamenta nus autem affectibus, sicuti in alijs omnibus, summè
fuit semper ta- curādum est, ut quæ præsidia adhibebimus, aut iuuēt,
liā, vt si non aut certè nō noceāt. Atqui usus pharmacorū ametho-
profint, non læ dos, non modò non potest, sed et obest frequenter.
dant.

De Alopecia, Caluitie, & Ophiasis.

Quemadmodum ex plantis ipsis, nonnullæ qui-
dem, ob humorum inopiam resiccatae, extabe-
scunt: nonnullæ autem, q̄ humoribus à sua natura alie-
nis imbuantur: eodem etiam modo capilli, aut propter
penuriam humorum, à quibus consueuerunt nutriri:
aut propter prauitatem, corrumpi assolent. Ac ppter
inopiam quidem, caluities accidunt: propter uitium autē
succorum, Alopecia, & Ophiasis. Etenim læsa capitis
pars, serpenti similis in ophiasis apparet. Alopecias
autem, ob id ita appellari ferunt, q̄ uulpibus frequen-
ter accidunt. Iam uerò, quales tandem sint ipsi corru-
pti humores, ex colore cutis in capite faciliè licebit ti-
bi discernere. Alijs nāq; albidior apparet: alijs nigri-
or: atq; pallidior alijs. Quare in istis primū totius cor-
poris purgationem molieris, aut pharmaco pituitam
ducente exhibito: aut quod bilem pallidam, aut nigrā
eliciat: coniectura redundantis humoris, ex colore cu-
tis inita. Ego uerò hiera exhibita semper ipsos purga-
ui: aliquando nigro ueratro adiecto, ubi melancholicū
succum uacuare erat animus: aliquando scammonio,
si amara bilis purganda esset. Vbi uerò pituitosiores
exuperare humorem conieci, nihil admiscui. Tales si-
quidē, præsertim ex capite, hiera ex colocynthide pur-
gare humores consuevit: simulq; cum ijs, alios quosdā
etiam si scammonium, aut ueratrum nigrum, aut epi-
thymum, non addatur. Catapotia etiam ex aloe, quæ
tum scammonium, tum colocynthidem admixtam ha-
bent, commodius ita affectos purgare solent. Post to-
tius autem corporis purgationem, apophlegmatismi
pituitam è capite detrahare præstat: ac dein, localibus

Capilli a qui-
bus causis cor-
rumpi soleant.

Caluities.
Alopecia.
Ophiasis.

Color cutis q̄
litatem humo-
rum subtus pu-
trescentium in-
dicat.

Pitorum corru-
ptiōis curatio.

Hiera ex colo-
cynthide.

uti auxilijs. Cæterum incipientes ophiases & alopecias, per astringentia & refrigerantia præsidia cohibere conuenit: adultæ autem, digerentibus discutiendæ sunt. Ego uerò quendam adolescentem in principio affectionis curauì sola purgatione ex hiera dia colocynthidos. Prius tamẽ cataporia ex aloë undecim ei exhibueram, cicerum magnitudine. Habent autem cataporia hæc, colocynthidis, partem unam: aloës et scammonij, utriusq; partes duas: quibus partem unã succi absynthij addo. Antea uerò etiam mastichẽ chiam, & bdellium imiscebam. Porro pharmacum extrinsecus adhibendum, si præter hoc quòd uitiatos humores discutiat, etiam idoneum sit ad probum sanguinem attrahendum, ueluti est thapsia, censendum sanè est optimum medicamen. At uerò quum thapsia longè calidior sit, q̃ affectus postulet, meritò eius per se usum uitamus. Exulcerationes quippe excitare consueuit, ac omnino quosdam inflammatos tumores. Quamobrem quædã quæ illius uehementiam mitigent, necessariò admiscemus: id quod ceratum ex oleo aliquo tenuium partiũ (cuiusmodi Sabinum est) prestare commodè poterit. Vñus quandoq; sum etiam sola thapsia, sed uehementi illius facultate, larga aquæ affusione exoluta. Porro ex pharmacis prædicto affectui congruentibus, uehementer quidẽ calfacit euphorbiũ: sufficienter autẽ laurinũ, siue oleum, siue unguen. Licet igitur ipsis per se uti, euphorbio quidẽ, oleo intrito, ac læuigato: laurino uerò, solo, citra alterius admistionem, illito. Si tamen nimis fluidum appareat, parum ceræ ipsi addat. Quum uerò multo calidius sit recens euphorbium, si quidem bimo, aut trimo ipso utaris, ad libram unam Romanam olei, euphorbiũ uncia unam iniicies: recenti autem euphorbio, sicuti & thapsia, & omnibus fortibus pharmacis, parcius utendum est. Peccatũ siquidem infra modum, nullum detrimentum adfert: su-

Cataporia
ex aloë com-
positio.

Thapsiæ facul-
tas.

Euphorbium,
Laurinum.

Peccata infra
modũ non ad-
ferunt detrimen-
tum,

Vuuu iij

Vetusta phar-
maca suas fa-
cultates amit-
tere.

Vigor medica-
mentorū ex
qbus notis ex-
pendi queat.

Limnitis.

Adarcium.

Alopeciis con-
gruentia medi-
camēta simpli-
cia.

Alopeciis inue-
teratis optimū
medicamen.

pra uerò, aliquando exasperat, exulceratq; cutem,
atq; inflammationem excitat. Similiter etiam fugien-
da sunt, omnia ualde uetusta pharmaca: quandoqui-
dem uel metallica ipsa, ubi nimis antiqua sunt, suas
facultates amittunt. Vniuscuiusq; aut medicamenti
uigorem, iis qui saepe ea conspexerunt, licet cogno-
scere, tum ex odore, tū ex gustu, atq; adeò interdum
ex colore, consistentiaq;. Est itaq; inter ea quæ alo-
peciis conferunt, calidissimum medicamen euphor-
bium: eo autem minus calidum, est thapsia: post hæc,
sinapi, nasturtiumq;. Iuxta alium autem modū lim-
nitis (quæ adarcium & adarce uocatur) nulli horum
secundum est. Post hæc succedūt sulfur, & nitri spu-
ma, ipsumq; nitrum molle, ustum, & quod Bereni-
carium uocatur: quemadmodum & aphrolitron al-
bum, læue, atq; laxum. Deinde ueratrum utrunq;, &
erucæ semen, & laurinum unguentum, aut oleum:
ad hæc alcyonium utrunq; ustum, & non ustum: ca-
lamiq; tum radices, tum cortex, ambo usta. Quin &
pix liquida, & cedrinum, quod cedriam uocant, &
murium stercus, ursæq; adeps. Hyænæ etiā, leonis,
pardalis, anserisq; adipēs cōgruunt: & quicunq; te-
nuium partium substantiam fortiuntur. Amygdalæ
etiam amaræ totæ ustæ, cōmodæ sunt: & thus aceto
acerrimo maceratum. His itaq; omnibus pharma-
cis licet utaris, fortibus quidem, ceratum liquidum
temperans: debilibus uerò, laurinum oleum immi-
scens. Rursus, inueteratas quidem, ac difficulter cu-
rabiles, cum fortibus persanare conaberis: incipien-
tes autem & paruas, cum imbecillis. Ad alope-
cias composita. Euphorbii, thapsiæ, laurini, sing.
drach. ij. sulfuris uiui, ueratri, utriusq; drachmā unā
cēræ drach. vj. misceto, utitorq; hoc, ceu fortissimo
pharmaco ad inueteratas, ægreq; curabiles alope-
cias. Si thapsia nō adsit, pro ipsa licet tantūdem adii-

cerē seminis nasturtij, aut erucæ, aut ipsiusmet nasturtij. At loco laurini, picem liquidam pones. Admiscui etiam aliquādo mel, nec deterius euasit pharmacum. Porro quæ ex adipibus, ac modica item thapsia constant, similiter prosunt, præsertim si euphorbium & adarcium addatur. Sit autem adipis leonini, pardalii, & hyænæ, cuiusq; pars una: quibus miscere anserinum atq; ursinum poteris: ita ut ad duodecim adipum uncias, thapsiæ aut euphorbij unciam uriam iniicias: quanq; ambo etiam potes adiacere, si efficere fortius pharmacum uelis. Auspicari autem semper à leuioribus conuenit, & respectu effectus, quem pharmacum primò admotum produxerit, sic facultatem eius aut lenire, aut augere. In alopecia igitur, primùm quidem capillos nouacula tollere expedit: dein affectam cutem per lintelum nec asperum, nec molle nimis, confricare: ac uidere ad quantum ruborem per huiusmodi motionem peruenit. Magnam nanq; spem successuræ curationis tibi iniiciet, si per modicas defrictiones rubefiat: quæ moderatæ affectionis significatio existit. Si uerò per multas frictiones, tandem succedat rubor, grauiorem tum affectionem, tum curationem indicat: præsertim si quædam cuticulæ, etiam si multum confrices, non rubescant. Præ omnibus autem cauendum est, ne in fortium pharmacorum admotione, cutis ultra q̃ par sit, cōcalescat: id quod tum ex colore ipsius, tum tactu deprehendes. Colore nanq; flauior apparebit, & digitorum contactu satis calidam agnoces. Quare tunc ad molliora trāseundum: aut eodem utendum quidem, sed cerati, aut adipis, aut liquoris cuiuspiā oleosi, ui ipsius exoluta. Utendum est & olei calidi dulcis irrigatione, & cataplasmate ex pane, fomētisq; & scarificationibus: necnon cucurbitis, & cerati inunctionibus. Cæterum perse-

Leuiorib⁹ medicamentis esse i primis utēdū, quando alopecis medemur.

Alopecis facile curabilis argumentum.

Alopecie re-
bellis curatio.

Alcyonium.

Lucernarum
oleum est te-
nuius cōmuni.

uerante affectione, ut edum est assidua rasura, & ru-
bificatione ex sinapi, præscriptisq; frictionibus: se-
quētib; autem diebus, illita pice, aut oleo cedrino,
& post frictionem, scarificatu. Quidam uerò acicula-
rum aceruo affectam cutim compungunt. Post hæc
omnia, pharmacis quæ ex alto euocare, & meatus
transmutare possint, utendum. Curandum aut per-
petuò est, ut in aere calido, insolatoq; (si id fieri pos-
sit) omne pharmacum applicetur. Hyemis uerò tem-
pore, præstiterit in balneo his pharmacis uti. Porro
alcyonium ustum, illitumq; ex lucernarū oleo, me-
diocres discutit alopecias, pharmacū mediocre quū
sit. Est autem lucernarum oleum cōmuni magis te-
nuium partium. Aliud Herg, ad molli carne præ-
ditos. Sem. erucæ, & nasturtij, nitri, sing. partem
unam: contritis affunditò picem liquidam, utitorq;.

Aliud à Critone descriptum. Herinaceorum
cinere permisto ursino adipi, utitor. Aliud. Calami
radices ustas, adipeq; ursino exceptas, impone.

Aliud ad inueteratas. Muscerdæ, thuris, cuiusq;
drach. ij. aceto acerrimo dissolutis utitor. Aliud.

Cinerum ranarum minimarum in ollula usta-
rum, muscerdæ, ueratri albi, radicis calami ustæ, pi-
peris albi, singulorum æquis portionibus aceto ex-
ceptis, fricato. Aliud ex libris Cleopatrx. San-

daracham tritam, largoq; uisco querno exceptam, lo-
co per nitrum prius præparato, imposito. Aliud.

Scillæ, ueratri albi, utriusq; drach. j. ex aceto trita,
prærafis & nitro confictis, imposito. Aliud.

Muscarum capita contrita affrica. Aliud præ-
cellens. Murium domesticorum ustorum, panni-
culi ampelini usti, dentium equinorum ustorū, adi-
pis ursini, medullæ ceruinæ, corticis calami, singulo-
rum æquis portionibus simul exceptis melle, utitor.

Aliud Archigenis, ad alopecias in altum pro-

gressas. Cum aceto, nitri gleba, aut fici folijs, usq; ad dilanationem defrica: deinde deterfo sanguine, be- tam ex uino coctam impone: aut caricas uistas, cum uino, aut lentis farinā ex uino, pro cataplasmate ad- hibe: Aut cantharidas uistas, pice liquida exceptas, ad ceratq; liquidi formam redactas, impone. Aut

testudinis marinæ sanguinem illine. Aut thapsiæ succum cerato exceptum illine. Aliud Asclepia-

dis Bithyni. Spumæ nitri, partes duas: salis ammo- niaci, partem unam: quibus tum uistis, tū tritis, acer- rimoq; aceto dilutis, præscalptam leuiter alopeciam illinito. Aliud Sorani. Stercoris felis aut cro-

codili, drach. viij. sinapis drach. iij. ex acri aceto læ- uigatas imposito. Aliud. Fici folia cum aceto,

donec lanugo prodierit, affrica: dein stœbes succum illine. Aliud. Locum per pumicem proritato,

& sulfuris, spumæ nitri, ammoniaci, sing. æquas ptes mixtas cū aceto illinito. Ad caluescentes præter

ætatem, & ad menti pilos non nascētes, remedium.

Adipis taurini insolati, lib. j. adarces vnc. j. suc- cū thapsiæ, vnc. j. S. myrrhæ, vnc. j. polytrichi, calli- trichi, sing. lib. S. membri asinini, splenis asinini, la-

dani, sing. lib. j. Ladanum in modico uino conterito:

adipem ad aque uaporem liquefacito: dein asininum membrum affatū, donec insumatur, radito: splenem

uerò cum polytricho & callitricho in noua olla tor- refacito: omnia deniq; contusa gleucino, aut sabino

excipito: & ante balneum iis utitor. Sciendum autem est, ladanum sordes esse ab hircorum barbis desum-

ptas: quas illi sibi ex cisthi madore contrahunt.

De capillorum defluuio.

Est & alia pilorum affectio, quæ ad raritatem cu- tis, inopiamq; substantiæ pilos gignentis, consequit:

maximè supueniens à morbo cōualescētibus. Qua- propter curatio etiam hoc modo læsorum non eun-

Alopeciis alti-
progressis re-
media Archi-
genis.

Caluescētibus
maturius, reme-
dium.

Ladanum esse
sordes ab hirc-
orum barbis
desumptas.

Capillorū de-
fluuii causæ.

Capillorū de-
fluuii curatio.

Astringētia ue-
hementer refri-
gerant, alimen-
tiq; influxū re-
primunt.

Defluuiis capil-
lis optimū me-
dicamē est, qđ
ex ladano, &
lentiscino oleo
constat.

dem scopum, quem alopecia, habet. In alopeciis si-
quidem, ut uitiatum humor consumatur, primum
scopum habemus: in his uerò, ut capitis habitum ro-
boremus, & alimentum boni succi attrahamus, cu-
tiq; densitatē & raritatem moderatam restituamus.
Quamobrem ad pharmaca humectantia aliquid mo-
deratē astringens admiscere oportet, quale est lada-
num: quod utraq; in se moderatē complectitur, quæ
ad hoc symptoma conueniunt: caliditatem nempe
mediocrem, & astringendi uim moderatam. Quare
si capiti prius raso, perfricatoq; , aliquo mediocriter
astringenti oleo (cuiusmodi Hispanū, & lentiscinum
est) illinatur, maximē ex usu est. Nam quæ uehemen-
ter astringunt, omnia etiam refrigerant, & alimentū
influxum reprimunt: propter cuius inopiam capilli
defluunt. Atqui intentio nostra est sanguinē affluen-
tem non modò non præpedire, sed etiam prolecta-
re: cogere autem sensum, & astringere rarefactam
cutem. Quare ad defluuios capillos omnium præ-
stantissimum medicamē est, quod ex ladano, & len-
tiscino oleo conficitur. Quòd si largē defluant capil-
li, maiorq; uideatur esse raritas cutis, pro lentiscino,
myrteo utendum. Licebit aliquando unguentū ad-
hibere nardinum, in ætate frigida, & hyemali tem-
pore: sicuti in diuitibus foliatum, & spicatum. Debet
autem ladanū liquari in duplici uase, ac reliqua po-
stea illi misceri. Atq; hæc sanē medicamēta mihi suf-
fecerunt, unā, cū refectione, salubriq; uictus ratione,
quæ in plerisq; etiam sola suffecit. Archigenis
remedium contra defluuios capillos. Ladani &
absynthij æquales partes, & iuniperi baccas. x. trit as,
in linteolum illigato, & in oleo per dies quinq; ma-
cerato, ex eoq; caput illinito, & neq; capilli decidēt,
neq; gignentur furfures. Aliud Cleopatraz ca-
pillis augens cito, densansq;, & denigrans. Lada-

num. ex oleo, uinoq; dulci leuigatum, in crassatumq; præfrictis illinito.

Comptoria ab exornatoria medicinæ parte, quomodo differat.

Comptoriæ qdem scopus est, inducere pulchritudinem. Exornatoriæ medicinæ partis, quicquid secundum naturam est, id omne, in corpore custodire: ad quod etiam naturalis pulchritudo consequitur. Indecoro enim aspectu est caput alopecia uitiatum: sicuti etiam oculi cilijs, & supercilijs nudati. Nō solum uerò ad pulchritudinem, sed multo prius ad ipsam partium sanitatem, pili conducunt. At faciei colorem per pharmaca nitidiorem, aut rubicundiores reddere, aut pilos capitis crispes, aut fuluos, aut nigros, aut auctos: hæc inquam comptoriæ prauitatis, non medicæ artis sunt opera.

Comptoria & exornatoria artis ps quomodo differant.

Pili ad qd conferant.

De tincturis capillorum.

Quandoquidem tamen iam consuetudo hæc inualuit, ut uetulæ quidē passim capillos denigrent, tanq̃ turpe sit canos habere: mariti autem id probent, spectaculum permolestū censentes, uxorem aniculā cano capite habere: sanè quæcunq; prædelicijs seipsas ornant, earum nulli tale quippiam à me petenti, exhibui: quæcūq; uerò honestiores, tum ut notæ culpam effugerent, tum ut molestias maritorum uitarēt, capillos suos nigros reddere optarunt, ijs certē, ne ex astrictoria uī nigrorem inferentiū oblererentur, consului, ut cedri liquore uterentur, ita ut tribus aut quatuor horis ante balneum illi inerent, & postea detergerent: idq; per quatuor aut quinque dies facere pergerent. Cedria siquidem non modò nihil lædit, sed etiam cōmoda est eis quæ facilè offenduntur à frigore: abundè uidelicet calfaciēs. Ad hæc, defluentes capillos corrigit, & non defluentes auctiores reddit. Contra uerò, quæ ex austeris & acerbis

Aniculā & cano capite uxorem habere, spectaculum fastidendum censetur.

Capillos denigrari cedri liquore.

composita sunt, magnopere lædunt. Caterum materia ex qua constant hæc, etiam quippiam tenuium partium habeat oportet: quo non in superficie tantum, sed in profundo etiam cutem permutet, progrediendo usque ad capillorum radices. Non solum autem in periculo uersatas sepe scio feminas, sed & mortuas, ex perfrigeratione capitis ab huiusmodi medicamentis inducta. Offenduntur tamen citius, quæ frigidius

Similibus affectionibus facilius singula corripitur: minus tamen periclitari.

Periclitari in morbis minus, quibus contingat.

Capillos tigentia, ab Archigene prodita.

capitis temperamentum sortiuntur. Frigida namque particulae frigidis affectionibus: calida calidis corripitur facilius. Verum minus periculum subeunt, utpote quum à minori causa lædantur, quæ frigidius habent temperamentum. At calide, propterea quod ægre & uix tandem lædi à frigidis causis possunt, si quando à magnis fuerint exuperatae causis, maiorem læsionem incurrunt. In morbis siquidem minus periclitantur illi, quorum naturæ, ætati, habitui, ac temporis ipsa ægritudo congruit.

Tingentia capillos, ab Archigene prodita.

Radicem capparidis cum muliebri lacte, uel asinito ad tertias concoquito, & ad noctem pro cataplasmate imposito. Aut urina canis in quinque aut sex dies asseruata lauato. Aut corticis salicis succum ex oleo affricato. Summe namque denigrat. Denigrant barbam suber aridum & plumbum ustum, cum betæ crudæ succo mellis spissitudine illita. Fusuos aut reddunt capillos lupini crudi cum aqua & nitro illiti. Crispos reddes capillos, si spuma salis cum myrrha confricaueris.

De pharmacis corrumpentibus pilos.

Pilos corrumpentia pharmaca.

EX Pharmacis corrumpentibus pilos, quædam proprie psilothra nominantur: quædam capillorum attenuatoria: quædam penitus extirpantia. Atque hæc sanè ultimò nominata, periculosi sunt usus. Ex liquidis igitur est lixiuium tali ui præditum. Ex aridis

MED. SEC. LOCA, LIB. I. 19

autem & metallicis, arsenicū, & sandaracha, & calx non extincta. Manifestum itaq; est, uehementem ipsorum uim, per admissionem imbecilliorū pharmacorum, frangi: quorum congruentem miscellæ modum coniciet primò, qui ipsorū uires cognorit. Dein uerò per experiētiā defectum corrigeret, aut et addet.

Psilothra Critonis.

Calcis uiuæ partes duas: auripigmenti partem unam. Hæc in mortarium plumbeum cōiecta, aqua aut ptisanæ succo affuso terito: atq; ubi nigra reddentur, calfacta illini, maximè in balneo, iubeto.

Psilothra Critonis.

Aliud. Amyli, calcis uiuæ, auripigmenti, sing. ꝑnc. j. contritis utitor ex aqua dilutis.

Quæ pilos disperdant.

Disperdencia pilos componunt ex lepore marino, hepate thunni putrefacto, cedria, ranarum cruore, marinæ testudinis sanguine, lachryma uitis albæ, lachryma hederæ, similiterq; bryoniæ, atq; oleo insulso. Ex marinis item scolopendris, urticaq; marina, & stellis marinis, nitro, & amurca, ad hæc admistis. Quin & fortiora his ex herinaceis & salamandra componunt, in oleo coctis. Admiscent autem ipsis alcyonia, & sandarachen.

Pilos disperdencia.

Quæ pilos attenuant.

Atenuantia pilos, deterforie sunt facultatis. Igitur hordei, fabarum, atq; erui farina, spuma nitri, atq; ipsum nitrum, familiaria pharmaca sunt, omnibus ad tollēdas sordes usurpata. Assiduus autem eorum usus etiā pilos attenuat. Quæcunq; uerò fortius detergent, in ijs qui ualde duros & magnos pilos habent, adhibere oportet. Ac talia sanè sunt nitrum ustum, nitri spuma, & aphrolitrū spumofum, pumex, testæ ustæ, os sepia, utrunq; ueratrum, struthium, bryoniæ & dracunculi radix, aristolochia utraq; canchry, radix panacis, atq; id genus alia.

Pilos attenuantia.

Quòd si hæc ipsa odorata facere uis, cyperum, melilotum, rosas siccas, iunci odorati florem, iridem illyricam, melissophyllum, & cydoniam herbam eis admiscebis. Si uerò pro diuitibus pharmacū præpares, spicam nardi Indicam, Celticamq; & montanā iniicies; necnon Eretriada terram, folium malabathri, amomū, myrrham, crocum, costum, & hedychrom.

De furfuribus.

Furfures capit
tis a serosis suc
cis oriuntur.

Furfurum capi
tis curatio.

Q Vibusdam se scalpētibus furfuribus similia ex capitis cute decidunt, ob idq; Medici hoc symptoma furfures uocant, à uitiosis iisdemq; serosis succis proueniens, quos absumere propositum est, ijs qui huic malo mederi uolūt. Manifestum igitur est, disculforia & extersoria pharmaca adhibenda esse, præparato prius uniuerso corpore, si uitiosis succis redundet. Admiscuerūt quidam huiuscemodi pharmacis etiam astringentia nonnulla, quibus partem læsam ita corroborarent, ut non facilè influentes humores susciperet.

Remedium Archigenis contra furfures. Nitri spumam, & atramentum sutorium æquis partibus; cum uino tundito, utitorq; ter aut quater in mense. Aut uini Rhodij fecem, & punicis, & nitri, pares portiones, cum lupinis affrica.

De phthiriasi, hoc est, morbo pediculari.

Pedūculi in ca
pite a quibus
causis oriānt.

Pediculi nonnullis in capite acruatim gignuntur, ex multis humoribus calidis quidē, sed non ad tantam caliditatē progressis, ad quantā perueniunt acres atq; serosi humores. Quare manifestum est, in profundo cutis, pedicularis morbi affectionem fieri, ubi etiā animalcula huiusmodi gigni possibile est; nō in superficie, in qua ipsi consistunt furfures. Pharmaca itaq; ipsorum necessariò exiccantia sunt, & quæ ex alto trahe re, & euacuare possunt, magis utiq; q̃ ea, que conueniunt furfuribus.

Remedia Archigenis contra morbū pedicularē.
Staphidis

S Taphidis syluestris, partes. ij. sandarachæ & nitri, Pedicularis morbi remedia.
 utriusq; partem. j. cū aceto & oleo capiti illine.
 Aut oxylapathi radicem cum oleo. Aut ueratrum album, & staphidem syluestrum, & nitrum, pari pondere cum oleo in balneo adhibe.

De Achoribus, hoc est ulceribus capitis manātibus.

I Nter affectus inuadentes capitis cutem, Achor an Achores.
 numeratur, ex genere tumorum præter naturam existens: quo affectu infestata particula, foraminibus quibusdam tenuibus erodit, tenui humore modicèq; uiscido redundantibus. Ad similitudinē uerò eius proximè accedit alia cutis affectio, quæ Ceriō Græcis, Latinis Faus, uocatur: habens maiora foramina, in quibus humor hymettio melli similis continetur. Generatio ipsis ex humore mixto est, qui partim tenuem, sero sumq; ac mordacem: partim crassum succum in se habet. Tenuis itaq; humor, utpote mordax, primū quīdem, ad scalpendum ipsos impellit: progressu uerò temporis, ad sculpturam, tum tumor augetur, tum foramina circa ipsum erumpunt. Manifestum igitur est, humores qui affectionem gignunt, debere uacuari. Qui si etiam fluant amplius, prohibendus in primis est ipsorum influxus, per capitis, atq; uniuersi corporis euacuationem. At uerò si affectio ipsa sit parua, sola remedia localia sufficiunt, uel si minimè totum corpus uacuetur. Ea igitur pharmaca idonea erunt, quæ crassum humorem incidant, quæq; facultate sua necessariò discutiant, repellantq;. Atqui acetum ex incidentium ordine existens, ultra hoc quòd discutit, etiam reprimat, depellitq; id quod influit: * quum nimirum secundum substantiam suam habeat exiguum quid calidi: plurimum autem frigidi, sed tenuium partium. Esse autem debet acetum exquisitè acidum, in quo nulla penitus uini qualitas persentiat. Ac tali profectò pharmaca Ceriō.
 metallica imbues, achoribusq; ex ipsis medeberis. Achorū, fauorumq; curatio
Aceti facultas

cipere autem ab imbecillioribus præstat, præsertim si simul dolor infestet. Aptæ igitur ad hanc rem sunt, Cimolia, Cretica, Lemnia, Samiaq; terra: præterea pompholyx, spodiū, lithargyros, & cadmia tenella. Quod si his remedijs malum non cedat, pharmacum ex charta siccum, aceto dilutum illinito. Prius tamen capillos abrasdes. Quod si quando in ulcus manans inflammatum simul & afflictum dolore, incidas, lenies primum dolorem ipsum per humectum, cōcoctoriumq; & emolliens pharmacum, & quod acrimoniam arce-re possit; cuiusmodi sunt tum uocatum parygron, tum quæ sedis ulceribus, & cancris opitulantur.

Remedia Archigenis ad achoras.

CAdmiam cum oleo ueteri illinito. Aut cinna-bari similiter tritum imposito. Aut chalcit. dē cum myrteo oleo, uel suillo felle liquido inungito.

Remedia Apollonijs ad Achoras:

CAput succo betæ illinito, aut laurino oleo, aut crocino unguento, aut taurina, aut camelina urina. Vel fursurum chœnicem dimidium in aquæ heminis duabus madefacito, posteaq; terito, cremoremq; excolato, cumq; dimidia aceti hemina ad lini spissitudinē coquito, & ex eo caput fricato. Vel cucumeris agrestis radicū coctarum succo partē lēsam illinito. Vel argenti spumæ, drach. viij. foliorum rutæ tenerorum drach. v. olei drach. viij. aceti quartam partem hemina: simul trita capiti illinito.

Quæ Crito ad Achoras prodidit.

FIculneæ furculos, aut folia tenera trita cum aqua imposito. Aut recrementi ferri, & rosarum par pondus cum uino tūdito, impositoq;. Vel lithargyri, drach. l. foliorum rutæ tenerorum, drach. xxv. aceto diluito: & rosaceo, aut myrteo excepta, cum penna illinito. Vel, si affectio fuerit inueterata, Ladani, cerussæ, singu. drach. viij. sulfuris uiui drach. iij. uino &

myrteo oleo subactis utitor.

Ex libris Cleopatrx ad Achoras.

Foenograceo tenui cocto, & in betæ nigræ succo macerato, caput eluatur. Post ablutionē uerò myrto cum uino & oleo trita, illinatur: superneq; betæ folia imponantur. Vel cerusse, thuris, sing. drach. ij. sulfuris drach. j. trita ex oleo illinito.

Remedia Sorani contra Achoras.

Plumbaginis, sulfuris uiui æquales partes terito, & affuso rosaceo, aut myrteo, aut lētiscino, illinito. Vel sulfuris uiui, lithargyri, cerusse, sing. & aquas portiones, croci dimidiam: trita cum passo cretico illinito.

Ad psidracia, & achoras, pustulasq; ulcero-
sas, & eruptiones in capite.

AD affectiones præscriptas, conuenienti uti oportet uictus ratione: corpusq; atq; caput purgare, catapotijs ex aloe, colocynthide, & scammonio, succo brassicæ coactis. Dein localia remedia adhibenda sunt: cuiusmodi existit adiantum ex rosaceo illitum: aut fœnigræci decoctum affricitū: aut malua cum farina hordeacea pro cataplasmate imposita: aut melilotum cum farina fœnigræci, cicerumq; decocto impositū: aut ipsum met cicer decoctū, impositumq;: aut amare nuces cōmansæ & illitæ. Discutit autē maximè & lilij radix affricta: & thus cum uino & aqua: & lupinorum amarorum decoctum: & bulbi cum nitro affricti:

thus præterea ex aceto illitum: putamē mali

punici cum laurino illitū: & anchusæ

radix usta, tritaq; cum oleo, &

per pinnam inuncta.

Pustularū capi-
tis medicatio.

X x x x q̄

GALENI PERGA MENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECVN-

dum Loca, Liber Secundus.



Capitis dolor
discrimina &
generationes
variae.

Dolor capitis
nullus ad humi-
ditatem conse-
quitur.

Similariū par-
ticularum mor-
bi in pura intē-
perie cōsistūt.

VI citra distinctionem scripserūt auxilia doloris capitis, maius detrimentum, q̄ emolumentum, attulerunt ijs, qui eis fidem adhibuerunt. Nec enim omnes ob unam affectionē caput dolent: sed tum ipsae affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum singulatim propria existit. Vna etenim affectio est iuxta intemperiem simplicem citra humorum affluxum; alia iuxta humorum qualitatem uersatur; tertia, secundum eorum solam multitudinem accidit; quibus accedit quarta, quum transitus liquorum atq; uaporum ipsi humores obturant; ac praeterea quinta, dum in quibusdam capitis partibus, propter imbecillitatem, spiritus flatuosus innascitur. Est quum ob causam aliquam procatactica (cuiusmodi sunt ardor extrinsecus, aut refrigeratio, aut ebrietas, aut ictus) dolor capitis accidit. Vehementis similigitur capitis dolores fiunt, iuxta caliditatem & frigiditatem; maximè quum inaequales fuerint: moderati autem iuxta siccitatem; ad humiditatem uerò nullus consequitur dolor. Eodem modo quum ob redundantes humores, capitis dolor oritur, uehementior quidem, ob calidos & frigidos accidit: moderatior autem, ob exiccates citra calorem aut frigus. Humectantes uerò, penitus nullum dolorem inferunt, quantum ad qualitatem quidem ipsorum attinet: nam ob multitudinem sanè, instrumentarium partium morbos efficiunt: non tamen similariū particularum ullum aliquem: quū nimirum earū morbi in pura intemperie consistant. Ad haec, affectiones ob copiam humorum ortae, citra quidem obturationē

caput grauāt: cū obturatione uerò si quidē ea modera-
ta fuerit, moderatē dolorificæ fiunt: sin fortes, uehemen-
ter affligunt. Quòd si etiam mordacem qualitātē mul-
tudo humorum fortiaur, etiam iuxta hanc dolorem
augebit. Quòd uerò ad naturam affectarum particu-
larum pertinet, interdum quidem extra caluariam affe-
ctio fit: aliquando intra: & interdum quidem omnes
externas, aut internas partes infestat: interdum autem
non omnes, sed unam tantum speciem corporis: arteriā
nempe, aut uenam, aut neruum, aut membranā, aut
cutem, aut ipsum deniq; cerebrum. In uniuersum igit,
singularum affectionum curationis scopum, ratio nos
docet: materiæ uerò facultates experientia cōmōstrat.
Porrò aliquando sola intemperie calida ex insolatu la-
borat caput: aliquando cum ipsa intēperie accedit etiā
humorum affluxus: precipuē quum uniuersum corpus
laborat plethora, quæ fit ipsis quatuor humoribus ex
equo auctis: aut etiam sanguine solo. Nam quum alius
quispiam humor redundarit in corpore, non plethorā,
nec simpliciter plenitudinem, sed pituitæ, aut bilis fla-
uæ, aut atræ, tunc plenitudinem dicimus. Igitur eis qui
ex ardore caput dolent, cutis tactui aridior ad primū
contactum apparet: oculosq; rubros habēt, ac frigidis
tum perfusionibus, tum illitionibus, oblectantur. Prin-
cipio itaq; repulsoria curatione est utendum, ex refrige-
rantibus, astringentibusq; constante. Postea uerò mi-
tigatoria & cōcoctoria pharmaca, ad repulsoria misce-
re oportet. Deinde etiam ex discussorijs quippiam ad-
dendum, paulatim detractis pharmacis quæ repellūt.
Optima sunt autem censenda, quæ substantia renuiū
partium sunt prædita. Quapropter in principio quidē
melius est frigidissimū rosaceum perfundere, iuxta frō-
tem nempe, & tempora, & occiput: non tamen longē
inferius. Neq; enim facile exurit ea pars: neq; etiam,
citra noxam, refrigerantia sustinet, propterea q̄ isthic

Capitis doloris
discrimina, se-
cundum diffe-
rentiā affecta-
rū particularæ.

Plethorā fieri,
quatuor ex equo
humoribus au-
ctis: aut etiam
sanguine solo.

Doloris capi-
tis ab ardore
contracti, iudi-
cia, & curatio.

Occiput nec fa-
cile exuri, nec
citra noxā re-
frigerari, prin-
cipiū spinalis
medullæ quum
sit.

Xxx, x ij

Spinalē medul-
lam in sexagin-
ta nervos diutri-
bui.

Sincipitis re-
gionē esse ap-
tissimū ad trās-
mittēdas vires
medicaminum
applicandorū.
Rosaceū exu-
lis cōmodum,
qualiter cōfici
debeat.

Chamæmelino
oleo in quibus
sit vten dū cor-
poribus.

Refrigerandi
medicamenta
ratio.

Pergamus Ga-
leii patria.

Stupefaciētia,
et quę vehemē-
ter astringūt re-
frigerando, vi-
tāda in capitis
doloribus eē.

principiū medullæ spinalis existat, ad stipitis modū
in ramulos complures diuise, uidelicet in sexaginta (ut
existimo) nervos. At uerò regio capitis iuxta sinciput,
propter laxitatem coarticulationis ad coronalem sutu-
ram, & ob ossium tenuitatem & raritatem, facilè tum
caliditatem, tum frigiditatem omnium quæ adhibent
pharmacorum, intrò distribuit. Quare siue refrigerare
oporteat ex caliditate ardorem, siue calfacere frigidita-
tem, aptissimus est capitis iuxta sinciput locus. Rosa-
ceum autem ipsum, quo in exustis utemur, ex oleo cru-
do (quod omphacinum appellant) citra salis admistio-
nem, confici debet: nempe rosas quæ plurimis in eo ma-
ceratis. Sit autem rosaceum non uetus, sed eo ipso an-
no confectum. Proximum à rosaceo chamæmelinum
existit, quo utendum in ijs corporibus est, quibus in-
ducere uehementem frigiditatem ueremur: qualia sunt
fœminarum, eunuchorum, puerorumq; ac breuiter eo-
rum omnium, qui molli carne sunt præditi, albumq; co-
lorem sortiuntur. Refrigerabis autem quæcunq; adhi-
bere uoles, in aqua uehementer frigida collocata: quæ
si non adsit, niuem uasculo circumpones. Etenim fri-
gidorum fontium & niuis maxima Romę est ubertas,
quemadmodum apud nos in Pergamo. In regionibus
autem calidis, qualis Ægyptus est, ubi maxima fontium
frigidorum atq; niuis Penuria, sub dio rosaceum per
integram noctē exponi debet: eiq; semperului, aut por-
tulacæ, aut lactucę, aut psylli, aut polygoni succū inij-
cere oportet: sicuti & solani aliquando pa ululum, &
pampinorum uitis, & uuarum immaturarum. A papa-
ueris uerò & mandragoræ succo abstinendum, quum
non citra damnū refrigerent. Vitanda etiam sunt, quæ
cum refrigeratione manifestè astringūt: aut perexiguū
quid ad refrigerantia miscēdum, si quando necessitas
postulet. Propterea sanè & solani succū aut nunq; pe-
nitus, aut modicè certè, admiscemus: sic etiam & mali

punici, & mali cydonij, & mespili. Ad hanc tamē rem malorum punicorum acidorū succus præstantior est: magis enim refrigerat. Equidem aliquando cucurbite cremorem permiscui omphacio. Poterit etiam quis similiter seridis succo uti, necnon tum hortensis, tum sylvestris lactucæ. Quin & mororum non admodū maturorum succus est aptus ad refrigerandū. Si igitur calvus sit æger, aut breues habeat capillos, uberrimè refrigerari poterit: tum per iam dicta, tum per omnia illa quæ erysipelatis auxiliant. Qui ex frigore caput dolent, ijs facies decolor, minimeq; arefacta conspicitur: & frigidus neq; gaudent, neq; item iuuantur. Si igitur frigiditas ipsa sit recens, solum rutaceum oleum, si calidum affundatur sincipiti, perfectè hominem liberat. Si uerò uehemētiori calore sit opus, euphorbium oleo indatur, & pharmaca quæcunq; cōstant ex pipere. Inungenda autem est facies, ac tum aures, tum nares, precipuè irino, amaricino, & nardino unguētis: necnon foliatis, spicatisq; uocatis. At opobalsamum sæpe experti sumus ad nullam affectionem calore indigentē, euidenter opitulari. Sampsuchinum autem, laurinum, & serpyllinū cōmendo. Propinādum p̄terea ijs est uinū tenuium partium, & motus corporis præcipiendus, lauaq; calida: & quandoq; à raphano uomitus. In capitis autē inueteratis affectibus, necessarò pilos radimus, aut præsecamus ad cutim usq; ac rasis quidē, admouemus pharmaca emplastica: liquida uerò ijs, q̄ breuissimè habent capillos præsectos. Ac sanè medicamenta refrigerantia, ex ijs quæ erysipelata curant, sunt transferenda: calfacientia uerò, ex pharmacis calfacientibus conficiēda: quorum simplicissimum est ex euphorbio compositum. Sufficit autem uncia euphorbij unā, ad tres ceræ liquefactæ in olei libra una, cōmiscere. Atq; utendum quidem astrin genti oleo, ad affectiones quæ indigent calore, non est: sed aliquo tenuiū

Refrigerātium
sylua, qbus tu-
to vti in capi-
tis doloribus
possumus.

Doloris ca-
pitis orti a fri-
gore idicia, &
curatio.

Opobalsamū
ad effectiones
indigentes ca-
lore, nō magno
pere opitulari.

Dolorum capi-
tis inueterato-
rum curatio.

X x x x iij

Dolorum capi-
tis ab ebrieta-
te curatio.

partium, cuiusmodi Sabinum existit.

Quibus autem ob potionem calidiorum uinorum, ca-
put repletum uaporibus aut humoribus calidis (solent
etiam hi uel absq; uini potu, suapte natura ad caput ac-
tollī) dolore affligitur, iubendi n̄ sunt, si crudum adhuc
in eis uinum p̄maneat, ut hausta aqua tepida uomāt.
Quod si etiam post concoctionem caput doleant, re-
frigerantibus ac repellentibus est utendi: quae est ro-
faceum per se, & cū aceto, aut hederæ, & brassicæ cre-
more. Quin & ipsa brassicæ folia calida macerata, ca-
pitūq; circūposita, ac obligata, naturaliter ebrietati re-
sistunt. Cæterū somni quietisq; cura in primis habē-
da est: ubi uerò per totum diem quieuerint, ad uesperā
loti, cibis boni succi nutriendi sunt, non tamen calfaciē-
tibus. Sunt autem tales prisanæ succus, & sorbitio ex
alica, & panis ex aqua, & oua sorbilia absq; garo. Ad-
misceatur autem eis ex melle, uel ex sale condimentis
aromatum præparato, quantum sit satis ad suauitatē
saporis. Ex holeribus congruit illis lactuca, utpote bo-
ni succi atq; refrigeratoria: necnō brassica, ut q̄ uapo-
res resiccet: sic & ex leguminibus lens. Potu uerò om-
nino aqua utendum est. At quia nonnullis uentriculus
à frigidæ potu subuertitur, malum punicū ipsis super-
edēdum est, aut solum per se, aut cū alica flaccida cali-
da, p̄beq; cocta. Quin & mala Cestiana appellata in
urbe Roma, citra cocturam quidem, sunt austera. post
cocturam uerò, stomacho euadunt cōmoda. Coquen-
da autem sunt ad uaporem aquæ suspensa. Abstinen-
dum uerò à palmulis est, ut quæ ex proprietate dolorē
capitis excitent. Quod si moderatē iām habeant, &
aquā bibere nequeant, permittendus est eis potus ali-
cuius uini diluti et aquosi, quale est in Italia Sabinum:
in Asia Titacazenum. Quin & moderatē habētib;,
gallorum testiculi & alæ, & saxatiles pisces, mollesq;,
exhibendi sunt: necnon columbarum pulli. Hæc uerò

Cestiana mala

Palmulas ex
proprietate ex-
citare dolorem
capitis.

omnia, citra garum et uinū, in albis simplicibusq; co-
quantur iuribus, quæ ex aqua, oleo, anetho, ac modi-
co porri constāt: ad cocturæ finem, salis pauxillo ad-
iecto. Cæterū ante cibum quidem pluribus deam-
bulationibus est utendum: post acceptū uerò cibum,
breuibus, ac lentis. Oportet tamen nec multa edif-
se, nec statim post cibum sumptum inambulare, sed
post duas, aut tres, aut plures horas. Quòd si quan-
do à uaporibus aut humoribus in caput sublatis,
reliquiæ quædam supersint, in poris ipsis, meatibusq;
angustis impactæ, & ob id etiam perseueret
capitis dolor, non rosaceo, sed utendum primū cha-
mæmelino est, moderatè calido: postea uerò irino.
In balneo uerò caput calida perfundatur, nō modò
ut aliquid eorum quæ circa ipsum consistunt, discu-
tiatur, sed somni etiam conciliandi gratia. Quapro-
pter secundum etiam, aut tertium, ad uesperam, bal-
neum apparandum est: post quod exhibendæ lactu-
cæ ex aceto, cui pauxillum, aut omnino nihil gari ad-
ditum sit: uerū aqua affusa multa, ita ut acetū exæ-
quet, nisi acetum sit planè aquosum: quale utiq; illi
desyderant: quandoquidem quod acerrimum est,
aliquem calorem sortitur. Post hæc uerò postera die,
quæ magis caput calfaciant, administranda sunt: ita
ut ad irinum aliquando amaracinum unguentum,
aliquando nardinum addamus. At capitis do-
lor ob plagam cōspiciuam ortus, nihil est aliud q̃ in-
flammatio: quæ non ex plaga solū aut casu, sed absq;
manifesta etiam causa, iuxta omnes partes fieri ob
affluxum humorum consueuit. Si igitur plaga uul-
neris aut cōtusionis existat causa, plures scopi erunt
ad inuenienda præsidia. Vnus qui circa uulnus uer-
satur, quod, postea q̃ fuerit constrictum fibulis, glu-
tinantia & arcentia phlegmonem medicamenta po-
stulat. Secundus contusioni est intentus. Tertius, to-

Albi iuris cō-
positio.

Balneum con-
ciliat somnū.

Capitis dolor
ob plagam or-
tus, quos medē
di scopos lar-
giatur.

Dolor capitis
ex ictu ol cr.
tus, cur sepe ex
tendat per uni
uersum caput.

Capitis dolor
ex plaga, quan
do existat peri
ciculosus.

Meningem ce
rebri uulnera
tam congruti
nantia.

tus in doloribus est: qui interdum quidem in ipsis so
lis percussis partibus fiunt: plurimum autem ad ui
cinas etiā partes se extendunt. Etenim pericranium,
& eius cutis exterior, propriam continuāq; substan
tiam habent, per totum caput extensam: ob idq; sanē
contingit uniuersum caput dolore affici: præsertim si
ad perioftion membranam, quæ cranio est adhæ
rens, plaga ipsa penetret: cui medebimur diuidentes
pericranium membranam, subditumq; illi os raden
tes, utq; illic rursus concreascit caro, curantes. Quòd
si ob cōmercium illud quod per futuras perioftion
habet cum duro cerebri inuolucro, etiam intra calua
riam distribuatur phlegmone, non absq; periculo ta
lis dolor contingit. Contingit autem non rarò, ubi
quis tex sublimi cecidit, ut aliquid circa cerebrū, aut
membranas eius, rumpatur: quod ubi cōtigat, adhuc
amplius inualefcit ipse capitis dolor: affectioq; tota
ægrè curabilis redditur, & periculū maius, magisq;
præceps imminet. Optimum itaq; fuerit in his, nisi
ætas prohibeat, uitalis ue facultas appareat debilis,
curationem à uenæ sectione auspicari: & conuenien
tibus capitis irrigationibus subinde uti, oleo dulci
imbuentes lanam, capitiq; illam circumponentes.
Quòd si aut per ætatem, aut uires, non liceat sangui
nem ipsum detrahare, deiciēda alius per clysmum
est, tum ut eius excrementa uacuentur, tū multo ma
gis ut reuellantur humores ij, qui consueuerunt fer
ri ad affectas pticulas. Postea uerò auxilijs utemur
ad inflammationes congruentibus. Si igitur mem
brana cerebri uulnerata fuerit, egregiè ipsam cōglu
tinat (ut ait Archigenes) calaminthæ succus infusus,
& farina milij arida inspersa: deinde butyrum & ro
faceum, ac adeps fuillus infusus, uetusq; , omnia in
unum commixta, tepēfactaq; , & infusa. Hoc modo
affectos, à uino & cibis crassioribus abstinere oportet.

ter, maximè si correpti sint febris. Etenim affectio ipsa nobis auxilia indicat: quantitatem autem singulorum, particularemque materierum differentiam, tum affecta particula, tum ægri temperamentum com-
monstrat: necnon uitalis facultas: deinde ætas: ambientisque nos aeris temperies, iuxta regiones, anni-
tempora, & prædominantem anni constitutionem
euarians. Porro ad phreniticos, quandoquidem omnia quæ extra caluariam circa cutem atque ipsum pericranium consistunt, immunia ab affectu sunt, rectè, mea quidem sententia, alijs pharmacis acetum
miscuerunt ueteres. Siquidem ad affectiones in profundo delitescentes, pharmaca diuersa ab iis, quæ affectibus in superficie hærentibus congruunt, debent
administrari. Exoluitur namque omnium ipsorum uis in transitu per profundum: & ob id ad propria affectioni auxilia, aliquando contrariæ, & nocentis facultatis pharmaca temperamus. Quippe acetum ex se, quum nec mitigandi, nec laxandi uim habeat, præter rationem miscetur auxilijs ijs, quæ ad dolentem inflammationem administrantur. Quia uerò per sinciput pharmacum penetrare uolumus, ob id sanè ali-
quod eorum, quæ in profundum deducunt, miscemus: interdum quidem frigida facultate, sed tenuium partium, præditum: cuiusmodi acetum existit: interdum uerò calida, quale est euphorbium. Quocirca, dum crassæ membranæ cerebri nudè instillamus rosaceum (quod fieri solet, ubi ossiculum aliquod est exemptum) solum ipsum leniter tepesactum infundimus. Quum uerò citra denudationem, integra existente caluaria, rosaceum cupimus ut per sinciput ad membranam cerebri penetret, acetum illi, ut ipsum perducatur eò, temperamus: cuius uehemens facultas, tum per uiarum transitum, tum per rosacei miscellam, exoluitur. Iam uerò, inflammationes quæ in ca-

Affectiones fixæ in profundo diuersa pharmaca ab iis, quæ hærent in superficie, desiderant.

Acetum cum miscetur rosaceo ad phrenitidē.

Fractio cranio, commode instillari rosaceum tepens in crassam meningē. Acetum quando sit rosaceo miscendum ad affectiones capitis.

Acetum rosa-
ceo mistū, qui-
bus proſit, &
quib⁹ obſit in-
flāmationibus.

Myrrhæ odo-
rem conciliare
dolorem capi-
tis.

Opio quando
ad capitis do-
lorē uī debeat
mus.

Hominem in
multis halluci-
nari.

Capitis dolo-
ris ob uentricu-
li cōforti ob-
orti, & indicia,
& curatio.

pitis cute, aut etiam in pericranio consistunt, si qui-
dem citra uehementem dolorem accidunt, per mo-
dici aceti ad rosaceum mitionem iuuari possunt: le-
dentur autem, si & magnæ fuerint, & dolorem uehe-
mentem induxerint. Adhæc, rosaceum cum aceto, in-
cipientibus: in uigore uerò consistentibus, rosaceum
solum administramus: quemadmodum etiam in in-
duratis, absynthium ei atq; pulegiū miscemus: nam
quæ absq; duritie iam decrescunt inflammationes,
pharmaca laxatā desyderāt. Porro ad dolores capi-
tis, in quibus exiccare est animus, commodissimum
cataplasma ex lolij farina & adipe anserino confici-
tur. Sciendum autem est, myrrhæ odorem plurimis
etiam sanis dolorem capitis conciliare: unde eos ip-
sos qui iam caput dolent, non parum offender. Opio
autem eo tantum tempore uti cogimur, dum præ do-
loris uehementia æger de uita periclitatur. Extinguit
siquidem sensus, maximeq; solidas partes offendit,
adeò ut postea correctione sit opus. Quum autē dif-
ficile sit, ut qui homo est, non in multis hallucinetur,
quædam uidelicet penitus ignorando: quædam ma-
lè iudicando: quædam negligentius scriptis traden-
do: mirum cuiquam esse non debet, si aliquādo deli-
quisse comperiat. Archigenes, in ijs quæ de curatio-
ne capitis doloris conscripserit.

De capitis dolore à uentriculo exorti.

Nonnulli autē uel si modicus humor in eorum
uentriculo colligat, & præsertim circa os eius,
statim caput dolent: atq; ob id, si diutius à cibo absti-
neant, offenduntur. Augetur quippe esuriētibus eius-
modi humorum malicia. Quum igitur huiusmodi af-
fectus capiti proprii non sint, sed ab humorum no-
xijs uaporibus à uentriculo uolitantibus exoriatur,
quemadmodum etiam ob id genus succos, alijs suf-
fusorum symptomata eueniunt: capiti adhibenda re-

media non sunt: sed quibus celerrimè qui in uentre con-
tristant succi, uacuandi. Vacuantur autem in ijs qui
ad uomitum sunt procliues, facilè ab aque potu: egrè
uerò uomentibus, difficilius. His igitur conabimur
quod primum cibum boni succi, ac uentriculo commo-
dum exhibere, si res ita ferat, à balneo: si nō, ante bal-
neum tantum cibi offeremus, ut non lædantur inde
postea lauantes. A cœna autem modicum absinthij
in potu dabimus: postridie uerò, in posterumquē, si-
mitem uictus rationem illis instituemus, donec exa-
ctissimè concoquant. Quo tempore iam licebit illis
modicum panis præbere circa tertiam aut quartam
horam, aut citius, aut tardius: sic tamen, ut satis am-
plum spatium ad consuetam balnei horam intersit.
Quod si qui panem absque obsonio edere nequeant,
his oliuas, aut palmulas, aut uuas, aut tale quippiam
addemus, iuxta naturæ cuiusque proprietatem. Cæte-
rùm ad prauorum in uentre colligendam succorum
copiam, plurimum conducit tum imbecillitas conco-
ctricis potentia: tum oris uentriculi infirmitas: quem-
admodum etiam ad capitis hinc dolores gignēdos,
tum facilitas sensus, tum caput ad eiusmodi humo-
rum uapores suscipiendos promptum: sicuti etiam
& in nonnullis oculi. Qui igitur propter acres humo-
res caput dolent, mordacem dolorem, non tēsum,
percipiunt: at fames in tensionibus commoda est:
contraria autem iis, qui mordaces humores college-
runt in ore uentriculi. Quum itaque hic mordax hu-
mor fuerit amarus, pallida & flaua bilis uocatur: que
ob leuitatem insitam sursum fertur, ad os uentriculi:
quum uerò pituitosus, aut acidus, aut salsus fuerit, ma-
gis in totius uentris spatio continetur: ac fuerit sanè
optimi, si in fundo uentris is cōtineatur. Omnium
autem est pessima constitutio, dum uitiosi humores,
uentris tunicis ineluibiliter sunt defixi, & imbibiti:

Vitiosis succis
in uentriculo
colligēdis, que
conferant.

Famem aduer-
sari iis qui mor-
daces humo-
res collegerūt
in ore uentri-
culi.

Hieræ picræ,
optimi medica-
minis ad ex-
purgandos hu-
mores tunicis
uentriculi infi-
xos, descriptio.
Crocī odorem
ferire caput.

Hiera picra q-
bus congruat
affectibus.

Dolor unde
exoriatur.
Cōtinuitatem
quæ soluant.

Phlegmone sit
a sanguine.
Erysipelas ori-
tur a flaua bi-
le.

quibus educendis optimum remedium est hiera pi-
cea, cuius talis fit compositio. Aloes, drach. C.
cinnamomi, spicæ nardi, xylobalsami, Chia masti-
ches, asari, & croci, sing. drach. vj. Præstantius au-
tem est pharmacum, ubi minus de aloë additur: mi-
nusq; etiam ex croco: quando quidem nonnulli ex usu
ipsius oblæduntur capite: id quod sæpe ex solo eius
odore perpetimur, Quare optima erit ea compo-
sitiō, quæ aloes drach. xc. croci quinas receperit: qua sa-
nè ipse utor. Præstat etiam pro asaro carpesiū conij-
cere. Propinatur ad summum ex pharmaco drach-
ma una cum aquæ calidæ cyathis tribus: minimum
uerò, dimidium eius præbetur. Confert autem hoc
pharmacum, ijs qui suffusorum afficiuntur sympto-
matis, & mulieribus quæ non pro dignitate purgan-
tur. Quemadmodum autem in uentris & intestino-
rum regionibus ob caloris quidem inopiam, inter-
dum ex cibo ac potu uapor flatulentus producitur:
propter imbecillitatem uerò facultatis comprehensi-
uæ, adedò inflantur atq; replentur ea organa, ut ipsius
quidem repletionis ratione tendantur: ob rēfionem
autem impense doleant: sic etiam in partibus quæ ad
caput pertinent, possunt hæc eadem contingere. Et
enim ob dissolutionem continuitatis partium dissi-
milarium, dolor oritur. Dissoluunt autem ipsam, ero-
dentia, dissecantia, distendentia, uehementer calfa-
cientia, atq; refrigerantia. Si igitur erosionis, aut pun-
ctionis sensum percipiāt ægri, acredo uel humorum,
uel flatus, causa putāda est. Si uerò citra morsum ten-
dantur, tensio ipsa uel ab spiritu flatulento, uel ab hu-
moris colluuiē, oboritur: quo in genere phlegmone
erysipelasq; consistit: phlegmone quidem, ubi pluri-
mum sanguinis affectam particulam occupat: erysi-
pelas uerò, ubi biliosus fuerit is humor. Quod si ab
utrisq; redundantibus aliqua pars repleatur, aut in-

inflammatio erysipelatosa, aut erysipelas inflammatum talis affectio erit. Maxime itaque artis curandi coniectura in affectionum cognitione consistit: quæ ubi inuentæ fuerint, curationem non coniecturaliter, sed scientificè indicant: cum hoc quod etiam cognoscere datur, quæ ægrè aliquæ affectiones medelis cedant: in quibus ut utamur semper remedijs ab indicatione perfectis, rationi est consonum: tamen si nihil iuuare in principio uideantur. Aliquando enim adeo uehementer in angustijs meatuum flatus uaporosus, atque eo adhuc magis uiscidus crassus uel humor, impingitur, ut multo tempore ad curationem sit opus. Ac sanè quæ sic infarta sunt, attenuare oportet, dilatareque meatus, per quos excernantur, habita simul prouidentia, ne quid aliud amplius influat: utque pars affecta corroboretur, ne ipsa etiam flatulentum gignat spiritum. Qui igitur primi ad eiusmodi affectiones pharmaca composuerunt, merito habuerunt opus materia uaria: si quidem influentem substantiam, siue humor, siue uapor ea sit, repellere necessarium existit: impactam uero concoquere, & attenuare, eandemque ipsam discutere: ac nihilo minus, immo longè magis, affectæ parti robur inducere, ne uidelicet quod influit, suscipiat: utque attenuatum excernat, impactumque concoquat, atque subtilius reddat. Ergo in proposita dispositione, si dolorificus calor unà cum spiritu flatulento præpolleat, in principio quidè repulsoria curatione est utendum, quæ ex facultate refrigerante constat. Quod ubi factum moderatè est, ex mitigatorijs & concoctorijs quippiam ad repulsoria miscere oportet: dein discussoria addenda ita, ut paulatim repulsoria detrahamus, donec pharmacum ipsum plurimum quidem digerens attenuatoriumque reddatur: minus autem concoctorium & mitigatorium: minimum uero repulsorium. Portulaca igitur refrigerantis & aquosæ substantiæ

Tumores cōpositi.

Coniectura artis medicæ, in affectuum cognitione consistit.

Præsidia optima, cur sepe in principijs nihil iuuare uideantur.

Impacta eē concoquenda, attenuanda, discutiendaque.

Aceti facultas. est: minus ea polygonum: in solano tantum crassæ & terreæ est admistum, quantum altriccionis. Acetum repulso-riam simul & attenuatoriam, immo & discus-
sori-
am facultatem sortitur: utpote quod secundum tem-
periem, frigiditate quadam tenuium partium prepol-
leat, non secus quam exquisitè serenus Boreas. Rosaceum
porro, repulso-riæ, concoctricis, mitigatricis, ac denique
discussori-
æ facultatis est princeps. Ut ergo sermonem
iam habitum reperam, neque in biliosis causis iniun-
genda est inedia; neque utendum uenæ sectione, si
puer aut senex sit æger, aut uirium imbecillitas adsit.
Licebit autem uti ualidis clysmis, quæ maximè hi pos-
sint reuellere à capite, uacuareque non modò quæ cir-
ca uentrem & mesenterium consistunt, sed etiam quæ
in finis hepatis hærent. Commendat autem Archi-
genes irrigationes ex ruta, oleo, & aceto intrita, ad do-
lores capitis: sicuti & succum baccarum lauri cum ace-
to, & ruta. Sciendum uerò est aridam rutam esse mul-
to acriorem, & calidiorem uiridi. Qui caput ob
humorem biliosum dolent, iis signa similia sunt eis
quæ ab ardore proficiuntur. Accedit his maior mor-
sus, & faciei pallor, & nonnunquam oris amaritudo.
Aetati autem uigoris, & temperaturis calidiori-
bus, & uitæ sollicitæ, & iis qui flauam bilem accumu-
lant, hæc affectio præcipuè contingere solet. Itaque bal-
nea temperata, & unctiones, & potus dilutus, eis
exhibenda sunt, omnisque uictus ratio tum * humidior,
tum boni succi, constituenda. Euacuandus item bi-
liosus humor per absinthij cremorè est, aut per aloë,
& per ipsam picram antidotum, per se datâ, aut mo-
dico scamoni adiecto; uel per catapotia ex aloë con-
fecta. Illinenda frons pastillo croceo, aut appellato
Trigono, aut aliquo alio his simili. Si cum uni-
uerso corpore caput consortij lege afficiatur, prospici-
endum illi est. Igitur si plenitudo humorum, ac ma-
ximè

**Boreæ frigidi-
tatem, esse te-
nuium partium.
Rosacei facul-
tas.**

**Inedia non esse
utendum in cau-
sis biliosis.**

**Vena in qui-
bus non sit se-
canda.**

**Clysmos for-
tes ualide re-
uellere a capi-
te.**

**Capitis dolen-
tis remedia.**

**Capitis dolo-
ris a bile orti,
indicia, & cura
tio.**

**Bilis quibus me-
dicamentis pur-
ganda.**

ximè circa uenas constiterit, tundemus uenam. Si uerò magis qualitas inualuerit, utemur purgati pharmaco. Si caput uni tantum parti condoleat, ut hepatis, uentri, aut ipsius ori, illis in primis opitulabimur: nepe calida in ipsis præpollente intemperie, panem ex diluto uino exhibentes, sorbitionesq; ex alica: ac foris etiam utentes irrigationibus, quæ tum refrigerent, tum firmitudinem addant. At si ob uiscidos & crassos in uentriculo contentos humores caput quis doleat, etiam hos exturbabimus, acetum mulsum in potu præbendo. Ex hyssopo etiã origanoq; potionibus, & quæ his adhuc ualentiores sunt, magisq; incidendi ui præditæ, utemur: necnon à radiculis uomitu, irrigationibusq; & cataplasmatis calidioribus.

In doloribus autem capitis qui ab initio inuaserunt cum febris, uena secanda est, post primam aut secundam remissionem, nisi quid impediatur: & præsertim in corporibus bonæ habitudinis, & multo sanguine redundantibus. Quod si serius post septimam diem dolor ipse prehenderit, alio prius abundè per clysterem soluta, cucurbitulæ ad occiput, aut ceruicem, sunt affigendæ: caputq; irrigationibus ex oleo fouendum: rosaceo quidem, & cum modico aceto, in calidioribus, & tempore æstiuo; chamæmelino uerò, in frigidioribus habitudinibus, ac hyeme: quinta parte aceti illi adiecta. Illinenda frons in frigidioribus quidem, est ex cyphi: ex crocomagmate aut, in calidioribus. Porro uitandæ sunt in oibus capitis affectionibus ea quæ subduntur: nepe viticis semine, absynthij succus, lac in potu, glâdes quercinæ in cibo, oliuæ nigræ, arbuti fructus, eruum, quod etiam exoluit articulos: amplius autem offendunt myrrha, thus, hederæ cacumina. Mentem etiam perturbant lentisci fructus, crocus, paucedanum, cyclaminus sicca cum uino epota. Styra modicus quidem potatus, tristitiam uultus discutit: multus uerò, somnos turbat.

Capitis dolorum cum febre ab initio affligenti, curatio.

Cucurbitulæ quando affigendæ occipiti.

Capitis in omni dolore quæ sint uitanda.

Crocus perturbat mentem.

Styracis facultas.

lentos conciliat.

De Cephalæa.

Cephalæa.
descriptio,Cephalæa ma
gis deicit facul
tatē, q̄ cepha
lalgia.
Cephalæa varia
symptomata a
diuersis causis
producta,Dolor capitis
intra caluariā
situs. cur exten
datur ad oculo
rum vsq̄ radi
ces.

Cephalæa inueteratus & ægrè cedens capitis do
lor uocat, qui ex leui occasione maximas exacer
bationes habet: adeò ut neq; strepitum, neq; uoces ue
hementiores, neq; lumen splendens, neq; uini potum,
neq; odora menta caput replentia, ægri perferre pos
sint: neq; item motum: sed in quiete & tenebris decū
bere ob doloris magnitudinem uelint. Etenim tanquā
à malleo percuti sibi uidentur. Sunt qui ueluti contun
di ac distendi sibi ea quæ circa caput sunt, sentiunt: nō
paucis uerò usq; ad oculorum radices ipse dolor pro
greditur. Habet autem hæc affectio aliquādo quidem
continuos dolores: aliquando uerò exacerbationes, &
interualla. Manifestū igitur est, hanc affectionem con
similem aptitudinem capitis, ut oblædatur facile, habe
re, quemadmodum in cephalalgia. Verūm ad maiore
imbecillitatem deueniunt in hac affectæ particulæ ca
pitis. Ac sanè quidam ex sic affectis, cerebri inuolucra
dolitant: quidam pericranium dūtaxat. Dolores igitur
cum grauitate, multitudinem humorum significant: cū
mordacitate uerò, aut humorū, aut uaporum acredine:
ut cum pulsu, obortam inflammationem: at cū tensione,
si quidem citra grauitatem & pulsum accidat, spiritus
tenuis ac flatulenti multitudinem indicant: cum pulsu
uerò, membranosi corporis inflammationem: at si cū
grauitate distentio accidat, humorū multitudinem in
tra membranas contētā arguit. Rursus, dolores qui
dem in superficie herentes, pericranei affectionē signi
ficant: qui uerò in profundo sunt, cerebri inuolucrorū.
Quibuscunq; autē affectio intra caluariam est, ijs usq;
ad oculorum radices dolor extendit, propterea q̄ oculo
rum tunicæ ex cerebri inuolucris suam ducunt origi
nem. Si uerò putrefactus humor calidior fiat, cū feбри
capitis dolor inuadit. Febricitant autē omnino, & qui

dolent propter inflammationem. Si igitur totius corporis plenitudo sit in causa doloris, sanabis ipsum, corpore uniuerso uacuato. Si uero imbecillum existēs caput, sublatos ad se humores ac uapores susceperit, materiā reuellere oportet in totum corpus, atq; ita mederi particulæ. Reuellemus itaq; & clysmis, & uinculis extremorum, & pluribus ifernarum partium frictionibus, interdū etiam sanguinis ex cubito detractio. Quod si amplius redundare sanguis uideatur, etiam reserata in naribus uena, & sanguine, quantum par sit, vacuato. Dein hieram dabimus exacurā: posteaq; apophlegmatismis elicientibus pituitam, & medicamentis quæ naribus inferuntur, utemur, qualia sunt quæ ex elaterio, & cyclamino cum lacte & porro apparantur. Caput autem curabis, quando quidē reuulsorij uti oportet, per repulsorias irrigationes. Cæterum post totius corporis euacuationem, uteris caput uacuātibus: dein ijs quæ firmitudinem addant. Repellit igitur immaturum oleum, rosaceumq; per se, & cum aceto, & expaupaueris capitulis, & oleæ teneris germinibus, & hederæ cacuminibus, & menta uiridi præparatum. Applicentur autem remedia tepida quidem, ubi frigidior & crudior multitudo humorū extiterit: frigida uerò, ubi calidior, biliosiorq;. Digerit autem oleum dulcis simū calidum, & magis inueteratum, itemq; sicyonium. Si uerò cras sior sit copia humorum, spondylium, aut serpyllum, aut pulegij comam, aut calaminthen, aut mentham, oleo incoquens, multitudinem euacuabis. Eadē hæc parti etiam firmitudinem addunt, quapropter usq; ad perfectam curationem ipsis utendum est. Omnium porrò longè maximè discutit perfectè corroborat uerbenaca recta, oleo incocta. Coniicienda etiam ad eam crocodiliadis præsertim iuxta aquas nascentis, radix. Maximè etiam conferunt sub hydrijs aselli nascentes, si oleo incoquantur. Aduerte autem, capitum papaue-

Reuellēdi a capite modi diuersi.

Venam reseratam in naribus conferre ad dolorem capitis. Errhina.

Caput esse uacuandū post totius corporis euacuationem. Repellentia.

Digerentia.

Verbenacæ rectæ facultas. Ascelli.

Yyyy ij

Papaueris ca-
pitibus quādo
fit nobis vten-
dum.

Sal est ad capi-
tis fomēta inc-
ptum.

Perseæ fructū
in Persis letalē
ēē in Ægypto
autē innocuū.

Cucurbitulis i
affectibus capi-
tis quādo vte-
dum.

Cohibitio spi-
ritus.

Sternutatoriū
ab Asclepiade
scriptum.

**Apophlegma-
tismus** Ascle-
piadis.

ris usum, tempestiuum esse incipiente affectione: nocere autem, si ijs in dolore inueterato utantur. Iuuant uero non instrenue fomenta tum ex semine lini & rosaceo; tum etiam confecta ex milio: nam quæ ex sale fiunt, ob grauitatem, capiti negotium facescunt. Archigenes inter cataplasmata uaria, uiticis semen, perseæ uiridis folia, & myrrhā æquis partiōibus mista, excepta q; Ægyptio unguento, fronti admouere præcipit. Cæterum in sola Alexandria ipse Perseam arborem uidi: cuius fructum in Persis quidem letalem esse; in Ægypto autem innocuum, sunt qui contendunt. Porro sanguinis à locis affectis detractiones conuenire in affectibus inueteratis, non Archigenes modo, sed omnes ferè Medici consentiunt. Verum cucurbitæ occipiti affixæ, ex reuulsiōis auxilijs sunt, quū humores ad oculos, aut ad anteriorem capitis partem ferri consuetos, auertere properamus. Iubet autē Archigenes ut sternutatorijs quatiamus caput, fasciola q; circumposita collo, spiritu cohibitionem moliamur. Iam uero, ad affectiones frigidas inueteratas, eadem medicamenta ex thapsia & sinapi soleo adhibere: minimè autē ad calidas. At chamæmeli (quā anthemidē uocāt) florem quidē, olfactu auxiliari dolenti capiti, ait Archigenes; folia autem nocere. Sternutatorium ab Asclepiade scriptum. Veratri albi, rad. cucumeris syluestris, struthij, sing. partes. ij. castorij, acori, nitri rubei, euphorbij, cumini Aethiopici, sing. partem. j. trita insufflato. Medicamen ab eodem traditum, quod mansum caput purgat. Piperis albi, origani, staphidis syluestris, cassiæ, sing. drach. ij. excipiantur passularum exacinarum, aut caricarum carne, & mādenda exhibeantur. Cæterum non statim à principio efficacissima adhibere conuenit, sed à debilioribus auspicari. Porro fortia pharmaca, quibus ad mouēda sternutamenta utimur, mitigatoriorum admistione lenita, moderata sūt. Ob id quædam ipsorum muliebri lacte

MED. SEC. LOC. LIB. II. 341

fecēti & aqua diluo: post hoc, oleo dulci: dein betæ succo: & anagallidis quæ florem cœruleum habet, itidem succo: atq; ita sensim in usu eorum progredior, donec postremum etiam per opobalsamū talia dissoluo. Ego autem melanthium soleo infundere naribus: aliquando quidem aceto acri præmaceratum: aliquando oleo ueteri intritum. Interim uerò dum æger errhinis utitur, habeat os aqua plenum.

Errhina quib; leniri debeant liquoribus.

Os aqua replē dum esse, dum quis errhinis utitur.

De Hemicrania.

Hemicrania uerò affectio dolorifica est, dimidiam tantum capitis partem infestans: interdum quidē dextram: interdum autem sinistram: quæ futura extensa secundum illius longitudinem, terminatur. Vt plurimum autem per circuitus exacerbat, influxu uaporum, aut humorum, causam dolori suggerente. Quidā igitur ipsorum circa temporum musculos uehementer dolitant: quidā dolorem longē ułterius progrediētem habent. Sunt qui adeò uehementer cruciētur, ut ne manus quidem contactum facillē ferant: in quibus palā est, pericranium affectum esse, neq; eius cutem omnino immunem ab affectione existere. Rationi igitur cōsentaneum est, uaporum, aut humorum, aut utrorūq; influxum, aut à cerebro & illius inuolueris, aut ab uniuerso corpore illuc trāsmitti. Quapropter ubi quis hemicraniam curare aggreditur, prius quali purgatione, aut uenæ sectione æger indigeat, consideret: atq; ita deinde ad capitis auxilia progrediendo, tum per digitos suæ manus, tum per linteū, dimidiam frontis partem, & eam maximē quæ circa temporis musculū est, confricando excalfaciat: id quod ante exacerbationis tempus faciundum est. Post exacerbationē uerò, pharmacis hemicranicis dictis utendum: si quidem multa caliditas in doloribus percipiatur, ijs quæ refrigerans quippiam habet: citra uerò hanc, eis quæ * sufficiēter excalfaciūt. Vtriscq; tamen aliquid ex ijs quæ robur &

Hemicranie descriptio.

Hemicranie causæ.

Hemicranie ratio.

Yyyy iñ

Hemicranis i-
ueteratis reme-
dium,

Euphorbiū re-
cens quidē, esse
candidius; pal-
lidius autē in-
ueteratum.

Pergamus pa-
tria Galeni.

Hemicranis fri-
gidę quę opitu-
lentur.

firmitudinem addūt, misceatur, quod astringentem ui-
delicet facultatem sortiatur. Porro ex meis præcepto-
ribus quidam ad hemicranias inueteratas utebatur pi-
peris albi, & crocomagmatis singulorū drachmis dua-
bus; mistis cū euphorbi drachma dimidia. Quum au-
tem cito facultas euphorbi exoluatur, in huiuscemodi
sanē medicamentis non est utendum ueteri. Est autem
candidius, quod recens est: nam quod inueteratū exi-
stet, fluiorem aut pallidiorem sibi colorem contrahit.
Similiter etiam & columbarum turricularum, sibiq;
uictum quærentiū, stercoris, & atramēti scriptorij, li-
cebit addere utriusq; dimidiam drachmam: ex ipsisq;
omnibus aceto acerrimo dilutis, conficere medicamē
hemicraniæ sanandæ idoneum. Ad hanc autem rem,
Pergamenum nostrū atramentū multo est præstātius.

Aliud pharmacum ad hemicraniam, & omnem in-
ueteratam capitis affectionem summē utile. Croci
drach. xv. chalcāthi, drach. x. aluminis scisilis, drach.
xij. myrrhæ, opij, omphacij, sing. drach. iij. gūmi, drac.
xv. omnibus tritis vinum Phalernum adiice, et rursus
tanq̃ collyriū tere, deindeq; in pastillos redige. Postea
uerō ex posca dilutis utere. Sæpe simpliciter euphorbi
illitione misti cum oleo & cera, sum usus. Sufficit au-
tem ad libram olei cuiuspiam tenuis, ceræ quadrantē
inijcere, & euphorbi vnciam vnam: quo quidem me-
dicamine vtendum in ea tantū hemicrania est,

quæ à frigidis causis oritur. Iuuat etiam hos

si oleum tepidum instilletur in aurem:

euphorbi vncia, cum libra olei
prius temperata.


GALENI PERGA

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum Loca Liber Tertius.

De affectibus aurium.



AURIVM dolores nonnulli quidē fiunt ex frigiditate; nonnulli ob inflā-
mationem, uel cutis meatū auris am-
biētis, uel etiam nerui auditorij. Qua
uerò ratione inflammatio ipsa partes
inflammatas distendens, dolorē exci-
tat, eadem flatulentus spiritus, transitum non habens,
dolore cruciat. Consimilis etiam fit dolor à serosis hu-
moribus * in toto corpore genitis, ei qui ex mordaciū
humorum forinsecus aduenientium illapsu contingit.

Dolores igitur à sola ortos frigiditate, calfacientia
q̄ celerrimè curant. In quem usum solent nonnulli ru-
stici exenteratas capras oleo replere, & in feruenti cine-
re modicè calfacere, atq; ita auribus ipsum infundere.
Alij non capras modò, sed allium etiam oleo frigentes
postea ipsum instillant auribus. Ego uerò euphorbio
omnino modico, ad multū uetus oleum admisto utor,
ueluti etiam pipere exquisitissimè trito. Prodest etiam
amaracinū oleum ipsis infundi, & optimam nardum.
Quòd si aliquod oleum tenuium partium, in quo rutā
præcoxeris, auri infundas, magnopere iuueris. Magni-
ficè autem eos mitigat oui candidum, quo etiam ad lip-
pitudines utimur: itemq; lac muliebre. Plurimum iuuā-
tur item, ex adipe anserino, uulpinoq; infundi tamen
omnia debent mediocriter calida.

At si inflammatio adsit, nardinum unguentū, cum phar-
maco appellato Basilico cōmodissimè infunditur. Por-
rò medicamen Basilicon, alio nomine dicit tetraphar-
macum. Est etiam & Cōmagenum perutile, & ex adi-

Dolores auris
quæ causæ ex-
citare possint.

Doloris auris
a frigidi-ate
orti remedia.

Aurium inflā-
matarum cura
tio.
Basilicon phar-
macum.
Tetrapharcū.

Yyyy iiij

Opium quibus
misceri debeat
ad inflammas
aures.

Sapa ex musto
dolorē sedat.
Dolore affligē
te, præstat om-
nino nō tange
re auditorium
meatum.

Rosacei opti-
mi compositio

Doloris aurium
a flatulento spiri-
tu, aut a crassis
humoribus ex-
citati, curatio.

Aristolochia
triplex.

pibus pharmacum. Cogente uerò dolore, necessum est etiam his quæ sensum stupefaciant, uti. Miscetur autem opium muliebri lacti, & oui candido, quæ ipsa per se, sæpe aurium inflammationibus contulerunt. Miscetur etiam & castorio opium; uerum multo ante usum tempore, præparatum id esse oportet: & miscetur quidem, in uehementissimis doloribus, pari in minoribus autem duplo. Liqueor quo hæc diluatur, sit sapa ex musto: multo namque magis hæc, quam dulcia uina, dolorem sedat. Verum ego nullum pharmacum dolore uexatis infundo, neque etiam per lanam instillo, nimirum experientia edoctus, quod præstet neque omnino contingere doloris tempore auditorium meatum. At remisso dolore, per auriculare specillum, obuolutum lana mollissima, partem dolentem foueo: pharmacumque inijcio modicè tepescitum in aurisuforio specillo: postea uerò forinsecus tum orificio auditorij meatus, tum uniuersæ auri, mollem lanam impono. Iam quæ ex fomentis crassa & spissa fuerint, cuiusmodi sunt spicata & foliata unguenta, diluenda sunt ungento nardino; uel (si æstas sit, & caloris sensus ægrum in aure inflammas infestet) rosaceo, uel amygdalino. Conficitur bonum rosaceum ex oleo immaturo, salisque; experte, in quo plurimæ rosæ sint maceratae.

Si uerò flatulentum spiritum, aut humorem crassum & uiscidum, qui transitum non habeat, inclusum esse coniecero, etiam ex pharmacis liberantibus ab obstructione, quippiam admisce. Porro frigiditate antegressa, spiritus flatulentus colligitur: grauitate uerò capitis, cibisque; pituitosis & mali succi, frigidi & crassi humores: quibus si accedat frigiditas, dolores contingunt. In his igitur spuma nitri, & nitrum ipsum molle, eiusmodique; aphrolitrum, & oleum amygdalinum, rationabiliter in pharmaca auricularia miscentur. Ex hoc genere est utrumque ueratrum, & struthium, & amygdalæ amaræ, & ex tribus aristolochiis, quæcunque fuerint ad

MED. SEC. LOCA, LIB. III. 345

manum, & iris Illyrica. Inijcies aut & cinnamomum si habueris, aut, si id non habeatur, casiam, tum eam quæ Zigit, tum quæ Motos uocatur: ac præterea Carpesium. Aurium etiā meatus ab obstructione liberāt, quæ lapides in renibus atterunt: atq; omnia breuiter, quæ tenuium partium substantiam absq; mordacitate sortiuntur. Ex quorum numero est etiam cucumeris syluestris radix, itemq; bryonia, & ari, & dracunculi, & cetaureæ, & polii, & omnino amarorum omnium. Rursus, moderatę aurium inflammationes, & nō pulsatiles, rosaceo & aceto simul temperatis, tepesactisq;, atq; infusis curantur. Glaucium etiam ex aceto in cote medica tritum, doloribus à modica inflammatione ortis opitulatur. Prestat autem pastillum ex glaucio, multæ sanè utilitatis pharmacum, prius præparatum habere: qui fit ex glaucio probè cum aqua pluuiali trito, deinq; in pastillū coacto, exiccatoq;. Licebit uerò decimam quintam gummi ad glaucium portionem addere, ut melius compingi in pastillum possit. Quin & collyria ex glaucio eodem modo cum aceto trita, eis prosunt, auribus instillata: atq; his nihil minus collyria ex croco. Ulcera aurium recentia, tum glaucium solum cum aceto tritum curat: tum collyria ex eo omnia, & collyria ex croco & ex rosīs cōfecta: quemadmodum etiam quod Nili dicitur. Curat item ea Damocratis collyriū ex myrrha. Quæ uerò pure manant citra dolorem, atq; id moderatè patiuntur, iisdem medicamentis curantur. At quæ fortiter affliguntur, per eiusmodi qualis est pastillus Andronis, & qui ad Musam refert, sapa, modicoq; aceto dilutus. Quod si hæc ab ipso morbo uincantur, scoria ferri ad plurimos dies in sole ex acerrimo aceto contrita, læuigataq;, est in trepidè utendum. Huiusmodi etiā ulcera pastillo meo, ex charta combusta ipse aliquando curauī. Porro per papaueris succum mitigantur aurium dolores: haud

Casia duplex.

Aurium meatus obstructos quæ referent.

Aurium moderate inflamationes rosaceo & aceto simul temperatis curantur.

Pastilli ex glaucio, ad inflamas aures.

Aurium ulcerarū remedia.

Aurium purulentarum curatio.

Pastillus ex charta combusta.

Papaueris succus aurium dolores mitigat: affectionem autem non sanat, nisi ex acciden- ti quodam.

item affectiones iuuantur: nisi fortè ex accidenti quis eas iuuari dixerit, q̃ nimirum sedato dolore, atq; inde somno sequuto, natura ipsa affectus dolorem gignent, res concoquat. Per aurium autem inflammationes, galinaceus atq; anserinus adeps, si quidem euacuatum corpus inuenerint, & humorem, qui inflammationem excitat, non amplius influentem, dolorem leniunt, affectioni q; auxiliantur. Si uerò humore adhuc fluente adhibeantur, affectioni quidem nihil opitulantur: leniūt tamen doloris symptoma: ut si ob humorum acredinem aliquis morsus contingat. At pharmaca ex papaueris succo, omnia sensum stupefaciunt: & ob id sanè tunc solum illis cogimur uti, ubi nullum aliud mitigatiuum doloris contulit. Miscetur autem castorium papaueris succo, ut uehementem eius frigiditatem retundat: quo nomine etiā meconium ipsum, & quidem rectè, nonnulli torrent: quāquam satius mihi uidetur uti illo minimè torrefacto, inueterato tamen, & cum castorio permisto. Porro galbanum susino unguento dilutum, melli q; & rosaceo commistum, discutit citra molestiam aurium inflammationes, in quas nihil fluit iam amplius, doloribus q; à frigore opitulatur. Ad uehementes aurium dolores medicamen ab Andromacho scriptum. Castorij drach. ij. succi papau. drach. iij. opopanacis drach. ij. spumæ lycij, drach. j. passo excipito, & tepesactis utitor. Aliud eiusdem ad purulētas aurium & ueteres affectiones. Fabæ Aegyptiæ internæ amaræ, aluminis scissi, piperis albi, spumæ nitri, croci, opij, malicorij, myrrhæ, thuris, nardi, sing. drach. ij. castorii, drach. j. aceti & mellis, quod sit satis, conficito. Aliud eiusdem, ad dolores flatulentos, & aurium sonitum congruens. Nitri, myrrhæ, sing. drach. j. rosacei cyathum. j. aceti tantūdem: simul tritis utitor. Aliud ad aurium sonitus. Veratri albi drach. j. castorij obolum. j. spu

Stupefacienti.
bus quādo co-
gamur uti me-
dicamentis.

mae nitri sexquibolum: tritis cum aceto optimo utere.

Aliud ad purulentas aures. Alumen scissum ustum, & myrrham cum melle terito, & praelotæ auriculæ pharmacum lana exceptum imponito.

Auricularis compositio probata, ex Apolloniæ libris.

Myrrhæ, thuris, sing. drach. ij. nucum amaranthi drach. j. spumæ nitri, drach. ij. aluminis scissilis, malicorij, sing. drach. j. spicæ nardi drach. ij. aloes drach. iij. uini mulsi ueteris, cyathos. iij. Arida trita uino mulso admisceto, & cocta in stanneo uase reponito, ac tepido utitor.

Ad carnem excrescentem in auditorio meatu: quo usus est Heraclides Tarëtinus. Aeruginis rasæ drach. viij. squamæ æris drach. iij. mellis heminæ dimidium. Arida trita, ac melle excepta, donec rubeant, coquito: & ablatis utitor.

Aliud ad sanguinis ex auribus eruptiones, Heraclidæ Tarentini. Marubij succum exprimito, & acetum dilutum infundito.

Aut mali punici in aceto cocti succum exprimito, infunditoq;. Aut polygoni succum cum modico aceto. Ad uermes innatos auribus, ueratrum album cum melle imitte, aut aridum insuffla: aut rubi succum infunde.

De sonitu aurium.

EX Sonitibus aurium, alij quidem, spiritus flatulenti sunt soboles: alij uerò, ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem fiunt: quemadmodum etiam in oculis oriri solent suffusorum imagines, ob uapores exhalantes ab ore uentriculi. Cæterum neutrius affectiōis exacta cognitio haberi in principio potest. Porro si in febribus sonitus fiant, minimè interturbandi sunt: ut plurimum namq; statim sedantur. Si uerò ob flatulentum spiritum, cui non pateat exitus, sonitum fieri suspicatus quis fuerit, & ob hanc rem dissecantibus, at tenuatorijs, ac discussorijs admotis pharmacis, nihil contulerit: simulq; apophlegmatismis usus sit, & uniuerso prospexerit capiti: huic meritò in hanc suspicio-

Aurium ex crescenti ulcere remedium.

Aurium sanguinem effundentium, remedia.

Aurium uermes exterminantia.

Sonitum in auribus causæ.

Sonitus aurium per febres non esse cōpescendos.

Sonituū auris
ob exquisitam
sentiendi faci-
litem ortor,
curatio per stu-
pefacientia.

nem inclinatus animus erit, uidelicet sensus audiendi
exquisitam facilitatem, causam eius rumoris existere:
præsertim si acuto audiendi sensu præditus esse æger
appareat. In talibus igitur, ex sensum stupefacientibus
quippiam soleo admiscere: cuiusmodi est mandrago-
ræ, & papaueris succus.

Ad sonitum remedia ab Archigene prodita.

Sonituū auris
remedia uaria
ab Archigene
prodita.

IN Sonitibus repentinis acetum cum rosaceo in-
stilla. Aut cuminum, & oleum, crassitudine mel-
lis. Aut radicis syluestris cucumeris succum. Si uero
protrahatur, omnibus amaris, acribus, attenuatorijs,
& discussorijs, quibus utimur ad dolorē ex crassis hu-
moribus ortum, utaris, singulis in aceto coctis, admi-
stoq; melle. Aut reclinato egro, & nitro trito in aurem
insperso, acre acetum infunde tepidum, ac postquam
feruere desierit, exerge lana, & nucum amararum suc-
cum infunde, lanaq; obtura. Cæterum quibus ob ma-
ximam ad audiendū facilitatem, id genus sonitus fiūt,
castorium & cicutæ semen cum aceto trita instilla.

Ad auditus grauitatem.

Auditus graui-
tatis curatio.

IN Surdastris, qui exiguas quidem uoces omnino
non audiunt, magnas autem uix percipiunt, hoc ip-
sum symptoma ualde suspectum habere oportet. Pau-
latim nanq; temporis progressu augescens, perfectam
surditatem inducit. Quapropter per hieram purgandi
sunt, et per catapotia ex colocynthide: pituitaq; eis per
apophlegmatismos detrahenda, & caput resiccandum
est, eiq; ut robur addatur, omni studio curandū. Vten-
dum etiam attenuatoria uictus ratione. At in ipsam au-
rem pharmaca injicienda sunt, quæ crassos uiscidosq;
humores cōminuant, & dissecent. Cuiusmodi existunt
hæc, quæ Apollonius prodidit. Cæparum succo &
resina oleo dilutis, utitor. Aut oleo nucum & resina mi-
stis pariter utitor. Vel adipem anserinum, & fel bu-
bulum, ac laurinum, ex æquo mista instillato. Porro

surdastri contrariis præsiidiis habent opus ijs qui aurium doloribus infestantur. Quippe in doloribus affectæ partes exquisitam quietem desyderant; surdastri uerò, uehementem motum postulant; transmutationēq; in contrariam ei, quæ iam adest, dispositionem.

Fomenta ad aurium dolorem, ab Apollonio scripta. Fomentis porrò utendum est per spongiarum aqua calida imbuta, sac sufficienter expressas; itemq; per cucurbitas affixas. Amplius uerò & per uaporem ex arundinibus perforatis allatum. Oportet autem alteram arundinis oram, auriculæ cavitati adaptari; alteram uerò, in ollam perforatam habentem operculum, & undiq; obturatum, incumbere. Sit autem in olla absynthium in aqua feruesfactum, quo uapor inde sublatus perferatur ad auditorium meatum. Confert etenim hoc fomentum etiam auditui graui.

Aurium dolor
fomenta.

Archigenis ad surditatem remedia.

Chalbanum cum aceto & melle feruesfactum instilla. Aut collurio ex nitro, sicu, & sinapi immisso, per triduum id non extrahimus. Postea uerò assiduus acutisq; uocibus, & uicissim grauib; inclamamus; & per tubam sonitu incusso, conamur malum depellere. Post hæc, & asphodeli radices oleo ueteri incoctas, commodè infundimus, caprinaq; assidue eluimus urina.

Surditatis re-
media ab Ar-
chigene scri-
pta.

Eiusdem de corpusculis quæ auribus illabuntur.

Quod si aqua illabatur aurē, auxiliatur acetum, & cum altero pede, qui respondet affectæ auri, exilire, aliquantulum se ipsum inclinando: hoc enim modo facile excernitur. Quin & exuctio simplex per os, aut etiam per stipulam, egregie aquam extrahit. Si uerò calculus, aut fabæ, aut consimile quid in auditorium meatum illapsum fuerit, eluito: aut lana circa auriculum specillum obuoluta, & resina tincta, extrahito. Idem & per glutinosum aliquod pharmacum fieri po-

Aures illapsa
corpa quo mo-
do ab eis excu-
tienda.

test. Quod si neq; sic sequatur, sternutatorio in nares iniecto, os ac nares obturato. Facta nanq; spiritus inclusi extensione, id quod est illapsum, efflabitur: idq; assidue, donec excidat, facito. Nam si intus manserit, aure inflammata conuulsiones inducet. Optimè etiam confert ad eorum quæ illapsa sunt eiectionem, cōcusio. Si itaq; puer fuerit, pede comprehensum, & in caput sublatum, concutiens ipsum uibrabis. Si uerò perfectæ ætatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabulam secundum affectam aurem reclinatum, caput ad tabulam firmare iubeto: dein leuata tabulæ iuxta caput parte, deferri finito, idq; sæpius facito. Mouebitur enim sic quod incidit, & ad expeditiores meatus partes progredietur. Atq; ita angusta & concava specilli parte immissa, scitè extrahito. Si uerò faba, aut consimile quippiam in aurem illapsum, in ea hæreat, madefactumq; & tumefactum, dolores inferat, impossibile quidem est integrum ipsum eximere. Quare per specilli concauum diuidere id industriè expedit, atq; ita particulatim extrahere: deinde sapam, aut uinum dulce calidum infundere, ac lenire meatum ex laniatione oblæsum. At uerò si animal aliquod sit illapsum, scammonium aceto dilutum, aut absynthij, aut peucedani succum, nitrumq; ac sulfur, cum radiculæ succo instillato.

De parotidibus.

Parotidas esse
glandularum se-
cundum aures
inflammationes.
Inflammationum
incipientium cu-
ratio.

Parotidum medi-
catio.

Parotides è genere quidem inflammationum existunt. Fiunt autem, glandulis secundum aures affectis. Cæterum prima parte curationis partium inflammationum in eis minimè utimur. In illis siquidem plurimum curatione reprimente, repulsoriaq; uti conuenit: præcipuè quum nec malignum sit, nec multum quod influit: nec uniuersum corpus plethoricum. Sic nanq; spongia sola ex posca imposita, incipientes inflammationes represcit. Verum in parotidibus con-

MED. SEC. LOCA, LIB. III. 351

trariam curationem molimur: nempe pharmaca attractoria adhibentes: & si hæc nihil memorabile efficiat, etiam cucurbitulas affigentes, aut fomēta assidua adhibentes, conantesq; ut infestans humor ad cutim ipsam trahatur: præsertim si affectio in capite hæreat. Similiter quum natura per acutas febres, redundantes humores ex uasis ad regionem inter cutem et subiecta corpora pellit, quandoquidem illis etiam glandulæ imbuuntur, multo satius uidetur tunc opitulari naturæ, febres per*abscessus curanti. Verū si uehementi impetu influant humores, nihil nos curiosius agētes, omnia permittemus naturæ. Nam siue cucurbitam, siue aliud pharmacum humores ex alto eliciens, admo-uerimus, uehemens dolor hominem apprehendit, unde & uigiliæ, & febres oriuntur, atq; exoluuntur uires. Mitigare itaq; tunc, & non influxum prouehere, oportet, per cataplasmatum maximè lenientium usum: cuiusmodi est quod ex frumenti, aut hordei, aut seminis lini farina, cum mulsâ, aut fænigræci, aut althææ, aut chamæmelorum decocto conficitur: & quæcūq; non modò humectam habent caliditatem, per quam mitigare dolores ualent, sed etiam influentes succos possunt concoquere, suppurareq;. Quod si etiam sanguis redundare uideatur, per uenæ ipsum sectionē uacuabimus, præsertim si liceat per uires. Ergo si humor non discutiatur, suppurantibus pharmacis est utendum: cuiusmodi est frumenti farina cum oleo & caricarū decocto: itē quod ex polline & fermento conflatur pharmacum. At si suppuratæ fuerint parotides, tūc aut per sectionem pus elicere oportet, aut per pharmacū abscessum rumpere, quale est Smilium uocatū, & quod ex alijs constat: aut tētare, ut ipsum per attractoria & tenuantia medicamēta discutiamus: bis in die iisdem ablatis, & fomentis admotis, donec dolores remiserint. Vbi uerò iam plurimum puris discussum fuerit,

Naturæ impetus quando minime sit iuuandus.

Cataplasma dolorē leniens.

Suppuratio quæ & quibus medicamentis molienda: Pus suppuratarum parotidū quibus modis uacuandum.

tunc iam primum semel soluere ea medicamenta, & fomenta adhibere oportet; dein uerò neq; ex re est id facere, sed ipsis pharmacis permittere, ut si quid reliquum in profundo hæreat, ipsum discutiant. Quòd si durities adlit, ea ipsa quoq; mollienda est, emollientibus medicamentis ad attractoria admittis.

Parotidib⁹ uaria remedia ab Archigene prodita.

Plantago constat ex facultate discussoria simul & repulsoria.

Repulsoria quæ miscenda medicamentis parotidum,

Archigenis ad parotidas. Rumicis radices in uino tenuium partium coctas, applicabis parotidibus citra uehementem dolorem ortis. Aut buccina marina, aut purpuras uistas, melle aut axungia exceptas imposito. Aut sicum aqua marina muria ue incoctam, admove; aut lanam etiam butyro imbutam. Cõmendat etiam usum plantaginis, tametsi ex mistis facultatibus, discussoria nempe & repulsoria constet. Ego uerò nunquam pharmacis ad parotidas destinatis repulsoria admisceri operæpretium existimo, nisi fortè aliquando pauxillum repulsorii, multo discussorio addatur; idq; ubi citra uehementem dolorem ipsæ irruunt parotides.

Aliud Archigenis ad discutiendas parotidas. Lupinorum amarorum farinam cum melle coctam, modica calce uiua addita, pro cataplasmate imposito. Aliud. Picis brutiæ, mannæ thuris, utriusq; drach. j. terebinthinæ, palmularum Syriacarum nõ uelutarum, pinguium, carnis puræ, utriusq; drach. ij. omnibus simul unitis utitor.

Aliud. Caricarum, chabani, nitri, sing. drach. j. sulfuris, tertiam unius drachmæ partem, terebinthine, opopanacisq; utriusq; pauxillum, simul unitis utitor. Quòd si medicamentis parotis non cedat, Archigenes consulit esse confugiendū ad cucurbitulā, adhibita scarificatiōe. Porro simplices parotidas curāt, emplastrum Mnaseg, & quod ex succis constat, & quod ex ptisana. His molliora adhuc, sunt cerati forma, tū ex butyro, tū ex œsypo conflata, ostreis, aut buccinis, aut purpuris uistis additis, adipeq; porcino salis experte, singulis quadrātis pondere. Sic ipsum etiam

etiam licet conficere. Butyri, vnc. j. ceræ vnc. ij. S. ostreorum vstorum, redactorumq; in pollinem, vnc. ij. Conficito & vtor. Efficacissimum nanq; est ad parotidas.

De affectibus narium.

EX genere tumorum præter naturam polypodes Polypodes.
in naribus generantur: ut ozænæ ex genere ulce-

rum. Secundum genus autem excretionum præter naturam, sanguinis effusiones contingunt in morbis acutis. Primum itaq; de ozænis sermonem faciam, quæ ex humorum acrium, putrilaginosorumq; influxu gignuntur: nam si ij duntaxat sint acres, ægrè curabilia ulcera inducunt, graueolentia uerò non item. Cæte-

Ozænæ a quibus gignantur humoribus.

rùm cura cōmunis tum his ambobus, tum etiam polypo est, primum caput siccare, corroborareq;: quū palā sit ob redundantiam uitiosorum humorum, fieri ab eo in ipsas nares defluxum. Capite roborato, naribus adhibenda curatio est, scopo in ozænis proposito, ut affecta pars per mixtæ facultatis pharmaca, tum repellentia, tum discutientia, exiccetur. Repellunt itaq; tum au-

Ozænæ atq; polypi cōmunis curatio.

stera, tum acerbæ, quæ communem astringentium appellationem sortiuntur. Discutiunt calidam & siccam uim obtinentia. Archigenis remedia ad ozænas. Obline eos chalcitide, uel atramento sutorio, uel psorico, ex melle tritis. Vel iridem & sandaracham cum melle illinito.

Repellentia q;

Discutientia q;

Ozænarum remedia.

De polypo narium.

Polypus tumor est qui præter naturam in naribus generatur, polypodis carni as similis. Quæ affectio ex crassis & uiscidis humoribus gignitur: ob idq; mixta medicamentorū materia indiget, quæ partim astringat, partim secet & tenuet, partim etiam discutiāt, condensetq;.

Polyp i descriptio, causæ, remedia.

Asclepiadis ad ozenas remedium. Aluminis scissi, drach. ij. myrrhæ, sandarachæ, sing. drach. iij. gallæ drach. j. æris usti, tantundem. Tritis utere, na-

Ozænarum remedia varia.

ribus prius uino odorato elotis, & pharmaco per specilli extremum admoto.

Lamponis ad ozænas, egilopas, polypos, & quæcunq; uelis citra sectionem, uisionem uel extirpare, remedium. Scobis æris rubri, vnc. j. salis ammoniaci sextantem. ammoniaci thymiamatis tantūdem. aluminis rotundi, quadrantem. aceti acerrimi heminas sex. Arida terito, & affuso aceto, omnia in uas æris rubri conijcito, in eoq; ad solem sub ardore caniculæ cum rubri æris radio agitato, donec exarescat pharmacum: quod postea in mortariū translatum, diligenter terito, in fictiliq; recondito. Vsu uerò exigente, aquam sorbendam dato, quæ ut ore cõtineatur, præcipito: dein pharmacum per fistulam insufflato. uel etiam melle exceptum immittito.

*Escharas inge-
nitas naribus,
excutiēdas ster-
nutatoriis eē.*

*Punicorū suc-
cū ad ozænas
polyposq; ma-
gnifice cōmen-
dat Galenus.*

*Rosarum pul-
uis in quibus
curare poly-
pos soleat.*

Cæterū post huiusmodi pharmacorū adhibitionem, etiam ster- nutatorijs utimur, quo uidelicet tectoria ulceri obduc- ta excutiamus, q̄ tribus aut quatuor diebus ferè exci- dere consueuerunt. Vbi uerò exciderint, adipe anseri- no, ac butyro cum cerato curant. Porro ipse in ozæ- nis polypisq; p̄stantissimū pharmacū reperi succū ex malis punicis, tū dulcibus, tū austeris, acidisq; & ma- turis & integris, pariq; magnitudine & numero mace- ratis, expressum. Cæterū si humectior esse polypus uideatur, plus ex austeris malis est cõtundendū. At ex aridis pharmacis, diphryge citra mordacitatē aliquan- do per multum tempus consumptum polypum noui. Probatum etiam prædictum ex malorum succis colly- rium, si ubi exaruerit, redigatur in pollinem, indeq; exuffletur, aut etiam per specilli nucleū indatur. Om- nia autem hæc assiduè facere oportet, ut nunq̄ ab affe- cta parte absit pharmacum, quum facilè ab humidita- te eluatur. Iam uerò rosæ siccæ contusæ, inditæq; in ijs qui molli carne sunt præditi, citra noxam curare ali- quando solent polypos. Nam pleraq; eorum quæ po- lypodas exterunt, eos exacerbant, si quando ab scopo

aberrarint. Cæterum ulcera in narium meatibus semper per pastillos curauī, Andronium uidelicet, & Passionis, & Polyidæ, & Bithynum, & per eum quem ipse composui. In diuite uerò quopiam, qui odoratum pharmacum exigebat, hedychroi usum excogitauī, ipsumq; Phalerno ueteri dilui, et mirum quàm breui affectio ipsa est curata.

Heraclidæ ad sanguinis è naribus eruptiones remedia.

Vbi grumos sanguinis eduxeris, lanā specillo obuoluito, eamq; in lycio aqua diluto ibuito, & sanguine manantē locū illinito. Aut linamentum ex elychnio contortum, madidatumq; aqua, & chalcitidis poliline inspersum inserito. Aut mentham tritam indito. Iuuat etiam frontem spongijs refrigerare, extremaq; uinculo excipere, qua parte magis contracta uidentur obturareq; aures, & os pluuiā aqua & frigida opplere. Asclepiadis remedia ad sanguinis effusionem è naribus. Spongiam cruda pice imbutam, & linamento exceptam indito. Aliud. Putaminis oui, & galle omphacitidis, utriusq; partem unam. Trita linamento intorto, aqua aut aceto madefacto, excipito, inditoq;. Andromachi ischoemos. Chalcitidis, drach. C. chalcanti, drach. L. Misyos assati, drach. xxv. æris vsti drach. xij. & S. tritis utere.

Narū ulcera
qbus medica-
mentis curet.

Sanguinis e na-
ribus eruptio-
num remedia

GALENI PERGA

MENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM SECVN-

dum Loca, Liber Quartus.



DE Oculorum affectibus, ocularijsq; medicamentis, agere in præsentī cōmentario est consilium. Pompholyx igitur lota nulli pharmacorum mordacitatis exper

Zzzz ij

Pompholyx
optimū est me-
dicamē oculo-
rū fluxionibus

Oculorū fluxio-
nibus cur non
sint ad mouen-
da obstruen-
tia pharmaca,
ante capitis va-
cuationem.

Albumen oui.

Foenigræci de
cocti facultas.

Extergētia me-
dicamēta quæ
sint.

Putrefacientia
medicamenta
quæ sint.

tū inferior est: atq; ob id ea utimur ad tenues & acres oculorum fluxiones, sed uacuato prius capite et uniuer-
so corpore. At uacuamus quidē corpus, uenæ sectio-
ne, purgatione q; caput autē, per apophlegmatismos
uindicamus à pituita. Poteſt tamen pompholyx lota,
quemadmodum etiam spodiū, atq; amyllum, simul &
moderatē reficcare humores: simul q; ne per tuniculas
euacuetur ea quæ in magnis oculorū uenis, superflua
humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius
q; caput ab humoribus ad oculos defluētibus purget,
utatur obturantibus pharmacis, uehementes dolores
ob tunicas distentas inducet, et ob multitudinem influ-
entium humorum, aliquando ipsarum rupturam aut
erosionē pariet. Eiusdem generis cum prædictis phar-
macis subtenuis ouorum liquor existit, abundē ualens
humiditates oculorū abluere, & exasperata lenire: ob-
turandi autem tenues meatus non parem illis faculta-
tem sortitur, sicuti nec similem uim reficcandi. At fœ-
nigræci succus, quod ad uiscositatem attinet, similis est
ouorum albugini: discussioriam tamen possidet faculta-
tem, & moderatē calfactoriā: ob id q; multos dolores
mitigare cōsueuit. Maximē p̄dictis cōtrarij sm genus
existunt liquores acres, ut Cyrenaicus, Medicus, ac-
tum sagapenum, tum euphorbium, omnes q; breuiter,
qui citra exasperationem calfaciunt uehementer. For-
tī autem facultate sunt prædita extergentia medicamē-
ta, cuiusmodi est æris squama, chalcitis usta, es ustum,
flos æris, misy, sorī, atq; stibium. His adhuc aliud ge-
nus adiacet, erodentium uidelicet, siue putrefacien-
tium: quale est auripigmentū, & sandaracha, & Asiæ
petræ flos: cuius facultatis misy etiam paululum par-
ticeps est. Est & aliud genus pharmacorum, quod in
oculares compositiones inijcitur, eorum uidelicet quæ
natura astringunt. Quæ igitur mediocriter hanc uim
habent, influxus repellunt: quæ uerō uehementer, am

pliozem dolorem infligunt, tunicas exasperando, q̄ iu-
uent influxionum impetū repellendo. Porro quæ me-
diocriter astringunt, lippitudinibus cōmodissima exi-
stunt: conferunt autem & reliquis ferē omnibus affe-
ctionibus ulcerum, pustularum, atq; fluxionum. Sunt
uerō huiusmodi. Folia rosarum, & flores, & succus.
Ericę fructus, spica nardī, malabathri folium, crocus,
lycium, & hypocisthis. Vehementiorem his astringē-
di uim acacia & omphacium habēt, quæ & ipsa in suc-
corum genere numerantur. Balauſtium etiam, & cyti-
ni, & gallæ omphacitides, ex genere eorum sunt quæ
multum astringunt. Inſāmationes et alias affectio-
nes concoquunt, myrrha, crocus, castoriū, thus, & cre-
mor foenigræci decocti: quæ etiam discussoria faculta-
te sunt prædita, & p̄sertim ex ipsis myrrha. Hæc itaq;
sylvia ocularium medicamentorum existit. Porro quæ
medicamenta substantia terrestri sunt, citra manifestū
calorem aut frigus, ea emplastica nominantur, uim ha-
bentia contrariam ijs, quæ ab obstructione liberant,
quali facultate insigniuntur Samius aster, pompholyx
lota, eiusq; cinis elotus, atq; etiam cadmia tum uſta, tū
lota, cui deterforij etiam nonnihil inest. Pompholygi
uerō & spodio parum quid inest astringens, quemad-
modum etiam plumbo post exuſtionem. Nam & hoc
pharmacum omnis mordacitatis est expers, parum ta-
men quid aſtrictionis sortitur. Amylum etiam exactē
lotum, q̄ mitisſimum est, & medium, ut nec aſtrictio-
nem nec acredinem habeat, hoc est nec calorē, nec fri-
gus. Quin & ceruſſa lota proximē accedit ad facultatē
plumbi uſti, atq; eloti: manifestē tamen astringit: amy-
lum autem & samius aster, quatenus ex gustu & odo-
re licet colligere, sunt penitus qualitatis expertes. Igi-
tur uniuerſum huiusmodi pharmacorū genus, siue mo-
dicam in gustu aut odore qualitatem exhibeat, siue pe-
nitus nullam ostendat, ueluti aquæ puriſſimæ, expers

Lippitudini cō-
uenire, q̄ aſtrin-
gunt mediocri-
ter.

Astringentiā
vehementer q̄
ſint.

Ocularia me-
dicamenta.

Emplastica me-
dicamēta, quæ
& ſint, & di-
cantur.

Amylum

Aq̄ puriſſimæ
ſunt qualitatis
expertes.

Zzzz ij

Corneę tunicę
erosę, quę me-
dicamenta cõ-
gruant.

Arterię secus
aures, & tẽpo-
rum quãdo in-
cidendę sint.

Collyria Libi-
ana & cygni.

Collyria læui-
gandi modus.

Lactis mulie-
bris vsus com-
modissimus vl-
ceribus corneę
existit.

Fœnigræci de-
coctum,

qualitatis uocatur, moderateq; per solam terrestrẽ sub-
stantiam secundum propriam naturam siccatur. Ac sa-
nẽ sola hæc medicamenta conueniunt in erosionibus
corneę tunicę, ipsiusq; rhagoidis prolapsibus, ob in-
fluxum tenuium atq; mordacium humorum ortis: quũ
nimirum astringentia cohibeant effluentes humores,
atq; ob id dolorem ex mordacitate ipsorum ortum in-
tendant: acria uerò, affectionem simul adaugeant. In
uniuersum tamen ipsi particulę affectę, quo facilius
curationem recipiat, prospicimus, tum uniuerſi corpo-
ris purgationibus: tum reuulsionibus: primum quidẽ
ad infernam corporis partem: dein etiam ad occiput,
& ad capitis cutem. Vtimur etiã sectionibus arteria-
rum, interdum quidem incidẽtes eas quę retro caput,
iuxta aures sunt exporrectę: interdum autem earũ par-
tem, quę temporibus inest: idq; ut medeamur disposi-
tioni, quę tunicis oculorum est genita, ob quam etiam
optimus sanguis ad tunicas ipsas delatus corrumpit̃.
Ad has igitur solas dispositiones conuenire uidetur p̃-
dictorum medicamentorum genus, citra mordacita-
tem exiccans in affecta parte cacochymiam, à qua id
quod influit corrumpitur. Vocantur autẽ collyria quę
ex eiusmodi medicamentis cõstant, tum Libiana, tum
Cygni: nempe ob candorem, qualem cygni possidẽt.
Præualeat quippe in ipsis amyliũ, & terra Samia, & ce-
russa Rhodia, quę præstantior est, & candidior. Sunt
qui collyria id genus in cotibus terant, lacte boni suc-
ci ex nutricis uberibus instillato: ut astrictoriam, uim
quę ouillo inest, effugiãt. Etenim quum in lacte sero-
sa quædam, exterforiaq; facultas insit, eius usus con-
gruens est ad propositam curationem: quippe ulcera
explenda, extergentibus citra acrimoniã habent opus
medicamẽtis. Quod si huiusmodi haberi lac nequeat,
per fœnigræci decoctum terere collyria prestitit̃, ut
pote quod exterforiam quandam uim habet, qua oua

omnino sunt destituta.

De aspritudinibus palpebrarum.

QUum agrè curabiles prædictæ dispositiones existant, adhuc earum difficultatem adaugent palpebrarum asperitates: à quibus etiam in lippitudinibus, tunicæ oculorum commorsæ, affliguntur dolore. In illis tamen audemus ad pharmaca inflammationi congruentia, non nihil ex detergentibus immiscere, ueluti est collyrium ex uino, aspritudinibus accommodatum: quo primum ea quæ ad palpebras succrere, deprimantur. Nam ubi oculi minus infestantur inflammatione, ea quæ aspredines expurgare possunt, administramus. At dum cornea exulcerata est cum mordaci influxione, impossibile est tali aliquo uti pharmaco. Cornea siquidem ipsa amplius exasperabitur: uuea uero impèsius procidet, hominemq; uehemēs dolor corripiet, augebiturq; ipsius fluxionis malignitas. In huiusmodi itaq; affectionum miscella, solent Medici, præ inopia consilij, palpebras ipsas reuertere, atq; absq; medicamentis purgare, idq; tum specilli concauo, tum molli spongia. Quidam ex præceptoribus meis, ex pumice laeuigato, cum tragacantha aut gummi, collyriū faciebat, eoq; ab extentis atq; reuersis palpebris, aspritudines deradebat. Vbi uerò temporis progressu per prædicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus tunc iā ea quæ palpebras extergunt, paulatim adhibere medicamenta: quæadmodum ubi fluxus omnino fuerit iam reficcatus, & palpebræ moderatè habuerint, caua ulcera sunt collyrio ex thure complenda.

De lippitudine, siue ophthalmia.

Ophthalmia est inflammatio periostij mēbranæ, quam etiam agnatam uocant, q̄ alijs, quæ oculū ipsum constituunt, tunicis, forinsecus agnascatur, ligamentum existens toti oculo, ad circumscripta ossa. Ob id enim omnia quæ circum oculos sita sunt, usq; ad ma-

Collyrium ex uino.

Aspritudinis palpebrarum curatio.

Lippitudo. Ophthalmia 2 inflammatio periostij tunice, q̄ barbari coniuā appellāt.

Zzzz iij

las quandoq; simul per uementem lippitudinem intumescunt. Igitur pharmaca omnia huiusmodi affectionem curantia, ex genere eorum sunt, quæ medentur inflammationibus: assumunt tamen necessario nonnihil, pro ipsius partis natura, quæ excellentem mollicie, atq; eximiam quandam supra omnem totius corporis cutem, ad patiendum facilitatem est nacta, ob sensus subtilitatem, ac raritatem substantiæ.

Ophthalmiæ
eō gruentia me-
dicamēta qua-
lia esse debeāt

Leniētes liquo-
res.

Adhibenda itaq; sunt pharmaca repellentia, minimè tamē exasperantia, hoc est, non uementem astringentem sortita: sed quæ tum propria sua substantia moderatiora sint, tum lenitui liquoris admistione adhuc magis talia redantur. Voco autem lenitiuos liquores oui candidum, & fœnigræci decoctum, magisq; adhuc ipsum lac. Ut plurimum uerò albumen oui cum accommodatis pharmacis lippitudines curare sufficit, per collyria uidelicet uocata monohemera, hoc est diaria. Sæpe siquidem magnas inflammationes, hæc adeò mitigauerunt, ut in uesperam quidē homo balneo uteretur: in sequenti uerò die, nardino collyrio ad instaurationem & corroborationem inungeretur. Admiscere autem ei circa primam inunctionem minimum quiddam acrium & sistentium medicamentorum oportet: ut circa secundam paulo amplius quiddam priore. Sufficiunt namq; hæc duæ pharmaci adhibitiones, & deambulatione aliqua non multa ante balneum. Fouerī tamen oculi per spongiam debent ex meliloti & fœnigræci decocto, semel quidē, aut bis in die, si mediocris sit dolor: sæpius autem, si uehementior.

De ulceribus oculorum.

Oculorum vl-
cēra, quia me-
dicamēta po-
stulent.

Oculorum ulcera eandem secundum genus curationem requirunt, quam reliqua omnia: ob ipsius tamen partis naturam, q̄ lenissima eis adhibenda sunt, quale est, quod ex lota pompholyge constat. Admiscetur ipsis etiam succi quidam non solum mordacitatis

expertes, sed qui etiam uehementissimos mitigare do-
lores possint, ueluti mandragorę succus. Quidā etiam
polygoni succum miscuerunt, ut aliī, ipsoꝝ ouorum
candidum. Quæ omnia dum tempus utēdi instat, mi-
scenda sunt: propterea q̃ faciliē acescunt: quo tempo-
re etiam rosarum additur succus. Eorum autem om-
nium esse debet scopus, ut ulcus mundum seruetur:
utpote partium natura ipsum replente, atq; ad cicarri-
cem ducente. Si itaq; inflammatio adhuc oculum ur-
geat, aut quispiam etiā dolor, collyria ex thure, & me-
tallicis lotis, & succis mordacitatis expertibus, adhi-
benda sunt. Vbi uerò sordida reddita ob eorum usum
ulcera fuerint, ex repurgantibus quippiam miscēdum
est: quale existit Paccianum croceum, ex uino: quod
etiam aspritudines exterit, pterygiaq; attenuat. At ue-
rò ulcera quæ per erosionem tunicæ corneæ fiunt, ita
ut aliquid ex ipsa rhagoide procidat, repellentibus &
astringentibus pharmacis opus habent. Discussoria au-
tē postulant tum pustule, tum pus intra rhagoidem
contentum. Recētia igitur, & adhuc inflammata, phar-
macis ex myrrha, thure, & croco sedantur: uetustiora
autem, nonnihil ex discussorijs desyderant, quemad-
modum etiam induratae tunicarum inflammationes.

De ocularium pharmacorum uiribus.

Igitur omnimodæ acrimoniæ sunt exptes hi tres
liquores, scēnigræci decoctum, lac, & candidum
oui: ex quorum genere existimare oportet tum gum-
mi, tum tragacantham. Quippe nisi prædicta illa tria,
tum copia, tum usu, prompta & expedita essent, pos-
semus utiq; parum gummi, aut tragacanthæ in mul-
ta aqua maceratum, in eundem usum ueluti illa asfu-
mere: & per ipsa etiam in medica cote collyria tere-
re: & per sola infusa, serosos in affectis oculis genera-
tos humores eluere. Oculariū itaq; pharmacorum
unum genus in illis tribus liquoribus, atq; etiam in

Paccianū col-
lyrium.

Oculariū medi-
caminū uires.
Gummi.
Tragacantha.

Oculariū me-
dicamentorum
genera uaria.

tragacantha, gummi, metallicisq; elotis consistat. Al-
 terum uerò genus eorum sit, quæ modicam morda-
 citatem fortiuntur, propterea q̃ quædā eis sunt ad-
 mista, quæ parū astringunt, deterguntq;: qualia sunt,
 rosæ, & thus: illæ quidem, pauculam astrictionem:
 thus uerò modicam extergendi uim, possidētes. Ha-
 bet tamen ob moderatum calorem thus etiā & con-
 coctorium quid, ac doloris mitigatorium. Ex eodem
 genere cum ipso, quantum ad concoctionem & di-
 scussionem attinet, censendus est crocus & myrrha:
 quæ inter se in eo differunt, q̃ crocus quidem, mo-
 deratè astringat: myrrha uerò, citra astrictionē, non
 instrenuè discutiatur, & resiccat humiditates. Sūtq; hæc
 uiribus præstantiora thure, & ob id etiam maiorem
 discutiendi uim habent: quum autem careant ui de-
 tergendi, ad ulcerum curationem thure inferiora exi-
 stunt. Huius generis medicamentorum, concoctorij
 inq; & discussorij, lyciū quoq; est, & castorium. Sar-
 cocolla ēt concoctoriū & discussoriū medicamētum
 existit, ac magis q̃ ipsa, chalbanū. Meliloti uerò deco-
 ctum ad cōcoctoriam facultatem assumpsit ēt quid
 astringitorium, eiusdem ferè generis cum croco exi-
 stens. Inijcitur etiam in oculares compositiones la-
 pis hamatites uocatus, humores resiccandi uim ha-
 bens, ueluti & cadmia. Mitius tamen pharmacum la-
 pis ipse q̃ cadmia existit, utpote ex humida substan-
 tia, non terrestri, ueluti cadmia, generationem inde-
 ptus. Hui similis est lapis Schistus dictus, sed fortio-
 rem obtinet facultatem. Quod uerò stibium uoca-
 tur, illotum quidem, fortem astringendi facultatem
 ostendat: lotum autem, exoluit: ut propè ad uim mor-
 dacitatis expertum accedat. At æs ustum uehemen-
 tem extergendi possidet facultatem, itemq; squama
 eius, & flos. Nec minus efficax, sed minus mordaci-
 tatis expers chalcitis usta est. Quòd si lauentur talia

Thus dolorem
lenit, conco-
quitq;.

Crocus mode-
rate astringit.
Myrrha citra
astrictionem, di-
scutit, resic-
catq;.

Lycium.
Castorium.
Sarcocolla.
Chalbanum.
Meliloti deco-
ctum.

Lapis hamati-
tes.

Cadmia.

Schistus lapis.

Stibium.

Aes ustum.
Æris squama,
flosq;.

Chalcitis usta.

MED. SEC. LOCA, LIB. III. 363

pharmaca, exterforia quidem adhuc manent: tanto tamen imbecilliora, quantum amiserunt mordacitatis. Huius generis sunt etiam misy, & ærugo, fortissima pharmaca, ijs quæ sycofi & callis conueniunt, admista. Sunt qui etiam gallas admisceant, uehementer astringens pharmacum: sunt qui etiam chalcanthum, quod unâ cum acredine uehemētissimè astringit. Moderatius tamen redditur ustum, & lotum. Ad hanc syluam pertinet & stomomatis squama. At thuris cortex, astringit quidem & ipse admodum: prædictis tamen est longè inferior. Porro manna thuris à thure ipso differt, q̃ exiguum quid astrictiōis fortatur, ratione corticis thuris, cuius nonnihil contraxit. Quæcunq; igitur ex astringentibus multam terream compagem habent, aspritudines, & sycofes, & callos consumunt. Cæterum quæ ex succorum genere sunt, ueluti omphacium, & hypocisthis, eluuntur faciliè in subliationib; diffuētia simul cum lachrymis. Ex hoc genere est glauciū, & acacia. Citra mordacitatem uerò extergit cerui cornu ustum, ueluti etiam caprinum: non tamen dolorē sedant, nec concoctoria facultate sunt prædita, ut thus, frigidi nimirum & sicci tēperamenti existētia. Mixtæ facultatis est aloe, quēadmodū rosa. Habet enim qđ extergere est natū, aliquid in se amarū: sicuti et astrictorium quippiam, ut & cōmittat, & ad cicatricem perducatur.

Quæ ad scabras affectiones conueniant.

EX ijs quæ ad scabras palpebrarum affectiones cōueniunt, sunt sales ammoniaci, & lapis Asius, tum ipse, tū eius flos: & quod psoricum appellatur, non simplex, neq; sponte natum, sed præparationis modum indeptum. Admiscetur ijs & misy ustum, & sandaracha, & arsenicum. Ex medicamentis uerò aromaticis, casia, malabathri folium, & amomum, cinnamomumq;.

Lota euadere imbecilliora.

Misy.
Ærugo.

Gallæ.
Chalcanthum.

Stomomatis
squama.

Thuris cortex
& manna.

Omphacium
Hypocisthis.
Glaucium.
Acacia.
Cerui cornu
ustum.

Aloes facultates.

Scabris palpebris quę operantur ferant medicamenta.

Quæ induratis auxilientur.

Induratis tuni-
cis oculorum
quæ conferas.

Compositiões quæ ad induratas oculorum tu-
nicas congruunt, ex succis constant, & ammo-
niaco thymiamate. Miscent autem eis myrrha, thus,
chalbanum, & consimilia.

Quæ suffusis medeantur.

Suffusorum re-
media.

Ad Suffusos habetur compositum medicamen-
ex succo fœniculi, hyænæ felle, ac melle Attico
constans: cui uonnulli caprillū fel addiderunt. Nunc
autem in pretio habetur pharmacum ex felle scaro-
rum compositū: sicuti & quod ex myrrha stacte con-
ficitur: quorum omnium promissa magna: effectus
autem interdum nullus.

Pharmacum aridum ad tuendam oculorum
ualetudinem à me compositum.

Oculos robo-
rans pharma-
cum.

Lapidis phrygi, ter usti, totiesq; extincti, sed pri-
ma quidem extinctione, butyro: secunda, uino
odorato: tertia attico melle, ad ipsum extinguendum,
iniecto lib. j. æris usti, piperis albi, folij malabathri,
sing. vnc. j. Stibij, drach. xij. Postquam uerò omnia
fuerint læuigata, & reponere medicamentum uelis,
adijce opobalsami Syriaci vnc. j. S. Porro usus ip-
sius ad solas palpebras competit cum specillo indu-
cti, citra tunicarum ipsius oculi contactum.

Aridum ad circunrosos oculorum angulos ab Ascle-
piade scriptum.

Ocularia, medi-
camenta uaria,
a medicis ua-
riis conscripta.

Spodij Cyprij, drach. iij. ompha-
cij aridi, drach. ij. nardi obolos. iij. piperis fricti, gra-
na. xv. tritis utere.

Pharmacum calliblepharon,
exornandis palpebris accommodatum. Facit & ad
lippitudines inueteratas.

Stibij usti ac uino ex-
tincti, drach. xvj. plumbi usti & loti, drach. viij. fuligi-
nis thuris, spicæ nardi, myrrhæ torrefactæ, croci, squa-
mæ grise, sing. drach. j. omnibus tritis ac repositis uti-
tor.

Aridum Philoxeni ad pruriginosos & cir-
cunrosas angulos. Facit & ad obtusum uisum.

MED. SEC. LOCA, LIB. III. 369

Cadmice, drach. iij. salis ammoniaci, drach. ij. piperis albi drach. j. tritis & læuigatis utitor.

Liquida oculares compositiones ad omnem extuberantiam carnis tollendam: & ad incipientem lippitudinem.

Compositio qua usus Philippus est in Cæsaria. Misys affati, drach. viij. myrrhæ drach. iij. cadmiæ, drach. viij. croci drach. ij. salis ammoniaci tantūdem, nardi indicæ, piperis albi, utriusq; drach. j. mellis Attici cyathum unum: misceto. Panchrestos Erasistrati ad lippitudines omnes, & ad purulentas aures. Aeris usti, myrrhæ, singul. drach. j. piperis obolos. ij. misys tosti drach. j. croci obolos. iij. uini Chij heminam. j. passi cretici hemine dimidium. Coquantur ad lentum ignem ut decet.

Philoxeni liquida exacuens uisum, ac cicatrices & callos extens. Ammoniaci thymiamatis drach. iij. æruginis drach. ij. uino diluta, & contrita, melle Attico excipito. Compositio largi exacuens uisum.

Succi radice fœniculi partem unam: mellis tantundem: misceto. Alia. Succi radix fœniculi, succi chelidonie, mellis Attici, sing. drach. j. misceto.

Ad tingendas albugines. Gallam tritam per specilli nucleum calfactum imposito: dein chalcanthū aqua dilutum admoueto.

Ad glaucos oculos, quo pupillæ nigræ reddantur. Malicorij dulcis succum infundito: dein post temporis interuallum hyoscyami florem cum uino tritum instillato.

Ad paruos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscessus. Chalbani partem unam cum modico nitro mixtam imposito.

Cataplasma Heraclidis Tarrentini ad uehementes oculorum dolores. Rosarum uiridium, aut siccarum, drach. iij. croci drach. j. opii tantundem, excipito meliloti decocto, aut passo, utitorq;

Aliud. Rosarum, uolarum albarum,

Oculorum uehementes dolores soluentia cataplasmata.

Oculorum flu-
xionibus repel-
lendis aggluti-
natorium phar-
macum.

Malabathrinū
medicamentum
vehementibus
oculorum do-
loribus.

Collyrium try-
phera nomina-
tum.

meliloti, capitum papaueris, sing. drach. ij. croci, opij, myrrhæ, sing. drach. j. oui assati uitellū. Tritis & passo subactis utitor. Agglutinatorium ad repellendas fluxiones ab oculis. Pollinis, myrrhæ, manna thuris sing. drach. j. candido oui excipito, temporibusq; & fronti admoueto. Collyriū Moschionis, ad epiphoram, dolores, atq; fluxiones congruēs. Glaucij, drach. vj. Sarcocollæ drach. viij. croci drach. iij. gummi drach. ij. tragacanthæ, succi mandragoræ, sing. drach. ij. opij drach. j. Aqua pluuiali excipito, utitorq; . Paccij sphragis. Cadmiæ ustæ, & lacte caprillo, siue muliebri, extinctæ ac lotæ, assiccataq; in umbra, drach. x. æris usti ac loti, acaciæ, utriusq; drachmæ. x. opij drach. vj. croci tantundem gūmi drach. xv. aqua pluuiali excipiantur. Collyrium ad acerbissimos oculorum dolores. Cadmiæ ustæ & lotæ, acaciæ, stibij usti, & loti, aloes Indicæ, sing. drach. viij. croci, myrrhæ, opij, sing. drach. iij. gummi drach. viij. aqua excipe, utereq; ex ouo Ego etiam pōpholygis & thuris, utriusq; drach. iij. adieci. Malabathrinum nostrum ad uexationes dolorum. Cadmiæ drach. xvj. acaciæ, drach. xl. æris usti & loti, drach. xiiij. opij, lycij Indici, malabathri, nardi Indicæ, castorij, croci, aloes, sing. drach. ij. myrrhæ drach. iij. cerusæ drach. viij. stibij loti tantundem. gummi drach. xl. aqua excipito & utitor ex ouo in principio affectionum, & etiam in declinatione, * ubi panchrestum ab ipsa parte remoueris. Collyrium album tryphera dictum, admodum lene, ad epiphoras maxime congruens. Cadmiæ lotæ drach. xvj. cerusæ drach. viij. amyli, gummi, tragacanthæ, singul. drach. iij. opij drach. ij. aqua excipito, & cum ouo utitor. Cygnus inscriptus Reginæ, ad maximos oculorum dolores. Cadmiæ drach. xvj. cerusæ lotæ drach. viij. amyli, tragacanthæ, acaciæ, opij, singul.

drach.ij. gummi drach.xij. excipe aqua pluuiali, & dum uti uoles, adijce cādida ouorum quatuor, recen-
tium.

Aerianum pharmacum ad ueteres ac re-
centes affectiones accommodatum. Cerusæ drach.
xxiij. Cadmiæ ustæ, & lotæ, stibij usti & loti, thuris,
singul. drach.x. squamæ æris drach.v. opij drach.ij.
myrrhæ tantundem. gummi drach. xij. aqua pluuiali
exceptis, utere ex ouo.

Aerianū phr
macū affectio-
nibus oculorū
accomodatū.

Collyrium ex cornu cer-
uino, ad ulcera, & pustulas, quod cicatrices exterit.

Cornu ceruini usti, & loti, thuris, plumbi usti, sing.
drach. iij. squamæ æris lotæ, drach. ij. opij, drach. j.
gummi drach. iij. excipe ex aqua pluuiā.

Colly-
riū diarhodon, ad fluxiones atq; dolores oculorum
congruens. Rosarum drach. C. croci drach. j. opij,
myrrhæ, sing. drach. viij. gummi drach. L. uino odo-
rato excipito, utitorq; ex ouo. Ego uerò pro folijs ro-
sarum, tantundem earundē florum inieci, feliciterq;
succesit.

Lynceus, ad affectiones callosas, exa-
cuens uisum. Cadmiæ, æris usti & loti, ammoni-
aci thymiamatis, sing. drach. xij. myrrhæ drach. xvj. la-
pidis hæmatitæ, drach. vj. opij tantundem. aloes, fel-
lis taurini, chalbani, sing. drach. iij. æruginis drach. j.
opopanacis drach. iij. salis ammoniaci drach. ij. gum-
mi, drach. vj. Aqua omnia pluuiali excipito.

Melinum Lucij præceptoris, ad scabros & corrosos
angulos, intēsos pruritus, oculos humectos, omnēq;
hebetudinem uisus, cicatrices etiā & callos exterens.

Cerusæ, croci, singul. drach. xxiiij. ammoniaci thy-
miamatis, salis ammoniaci, nardi Indicæ, opij, myr-
rhæ, omphacij. sing. drach. vj. gummi, drach. xxiiij. Ex-
cipiantur aquæ pluuiali.

Quæ Archigenes ad oculos affectos scripserit.

IN Fluxionibus oculorum primo conuenit cibi
atq; potionis parcitas, aquę potus, ac maximè rei
uenereę, abstinentia. Subducatur aluus & facies asil-

Oculorū affe-
ctibus remedia
ab Archigene
scripta.

duè primm multa frigida, dein oxycrato abluatur. Fugiant odores acres, & pulueres, fumumq; & tum Solis, tū lucernarum splendorem Si augeſcat fluxio, dolorq; accedat, conſert etiam phlebotomia. Circa frontem porrò & tempora conueniunt medicamenta astringentia. At ſuper oculos lana pura oui candido madefacta imponatur: aut oui aſſi luteū: aut melilotum in paſſo coctum. Omnia enim ex astringentium genere in principijs conferunt. Ad plagas

Oculorum plagis quæ opitulentur.

illatas oculis facit columbinus ſanguis inſtillatus, & præſertim is qui ex teneris pennis exprimitur. Candidum etiam oui eodem modo in oculū inſtillatum, ac præterea lana exceptum, & ſupernè impoſitum. Prodeſt etiam melilotum coctum cum uino, impoſitumq;. Ad tumores ex plaga in oculis ortos ualde conuenit fomentum per mollem ſpongiam aceto diluto madentem. Ad palpebrarum deſluuia, æruginis tritæ partem unā, ammoniaci thym amatis tantundē, trita imposito. Ad inutiles atq; pungentes palpebrarum pilos. Vbi auulſi fuerint, illinito ſanguinem cimicum, & non renaſcentur: aut chamæleonem albā & tritam, cui uiridiū ranarum ſanguis ſit miſtus, inungito. Offuſcationem omnem, incipien-

temq; ſuffuſionem ſanat fel omne, cū mar-
rubij ſucco ac melle Attico. Ad

pterygia, chalcanthi, et ſalis am-

moniaci æquales partes:

gummi dimidiū, cum

aceto in collyria

formato, illi-

nitoq;.

Galenī

GALENI PERGA MENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECVN-

dum Loca Liber Quintus.

De suggillatione, quā Græci hypopion nominant.



YPOPION ex genere effusionū existit, estq; affectio cutis ipsi oculo subditæ, ubi contusis uenis quæ in ea sunt, sanguis per fissuras effundit: qui quidem nisi discutatur cito, interdum progressu temporis liuescit & denigra-

Hypopion.
Suggillatio
quid sit.

tur. Quare meritò ad eius curationem statim festinant Medici. Cæterum quum tunica uenarum, ex quibus sanguis exilit, rumpatur, parum quiddam ex astringētibus ad discutientia admiscet, Vbi uerò ad propriam naturam redierint uenulæ, tunc discussorijs solis uti admodum opportunum uidetur: ex quibus tamen imbecilliora quidem, in primis sunt adhibenda: fortiora uerò, inueteratis & denigratis conueniunt. Ego igitur Nili collyrio diarhodon, in oculariorum coticula ex aqua trito, partem suggillatam illino, sertulæ campanæ ac fœnigræci decocto prius pro fomento usus: quo ipso decocto, postea etiam collyriū dissoluo: ac dein etiam ex solius fœnigræci decocto. Quod si quæpiam affectionis reliquæ restitēt, in fœnigræci decocto collyria ex myrrha dissoluo, illinoq; Vbi uerò affectus his remedijs nō cedit, collyrium ex sandice est cōmodum.

Suggillationis
curatio.

Archigenis pharmaca ad suggillata.

Summè facit ad recentia & liuida suggillata, spongia muria intincta, & assidue imposita, sublataq;: postquam, fomentum ex aqua calida prodest. Cataplasmate autē utere faba fresa contrita, absynthio, hyssopo, origano, raphani cortice, uua passa exacinata, unoquoq; per se cum melle, aut aceto, aut aqua. Minimè ta-

Suggillatis
pharmaca ab
Archigene pro
dita.

Tomus IIII.

AAa2

men rectè mihi uidetur præcipere, ut indifferenter uno aut alio utamur. Aqua quippe acrimoniae omnis exper-
tissima est. Mel autem ulceribus mordax, cutem haud-
quaquã offendit: acetum uerò utrisq; mordax existit.

Lomentum fa-
baceum.

Aliud. Aut fabam fresam cōmansam, cum melle im-
ponito. Etenim fabæ lomentum, etiam citra manduca-
tionem cum melle subactum, liuida discutit. Ex mandu-
catione autem, summè discussorium efficitur, nimirum
uiribus à salua assumptis.

Aut cerussæ & lithargy-
ri partes æquas cum melle terito, atq; admista faba fre-
sa, ad cerati formam reducito, utitorq;.

Aut hordea-
ceam farinam cum aceto mulso coctam imponito.

Aut thus & thapsiam æquis portionibus cum rosaceo
cerato.

Hæc Archigenes. Dictum autem à nobis
est, qd ex discussorijs medicamentis in principio prestā-
tiora sunt, quæ modicā astringendi uim possident: qua-
lia sunt rosæ, melilotum, & crocus. Apollonius autem
ad inueterata suggillata, ari radicem rasam, melleq; sub-
actam, impositamq; cōmendat. At Crito bryoniæ ra-
dicem tritam cum melle, aut rosaceo cerato exceptam,
inter remedia suggillatorum recenset.

Sugillatis me-
dicamē ab He-
ra scriptum.

Medicamē
Heræ conscriptum ad suggillata. Succicicutæ, obolos
ij. croci drach. ij. myrrhæ, acaciæ, sing. drach. j. opij. dra-
ch. ij. succi thapsig, gummi tragacanthæ, sing. drach. j. cū
aqua cogito. Tribus enim horis (ut inquit Heras) sug-
gillata dispungit. Ego uerò nucem per ætatem iam
oleaginosam effectam expertus sum aliquando ad cru-
entatos facientem.

De Aegilope.

Aegilopis de-
scriptio & cu-
ratio.

I Nter nasi os & magnum oculi angulum, paruum
quoddam exiguo abscessui p̄simile tuberculum na-
scitur: quod sanè sepe in ipsum angulū rumpitur, egreq;
curationē admittit, nisi maturè illi occurratur. Igitur me-
deri ipsi oportet medicamentis quæ absq; mordacitate
discutiant. Quippe coafficitur ab acris oculis, ac sic

Inflammatiō particulæ augetur. Heræ ad ægilopas.

Maluæ folia cum sale & melle trita imposito. Alica

etiam in aceto cocta, incipienti ægilopi opitulatur.

Archigenis remedia ad ægilopas. Aegilopas eruo cum melle integimus, aut cinere uiticis cum aceto subacto.

Probè facit & thus cum recenti colūbino stercore, impositum. In nōdum foratis, staphidem syluestrē,

& ammoniacum thymiana cum melle, ueluti spleniū, imposito: aut alumen scisile cum terebinthina. Si

morbis his remedijs non cedat, diuiso angulo, osseq; nudato, cauterium admoue: sic siquidem decedūt squamulæ, atq; ipsum malum curatur.

De Varis.

Tumor paruus & durus in faciei cute oboritur, Varus Latinis, Græcis Ionthos dictus, à crasso concretus succo, ostendensq; meritò sui ipsius curationem futuram per emollientia, et discussoria pharmaca.

Vari descriptio & curatio

De ficosis tumoribus.

VNa quædam hæc affectio est ex ijs quæ in mento enascuntur, differens à varis in eo qd non solum crassus sit qui hos tumores excitat humor, sed serosa etiam tenuitate participet, ob quam exulcerantur cito, si non, ut decet, curentur: & ob id magis exiccantibus pharmacis q̃uari opus habent.

Ficosus tumor a uaro quo modo differat, & qualia medica mēta postulet.

De lichenosis in mento tumoribus.

EThæc affectio ex mixto quopiam generatur humore, serosis nimirum tenuibusq; & acribus succis cum crassis mixtis: quapropter facilè etiam in psoram ac lepram transit: indigetq; etiam ipsa pharmacis fortiter exiccantibus. Vbi uerò in psoram aut lepram transierit, ultra hoc qd resiccantibus indiget, etiā repurgantia & exterforia desiderat.

Lichenes a quibus gignantur humoribus & qualia medicamenta desiderant.

De menti eruptionibus.

Hoc eruptionum, siue exanthematum nomen, quidam in cōmuni usurpant de affectionibus ulce-

A A a ij

Exanthemata
resiccantib⁹ me-
dicamentis in-
digent.

rosis & asperis in mento sua sponte oborientibus.
Indiget uerò & hæc ipsa affectio resiccantibus medi-
camentis.

De furunculis.

Dothienes.

Furunculorum
species.

Furunculi, Dothienes Græcis uocati, ex similibus
humoribus, ueluti uari, gignuntur, per uniuersum
corpus duplices existentes: nonnulli quidem, Varosi,
duri, & egrè concoctiles; aliqui uerò inflāmati: in qui-
bus aliquando febres consistunt, & tumor excrescit in
magnitudinē, & in pus transmutat. Vnde curatio ipso-
rum ut plurimum eadem quæ inflāmatōnū existit.

Critonis ad Varos remedia.

Varis remedia
scripta a Cri-
tone.

Mellis Attici, et acerrimi aceti, sing. cyathum unū
misceto, ipsisq; uaros illinito, cū digito pfricādo.
Vel amaras amygdalas aceto intritas, faciei illine.

Aut alumen scissile probè leuigatum terebinthina ex-
cipito, impositoq;.

Ad Varos callosos. Saponis
Gallici drach. iij. Ammoniāci thymiamatis, drach. j.
thuris drach. j. aqua dissoluito, & cerati spissitudinem
facito, eoq; illinito, & post horæ interstitium calida ab-
luere iubeto.

Elephantiasis
incipienti me-
dicamen egre-
gium.

Ad affectiōes eminētiores, ac prin-
cipium elephātiāsis. Gummi albi, spumæ nitri, thuris,
fulfuris uiui, sing. æquales partes aceto dilutas ac pro-
bè tritas, in pastillos redige, eosq; in umbra exicca; usu
uerò expetēte, aceto dilutos illine; atq; ubi resiccati fue-
rint, subscripta compositione deterge. Saponis Galli-
ci lib. j. ammoniāci thymiamatis, tantundē. thuris, ma-
stiches, spumæ nitri, sing. vnc. iij. Saponem & ammo-
niacum in fictile uas coniecta, & aquæ sextarijs duo-
bus affusis, coquito; atq; ubi dissoluta fuerint, arida cō-
tusa atq; cribrata adijcito; deinde in mortariū transfu-
sa, & probè conquassata, in uase uitreo reponito. Vsu
uerò postulante, faciem ex eo smegmate inquinato, &
post modicum temporis larga aqua molliter perfrican-
do abluito. Eiusdem ad ficosas menti papularum

eruptiones. Spumæ argenti, misyos crudi, æquas partes tritas insperge.

Aliud. Atramenti sutori, sulphuris uiui, singul. drach. ij. æruginis drach. j. nitri rubri drach. ij. trita insperge.

Andronis pharmacum ad idem accommodatum. Chalcanthi, myrrhæ, sing. drach. ij. thuris, aluminis scissi, sing. drach. iiij. malicorum, gallarum, aristoiachia, sing. drach. viij. vino austero exceptis utitor.

Critonis remedia ad lichenas. Tritici grana multa imposito in incudē: deinde laminam æris candētem tritico superponito: & resolutum ab eo liquorem, calidum adhuc, auferto, illinitoq;

Aut portulacæ succum assidue illinito. Quod si intueri sint lichenēs, capparis folia trita cum aceto imposito. Aut corticem radiceis hortensis ruicis, similiter ex aceto tritam.

Pastilli Lichenici. Glutinis fabrilis, chamæleonis, sing. drach. iiij. sulfuris uiui, thuris, sing. drach. ij. aceti, hemina dimidium. Glutinum aceto dissoluitur: dein aridis affunditur. Vfus tempore, quantum satis est, aceto diluo, calidumq; impono.

Humida ad impetiginosos affectus. Misyos peregrini, thuris, myrrhæ, aluminis scissi, sing. drach. viij. aloes, sulfuris uiui, utriusq; drach. iiij. Passio excipito, ad spissitudinem strigmenti, & bis aut ter in die perfrectis illine.

Emplastrum Lichenicum. Cera, picis coctæ, terebinthinæ, sulfuris uiui, sing. libræ dimidium: liquida committito aridis.

Excoriatorium lichenum. Squamæ æris, drach. vj. auripigmenti, sandarachæ, utriusq; drach. iiij. eris usti, ueratti albi, sing. sesquidrachmam. uentrium cantharidum, tantundem. Singula per se terito: dein simul mista, cedria excipito, & ad strigmenti spissitudinem reducta, pyxide æris cyprii reponito. Caterum ante q̃ excoriatoria imponantur, circumscritas & uicinas licheni partes pharmaco aliquo inflammationem arcete in splenio excepto, integere ac tueri oportet.

Post excoriatoriorum usum

AAaa ij

Papulis in mento eruptibus medicamenta congruentia.

Lichenū remedia scripta a Critone.

Impetigini congruentia remedia.

Lichenas excorians.

**Lichenas exco-
riatos sanantia
medicamenta.**

emplastra uiridia & alba sunt imponenda. Empla-
strum uiride Pamphili ad lichenas. Ceræ libram.
æ ruginis rasæ, quadrantem, resinæ phrycæ, lib. ij. olei
cyathos. iij. aceti acerrimi quod sit satis. Conficito ut
decer. Viride Herophili. Æ ruginis drach. ij. man-
næ drach. iij. adipis uitulini drach. xij. chalbani drach.
iij. cere drach. lxxx. resinæ drach. xx. aceti quod sit satis.

Emplastrum album, quo Magnus circulator est
usus ad excoriatos lichenas. Lithargyri, ceræ Tyrrhe-
nicæ, sing. libram. j. olei sextarium. j. cerussæ lib. j. aque
sextarium. j. conficito. Aliud. Lithargyri, cerus-
sæ, plumbaginis lotæ, sing. drach. xxv. cere, terebinthi-
næ sing. drach. xvj. olei heminam. j. aquæ tantundem.
conficito.

Compositio Menecratis squamas de-
cidere faciens, & corpora attenuans. Picis brutiæ pel-
lucidæ, siccæ, & electæ, drach. ij. S. resinæ pinus pellu-
cidæ, lib. j. & quadrantem, ceræ ponticæ tantundem.
chalbani quadrantem. aceti heminam unam. Confi-
cito diligenter.

Heraclidæ Tarentini ad capitis
& menti ficosos tumores. Elaterij salisq; pares por-
tiones confundito utitorq;.

De dentium affectibus.

**Dentes dolere
& pulsare.**

E Quidem in me ipso manifestè aliquando percepî,
non dolentem modò, sed etiam pulsanter dentē;
quemadmodum carnosæ partes inflammatione uexa-
tæ consueuerunt. Quare mirabar sanè, q̃ in dente ori-
ri inflammatio posset. Atqui quum etiam alio tempo-
re dentem dolerem, perspicuè sensi, non ipsius dentis,
sed gingiuarum inflammatarum, eum dolorem existe-
re: ita ut etiam citra coarctationem dolerent, ob uici-
nitatem tamen durorum dentium illis inaueretur do-
lor. Vtriusq; itaq; doloris sensum expertus, alium qui-
dem in gingiua, alium in ipsius dentis substantia esse,
clarè scio. At uerò, & quòd neruus quidem ad ra-
dicem dentis substratus aliquando etiam doleat, im-

ponat autem nobis, ut credamus ipsum dentem dolere, consentaneum rationi est. Etenim quod dente exempto remaneat adhuc exigua quædam portio doloris, id ob nervi inflammationem contingit: quum nimirum tunc dolor nervi leuior tantum reddatur, eo quod non amplius ab osse, cui cohærebat, tendatur: & quod iam liberius perspiret, fruaturque medicamentis quæ illi adhibentur. Neque enim per contactum, neque per distributionem possibile fuerit inflammato nervo mederi, utrinque à dentium locellis coarctato, & ab anteriori parte ab ipso dente. * Iam uero quum liuidi tota substantia sua interdum reddantur nervi, nihil mirum sit, si phlegmone simile quid patiantur. Cui rei hinc maior accedet fides, quod tum nutriantur, tum augeantur per totum ferè ipsius uitæ curriculum: id quod euidenter sæpenu- mere in his dentibus liquet, qui sunt exemptis oppositi: utpote qui semper augescunt. Siquidem quantum augentur dentes, tantum in ciborum læuigatione atteruntur. Quum igitur illis absque nutrimento augeri non liceat, utique duabus affectionibus, & his contrariis, obnoxii erunt, inopiæ scilicet & redundantiaæ alimenti, quod ipsis suppeditatur. Inopia ergo, aridiores & tabidiores, atque ob id tenuiores eos efficit: redundantia uero, cõsimilem in eis excitare affectionem potest, qualis est circa carnosas partes phlegmone: ac proinde curandum est, ut redundantia euacuetur, partim discutiendo, partim eam repellendo. At tenuitatis dentium ob alimenti inopiam, nullum remedium est: quum tunc necessariò laxentur, moueanturque: nempe compage ipsorum laxiori reddita, ob tenuitatem non modò dentium, sed locellorum etiam eos amplectentium. Hæc itaque affectio senibus accidit citius aut serius, ueluti etiam magis aut minus. Quæ uero phlegmonem refert, magis iuuenes corripit. Auxiliari tamen etiam oportet senibus, auxilio gingiuis adhibito. Eas autem astringen-

A Aaa iij

Dentes interdum nonnihil simile inflammationi perpeti.

Dentes augeri et nutrir, quod liquet ex his qui sunt exemptis oppositi.

Dentes duabus sunt obnoxii affectionibus.

Dentium tenuitatem ob alimenti inopiã esse incurabilem,

tibus medicamentis robustiores, & magis circa dentem astrictas facere conuenit: tanquam ipsæ ad stabilitatem & firmitudinem dentium, aliquid etiam conducant. Porro forantur dentes ab humorum acrim & erodentium influxu, quemadmodum etiam cutis citra externam causam solet exulcerari. Verum cutis exulceratur assidue & multis: ossa autem rarius, quod ob duritiem ægrius quam cutis ipsa patiantur. Igitur corporum erosorum medela, erit resiccatio uitii influentis humoris: qui si paucus fuerit, per localia exiccantiaque auxilia absumeretur. Si uero multus, uniuersi capitis prouidentia est habenda: quod quidem si ob uniuersum corpus affectum sit, huic etiam est prospiciendum. Etenim erosos ob mollitudinem dentes, duriores impatibilioresque per austeram & acerbam medicamenta reddendi sunt. At liuidos redditos, per siccantia curare oportet, ut qui ex uitiosorum humorum influxu id patiantur: unde similem cum foratis curationem desyderant.

De gingiuarum medela.

Gingiuas inflamas oleum lentiscini per sanat.

Gingiuis ex inflammatione dolentibus optimum pharmacum est oleum lentiscinum recens, calfactumque in duplici uase, atque ore retentum. Repellit enim citra molestiam, discutitque absque mordacitate, cuius rei inflammationis precipuus est usus.

Dentium doloribus medicamina ab Archigene prodita.

Quæ Archigenes ad dentium dolores conscripsit. **D**olentes dentes colluant acrim aceto calido cum galla. Aut pinguibus tedis in aceto feruefactis. Aut myrti ramulis cum pice in aceto tepelactis. Aut hyoscyami cum aceto. Aut agrestis cucumeris radice, uel marrubio, singulis cum aceto, pipere, & nitro. Aut pulegii decocto. Mirifice facit dens caninus ustus & tritus, deinde cum aceto coctus & ore retentus. Aut scillam, aut radicem hyoscyami in aceto coctam colluito. Aut pyrethrum cum hyssopo, & colocynthidis medulla similiter con-

quito, liquoremq; ex eis longo tēporis spatio in ore teneto. Hæc Archigenes. Porro solanum, stupefaciendo sensum duntaxat, auxiliatur dentium doloribus.

Ad foratos atq; dolentes dentes remedia ex Archigene. Sory Aegyptium resina terebinthina exceptum obline, indeq; intra dentis cauernulam.

Foratorum atq; dolentium dentium remedia.

Aut senectam anguis dentibus apprimito, & exci dent. Aut uermes terrenos tostos cauernulæ præmundatæ inspergito. Aut piper, uel roris marini semen, opio exceptum, in cauernulam inde. Aut in aurem denti uicinam oleum sesaminum, in quo uermes terrestres concocti fuerint, instilla. Ipso aut dolente dente hyoscyamū conterant. Erosi etiam atq; dolentibus dentibus, candens admoueto cauterium. Præstat ad eliciendam pituitā, staphidem agrestem per se, & cum pulegio manderē.

Fomenta ad dentium dolores extrinsecus fiunt ex sale & milio, simul & torrefactis, & coniectis in sacculos. Dolenti autem denti affricetur origani ramulus, oleo feruido intinctus. Aut opopānacem & peucedani succum unita, linteolo illigato, & intra oleum feruēfacta, denti dolenti apprimito. Aut bene contento, & hiare iusso, hyoscyami semina in suffimentum adhibe.

Ad eximendos absq; dolore dentes. Pyrethrum acerrimo aceto ad dies quadraginta condito, terito, & reponito. Vsu uero exigente, reli-

Dentibus eximendis citra dolorem remedia.

quis cera obturatis, dolentem ipso pharmaco integito. Deinde hora interposita, digitis extrahito, aut scalpello exigo. Dentes educunt fortiter tithymalli succus, & fori, cum chalbano imposita. Apollonius

autem radicis betæ succū per se iubet instillari in nares; ad soluendum dentium dolorem.

Eiusdem, ne erosi dentes uacillent, ne ue fœtorem edant, remedium.

Dentium fœto si remedium.

Veratrum nigrum erui magnitudine melle cocto exceptum, cauernis inde. Eiusdem ad den-

Dentifricium
optimum.

Dentes confir-
mans remediū.

Dentes promi-
nētes exten-
di ratio.

378 GAL. PERG. DE COM.

tes denigratos optimum dentifricium. Alabastrite
usti, drach. viij. pumicis usti, drach. iij. salis torrefa-
cti, drach. iij. tritis utitor. Ab horum usu collutione
utendum est, ex uino odorato, in quo ad multū tem-
pus iris sicca fuit macerata.

Asclepiadis reme-
dium ad dentes motos. Cornu cerui usti, drach. viij.
Rhois rubri, drach. iij. omphacij drach. ij. balaustrij,
drach. iij. corticis pinus, myrrhæ, sing. drach. j. tritis
utitor. Collutio eiusdem ad molarium dolores.

Radices smyrnæ cum aceto mulso coquito, & exco-
latum liquorem ore tenendum dato.

Ad erosos
dentes præseruatium. Zingiber cum aceto mul-
so coquito, ac probè terito, indeq; in cauernam indi-
to, forisq; dentem ex eo integito.

Aut hederæ la-
chrymam chalbano misceto: aut tithymalli, uel ficus
syluestris succo dissoluito, ac utitor.

De mobilibus & prominentibus dentibus.

Vbi dentes absq; ictu præcedente mouentur, ue-
risimile est, neruos radicibus eorum adnatos,
præ nimia humiditate laxatos esse: ob idq; siccantibus
medicamentis eis esse opus. Quum autem emoti den-
tes prominentiores sint reliquis, præcipuè ubi ex pla-
ga mouentur: sanè semper optimum iudicaui fore, si
sic affecti, in tantum attererentur lima, quantum su-
per reliquos prominent: idq; ne oppositos sibi offen-
derent, in loquendo, mandendo ue: quod consilium
semper mihi satis feliciter cessit. Oportet autem gin-
guis linteolum molle usq; ad radices dentium cir-
cundare: dein digitis sinistræ manus leniter ample-
cti, simulq; tutè, & citra compressionem, ne concutia-
tur cui limulam adhibemus, chirurgiam ipsam aggre-
di: eamq; non una uice absoluere, sed pluribus. Im-
perandum etiam est ægro, ut nec loquat, nec durum
aliquem cibum accipiat: utatur autem alimento suc-
co prisanæ, & forbitione ex alica, & pane madido.

atq; alijs id genus mollibus. Ad firmandos dentes, ex Archigene. Myrrhæ, pompholygis, aluminis scissi, amyli, æquales singulorū partes tritas admo-
ue. Postea asininum lac colluant calidum, aut acetum, aut uinum, in quo malicorium & galla sint co-
cta. Ad dentium autem stuporem portulacam

Dentium stupori
portulaca auxi-
liatur.

manducent. De dēitione puellorum, eiusdem. Dentienti infantulo, si doluerit, canino lacte gingi-
uas obline. Aut si leporino cerebello gingiuas eius il-
le ueris, cito dentes prouenient. Mulcet gingiuas do-
lentes acetum cui hyoscyami radix incocta fuerit.

Dentitioni pue-
rorū congruen-
tia medicamen-
ta.

Quod si enascens dens ægrè erumpat, & compūgat
gingiuam, cyperum ex butyro & unguento susino iu-
xta exortum illinito.

Dentes præser-
uantia contra
erosionem.

Præseruatiua dentium ab Archigene prodita. Alumine scisso & modica myr-
rha confricato, nec erodetur unquam. Aut iridem
Illyricam mandito.

Compositio Andromachi eadem hora dentium dolorem sedans. Piperis, py-
rethri, succi tithymalli, chalbani, sing. drach. j. chalba-
no excepta in cauernam indito.

Alia. Seminis hyoscyami, opij, nitri, myrrhæ, pyrethri, piperis, sing.
drach. j. chalbani drach. ij. tritis ex uino utitor.

Collutio ad motos dentes, Critonis, Lentiscum, myr-
tum, gallam, in uino cocta colluenda præbeto.

Eiusdem ad corrosos dentes. Capparidis radicem cum
acri aceto ad dimidias coquito, & colluito tepidum.

Dentifricium ad gingiuas madore laxatas, pu-
trescentes, & cruentatas, concussos dentes, ozænas,
parulidas, dolores, & omnia oris ulcera. Perdicij re-
centis drach. x. mellis, aluminis scissi, iridis Illyricæ,
sing. drach. iij. piperis albi drach. viij. nigri, drach. iij.
pumicis, pyrethri, hyssopi, pulegij, fenninis apij, sing.
drach. ij. myrrhæ, menthæ siccæ, herbæ sideritidis, sin-
gul. drach. iij. salis fossilis drach. iij. Perdicium, fide-
ritidem, mel, & salem, mista urito: alumen uerò per

Dentifriciū ad
omnia gingiua-
rum & oris ul-
cera faciens.

380 GAL. PERG. DE COM.

Dentifricium
insigne.

se ustum uino extinguito: dein omnibus simul contu-
sis utitor. Smegma dentes reddens candidos,
eosq; ab erosione defendens, oriq; bonum odorem
concilians. Nitri, testæ sepiæ, myrrhe, sing. vnc. j. tri-
tis utitor. Aliud ad idem. Aluminis scissi sexun-
cem, mastiches, vnc. j. comæ rosarum, quadrantem
iridis trientem. Tritis utere, indeq; aquam tepidam
colluendam præbe.

G A L E N I P E R G A
M E N I, D E C O M P O S I T I O
N E P H A R M A C O R U M S E C U N
dum locos, Liber. VI.



Inuentionē ra-
tionalē auxi-
liorū præstare
illī quæ soli ex
perientia inni-
titur.

Inflammatiois
causa, & cura-
tio.

VANVIS PLVRIMVM
interest, ex uiua ne aliquis uoce, an
ex libris discat, non tamen paruum
commodum studiosis ex commenta-
rijs accedit: ob idq; ad hosce conscri-
bendos me accinxi: quum rationa-
lis auxiliorum inuentio præstet illi, quæ soli experien-
tiæ innititur. Igitur in stomaticis pharmacis, de quibus
agere in præsentī commentario est animus, primus
medendi scopus est communis omnium partium in-
flammatarum: secundus autē, proprius illius cui me-
demur. Porro inflammationes, ex influxu calidi san-
guinis fiunt, qui repellendus est, nisi uereamur ipsum
ad partem aliquam principem recursurum, atq; illic
grauiores aliquem morbum excitaturum. Vtimur
igitur uenæ sectione, & purgatione & clysteribus, et
inedia, ubi totum corpus plethoricum, aut cacochy-
mum extiterit: Si uerò neutrum sit horū, statim pro-
peramus ad curationem per localia remedia. Impos-
sibile autem est, pharmaco rite uti eum, qui uim ip-

sius non cognorit, secundum quam auxiliatur. Por-
rò medicaminum repellentium genus, quibus uti-
mur in principiis inflammationum, in materia refri-
gerantium consistit; quorum sanè ea quæ astringen-
di natura prædita sunt, efficaciorum vim habent, ad
ocys repellendum influxum. Inest quippe ipsis sta-
tim etiam facultas cogendi & densandi superficiem
corporis cui admoventur. Communis itaq; scopus
in oris inflammationibus est, prohibendi eos dū in-
cipiunt; secundus autem, ab ipsa particula sumitur:
quum sciamus longè rariorem atq; molliorem esse
oris tunicam, cute qua uniuersum integitur corpus.
Taceo tunicam oris, medicamentorū insuauitatem
percipere: posseq; medicamenta ori indita defluere
in uentriculum & pulmones: quorum neutrum cuti
reliquæ adest. Quare fortibus medicamentis, cuius-
modi chalcanthos existit, quæq; uenenosam faculta-
tem sortiunt, uti ad oris affectiones non licet, nisi ma-
gna urgeat necessitas. Ergo succus mororum solus,
recensq; à fructu ipso expressus, ad incipientes oris
inflammationes est melior illo, qui, ut asseruari diu-
tius possit, ex melle coquitur; quanquam ad sequen-
tia inflammationis tempora, utilior est qui ex melle
est coctus. Nam quemadmodum in principio utilia
sunt pharmaca repellentia id quod influit: sic post prin-
cipium usq; ad finem, pharmaco opus est ex utrisq;
misto, repellente uidelicet facultate, & discutiente,
prædito: ac primo quidem tempore, astringens præ-
cellere oportet: ad finem uerò discutiens: atq; inter-
posito tempore æquales utrorumq; partes esse conue-
nit. Quando uerò ueluti induratum quippiam ex ip-
sa inflammatione relinquitur, penitus non conuenit
astringens ad discussorium miscere, * si prius uniuersum
corpus fuerit uacuatum. Similiter neq; in prin-
cipio bonum est discussoria miscere astringentibus.

Astringentium
facultas.

Oris affectio-
nibus cur exhi-
benda non sint
fortia, nec ue-
nenosa medica-
menta.

Oris inflama-
tionibus quæ
opulent me-
dicamenta.

Digerētibus so-
lis utendum es-
se ubi durities
aliqua ex oris
inflammatione
relinquitur: cæ-
terū prius cor-
pore uniuerso
uacuato.

Croci facultas.
Myrrhæ facultas.

Dia morō me-
dicamen.

Letalia omnia
non esse dele-
teria.

Oris inflāma-
tioni concoctæ
quæ congruāt.

Rubi cremor.
Stomatici ex
succo nucū ui-
ridium, ad oris
inflāmationes
conuenientissi-
mā, cōpositio.
Nucum succo
uiridium adest
astringitio pene-
rans.

Meritō autem qui pharmacum diamoron cōposuit, parum ex croco & myrrha ei commiscuit, q̄ communem habeant facultatem concoctoriam inflammationum: priuatim uerō, crocus quidē astringat: myrrha autem calfaciat in tantum, ut sufficienter discutiat, tenuium partium etiam substantiam possidens, qua facile in altum subire possit, uiresq; aliorum medicamentorum deducere. Soleo autem ipse in principio ad pharmacum dia moron miscere rhois succum, aut omphacium, aut florem rosarum, aut ipsas rosas ficas, necnō balaustium, cytinis, malicorium aridum, gallam omphacitin, pini, thurisq; corticem, hypocystidem, lentisci succum, ac breuiter astringentia omnia, præter ea quæ corrumpentem possident facultatem, quæ & deleteria dicitur, & letalium species quædam existit: quippe cum non omne letale, necessariō etiā deleterium, hoc est uenenosum, existat. At ubi inflammatio iam constitit, sufficit ad mororum succum addidisse tantum crocum & myrrham, ut ipsa inflammatio coquatur. Quæ ubi concocta fuerit, addere aliqd ex discussorijs licet, cuiusmodi sunt nitri spuma, nitrum Berenicarium, sulfur uiuum, sapia, origano interdum incocto, aut hyssopo, aut pulegio, aut thymbra, aut thymo, aut calamintha hortēsi & agresti. At uerō Erasistratus, quum mororū succus illi ad manum non esset, rubi cremore usus, se ipsum curauit. Ego autem pharmacū ex succo nucum uiridium confeci, facultate ad oris inflammationes cæteris omnibus stomaticis plurimum antecellens. Cuius compositio est huiusmodi. Succum externi nucum uiridium corticis cum mellis iusta portione coquo, donec ex utroq; mellis crassitudo cōsistat. Hinc autem liquet qualis sit eorum corticum succus, quantaq; astringendi uis, q̄ ne per fortissima q̄dem exterioria, nigredo elui possit ab eorū manibus, qui uiri-

des nuces decorticāt. Atq̃ nisi in profundū manuum illa facultas descenderet, non certē agrē eluibilis esset. Quum autem descendat, indicat planē substantiam succi, tenuium partium esse. At rationi est consonum astringēdi uim esse maximē ex usu, ubi in eius modi contineatur substantia: ineptam autem existere, quæ crassarum partium substantiæ est coniuncta. Optimum itaq̃ ac simul suauem esse nucum succum mihi persuadens, cum in quatuor partes diuido: & ad primam statim aliquid ex astringentibus misceo: ad secundam, ex croco & myrrha: ad tertiam sulfuris & nitri non nihil. Quartam uerò solam synceram seruo, ob dulcorem futurā utilem pueris, mulieribusq̃, & uiris effœminatis. Est autē quod ex succo rubi constat, fortius eo quod ex moris conficitur: quemadmodum hoc eo, quod ex musto parat: omnibus tamen præstat quod ex succo fit nucum. Porro in pharmacis quæ deglutiuntur, maximē coniectare oportet naturam eorum qui ipsa sument. Nam quod cum molestia aut fastidiosē accipitur, os uentriculi euerit. In stomaticis autem medicamentis, eiusmodi synceritatem interdum contemnere licet. Si q̃s igitur medium aliquod medicamen cōficere omnibus aptum uelit, ut exempli gratia quod constat ex succo mororum, ad quinque libras succi, unam mellis adiiciat: croci autem & myrrhæ, utriusq̃ drach. j. S. Vini item austeri, heminam unam: omphacij, drach. j. Quod si non adsit, pro ipso rhois succū inijcies: & si uolueris par pondus utriusq̃ imponere, nihil peccaueris. At Hera drachmam unam scisilis aluminis addit. Quod uerò ad coquendi modum spectat, ego sanē censeo succum ipsum solum esse per se præcoquendum usq̃ ad crassitudinem strigmentitiam: dein uerò adiiciendū mel: atq̃ ubi iam cacabum ab igne uelis auferre, reliqua imponenda esse. Etenim ut spuma argenti, & plum-

Astringentē tenui substantiā iunctā, esse maxime ex usu ad repeliendas inflammationes.

Stomatici ex succo nucum quadruplex cōpositio.

Stomaticū ex succo nucū, cæteris uniuersis præstare.

Stomatici diamoron cōpositio apta omnibus.

Aromaticorū
complurū ui-
res, per cocturā
exolui.

Oris induratis
inflammationi-
bus qualia sint
apta medica-
menta.

Oris uigentes
inflammationes
quibus sint co-
quendae medi-
camentis.

Punicorū malo-
rū species tris,
austerorū, dul-
ciū & acidorū.

Stomacū ex
punicorum suc-
co.

Stomacū ex
nucibus deno-
tatum nō esse

bago, aliaq; multa metallica, per cocturam meliora euadunt, sic uis complurium aromaticorum exoluitur. Cæterum ad induratas inflammationes, quū iam præterierit uigor, nec amplius influat quicquam, prædicto pharmaco discussoria miscere oportet, cuiusmodi sunt spuma nitri, nitrum, petrae Asiae flos, sulfurq; uiuum. Ac sufficit sanè nitri vnciam. S. sulfuris vncias duas, si addideris. Quòd si nihil horum sit præsto, in sapa aut mulsā, origanum seruefacito, ipsa mq; stomatico pharmaco adijcito, & gargarizare iubeto.

Nihil autem refert, etiam si hyssopum coniicias pro origano, aut pulegium, aut thymum, aut thymbra, aut calamintem, aut hedyosmum. In uigore autem inflammationum, collutionibus & gargarismis concoquere inflammationem oportet, pinguium caricarum decocto, lentiscinoq; oleo tepefacto in duplici uase. Quin & ipsum stomaticum pharmacum in uigoribus gargarizare cōuenit mulsæ dilutiori permistum, aut calidæ sapæ, aut etiam aquæ calenti.

At meum ex succo nucum medicamentum, aliorū omnium est ualidissimum, utilissimumq;.

Quum autē tres sint Punicorum malorum species, austerorū nēpe, dulcium, & acidorū, equas singulorum partes, unā cū corticibus soleo ipse etiā contundere, expressumq; succum cum melle coquere, ac sic conficere medicamen non solum stomacū, sed ad multa alia utile.

Contunditur etiam cum illis & rubi fructus: cuius succus similiter præparatus succo mororū, melius illo pharmacum redditur, sed minus ualidū eo, quod ex nucum succo paratur. Quin & malorū cotoneorum, & pirorū syluestrium, ac mespilorū succus, similiter præparatus, stomacum pharmaci redditur, aptumq; etiam ut deuoretur: quum hoc quod ex nucibus constat, deuorare non liceat.

Verū quod ex punicis constat pharmacum, aptum est exoluto & cibos fastidienti uentriculo deficit

culo: deficit tamen ab eo quod ex malis constat. Inno-
 cuum est etiam rubi mororum succus uoratus, ueluti
 et ipsorum mororum: sed succus rubi mororum habet
 quid quod stomachum roborat: quod ipsum, mororū
 cremor non habet. Iam uerò succus nucum plurimo
 melle opus habet: & post eum, rubi mororum: modi-
 co autem, malorum, & punicorum, & punicorum syl-
 uestrium. Medius inter hos est mespilorum succus.
 Ex cornis etiam, brabyliis q; & prunis, stomatica pre-
 parantur. Cæterum si crassus esse uideatur succus, sta-
 tim mel admiscere oportet: sin liquidior, precoquatur.
 Suscipit autem pirorum atq; malorum succus parem
 mensuram mellis. Succus uerò eorum quæ nimis acer-
 ba sunt, ueluti est corni fructus, aliquando duplum, ali-
 quando triplum mellis desyderat. Porro si atramentū
 sutorium admistum sit, non admodum deglutire opor-
 tet confectum pharmacum, præter q̃ si iuxta stoma-
 chum, aut aluum, ulcerosam affectionē fieri uereamur.
 Quin & si in ipso ore maligna ulcera fiant, præstant ex
 atramento sutorio medicamenta. Sufficit autem drach-
 ma ad prædictam compositionem admista, in qua unā
 mellis libram coniñci dicebamus. Iam uerò quū rhus
 sit duplex (alter enim obsonijs inspergitur, stomacho
 cōmodus: altero coriorum tinctores utuntur) uterq; sa-
 nè musto incoctus, stomaticum efficitur medicamen.
 Mustum etiam solum, citra mellis misturam in mellis
 compagem redactum, bonum sit pharmacum in prin-
 cipijs, augmentis, atq; uigoribus. Ad declinationem
 autem præstiterit, si in ipso diem integram tēdas pin-
 gues p̃maceraueris. Quod si preciosius efficere phar-
 macum uis, inñcies etiam cassiæ corticem, aut nardum
 Indicam, aut malabathri folium: singulorum nempe
 unam drachmam. Ad induratas autem inflammatio-
 nes, coniñciuntur quæ generosius discutere possint, tu-
 sa uidelicet, & cribrata, idq; ubi olla ab igne est exem-

Rubi mororū
 succus os ven-
 triculi roborat
 id quod succo
 mororum non
 inest.

Succorum qui
 nā plus, & qui
 minus requirāt
 mellis.

Calcanthō qñ
 stomaticis mi-
 scere expedit
 medicamentis.

Rhus duplex.

Musto qñ &
 qualiter prepa-
 rato utendum
 in oris inflām-
 tionibus.

Discutientia
pharmaca que
nam sint.

Stomatiki ex
multo compo-
sitio.

Inflammationi
incipienti, au-
steriora, vigēti,
moderatiōra,
inclinanti, ma-
gis digerentiā
conueniunt.
Astringētia pa-
ratu facilia:
Digerētia me-
diocriter.

Digerentiā va-
lenter.

pta. Ac talia sanè sunt costus, amomum, macer, cyre-
naicus succus, Medicusq; Pauperibus tamē pro sum-
ptuosīs discussořijs pharmacis, aut dictamnū, aut aco-
ron, aut meon, aut pyrethrum, aut cardamomum, aut
sinapī iniiciendum censeo, pari pōdere: ita ut ad trium
drachmarum pondus, eorum mistorum moles perue-
niat, ad prædictā symmetriā, in qua mellis libra habe-
batur. Verūm pro cōstitutionis affectuū proportionē
augeri ac minui pharmacorum uehementiam oportet.
Ergo pharmacum conficientes ex multo, ad decē mu-
lta heminas, tres iniiciemus heminas rhois coriariorū,
aut eius qui obsonijs inspergitur. Si uerō utrūq; iniicia-
mus, utriusq; una & dimidia iniiceinda est. Iuxta pro-
portionem etiam, ex discussořijs, quodcūq; tandē in
promptu habeamus. Quōd si unum tantū suppetat
nobis astringēdi uim habēs, quod in principio iniicia-
mus, aut unicum discussorium, quod iuxta finem: ex il-
lo totum pondus explebimus, quod ex omnibus alio-
qui fuisset conflandum. In uniuersum autem, austerio-
ra quidem, in principijs, & uehementibus influxionib;
congruunt: moderatiōra in uigoribus: ut magis
discussoria in declinationibus. Porro ex astringētibus
facilia paratu sunt, rosæ, bacce myrti, myrtus, lētiscus,
rubus, canirubus, galla omphacitis, fructus Ægyptiæ spi-
næ, omnia aluminis genera, unus & alter rhus, glau-
cium, omphacium, cytini, & balauſtia. Ex discutienti-
bus moderatē, faciliē parantur, caricarum fursurumq;
decoctum: aut mulsa, in qua origanum, aut hyssopum,
aut thymus, aut calamintha, aut pulegiū, aut hedyos-
mum concocta sint: quæ si diutius coquantur, fortiora
reddūtur: amplius autem & nītri spuma, aut ipsum nī-
trum uſtum. Fortius uerō his est sulfur uiuum. Rectē
autem Andromachus medicamini ex succo mororum
confecto addidit glycyrrhizam, ut exasperata leniret,
asperitatemq; astringentium mitiorem redderet.

Stomaticū Andromachi ex musto, quo utor. Gallas, xxx. Rhois coriarij sext. ij. musti sext. vj. Gallas confra-
ctas per diem & noctem in musto macerato: dein co-
quito, donec ex toto quarta supersit portio: quam per
lintheolum colatam, expressamq; in olla ad mellis cras-
situdinē spissato: dein trita addito, aluminis scissi, cro-
ci, myrrhæ, sing. drach. j. permista reponito, tandemq;
eis utor. Iam uerò, quod ex dulci confectum est mu-
sto, magis mitigatorium et moderatum erit, sed minus
efficax: id autem quod ex acerbis fit uuis, uehementius
quidem astringit, leniendi uim tamen non habet: ex me-
dio uino paratum, mediam facultatem sortitur.

Stomaticū An-
dromachi ex
musto.

Stomaticum ex Besasa anginis congruens, ab Andro-
macho scriptum. Sem anisi, apij, ammi, floris iunci
odorati rot. aluminis scissi, iridis Illyricæ, besasa (hoc
est seminis rutæ syluestris) cinnamomi, myrrhæ tro-
glodyticæ, aristolochiæ longæ, casia, rosarum siccarū,
crocomagmatis, sing. vnc. j. croci, cineris hirundinum
tenellarum, utriusq; quadrantem. croci sesquiunciam.
nardi Indicæ, amomi, utriusq; vnc. S. gallas. viij. tri-
tis cum melle utor.

Stomaticū ex
Besasa Andro-
machi,

Stomaticum Asclepiadis.
Hirudinū syluestrium ustarū cineris, drach. iij. croci,
nardi Indicæ, utriusq; drach. j. melle excipito.

Aliud Andromachi. ad columellam laxatam, Alumi-
nis liquidi lib. j. florum rosarum, lib. S. succi hypocyf-
tidos quadrantem. Alumen in melle coquito: dein sicca
inspergito: utorq;.

Columellæ la-
xate remediū.

Aliud eiusdem ad omnia ui-
tia oris. Crocomagmatis drach. ij. iridis drach. iij. san-
darachæ drach. S. terebinthinæ, drach. ij. Lycij Indici,
drach. j. uuæ passæ drach. viij. aloes, omphacij, singul.
drach. j. nucum pinearum tostarum, drach. viij. succi
glycyrrhizæ, aluminis scissi, balauftij, sing. drach. j. flo-
ris rosarum drach. ij. mellis hem. ij. S. conficito.

Stomaticū ad
vitia oīa oris.

Stomaticum Asclepiadis. Succi hypocyf-
tidos drach. ij. balauftij, lycij, acaciæ, sing. drach. j. excipito oliuæ im-

Stomaticum
Asclepiadis.

BBbb ij

maturæ succo, & postea melle subactis utitor.

Si uerò eger stomatica id genus fastidiat, in moderatis quidem inflammationibus sufficiet succi soli fructuum iam dictorum, ut rubi, & mororum, punicorumq; malorum, & cotoneorum. Quin & succus nucum ubi cum solo melle paratur, gustui suavis existit; itemq; mustum ex uuis acerbioribus pressum, si rhus in id coniiciatur, optimum pharmacum redditur. Ad eas uerò inflammationes quæ multa astrictione indigent, austerorum punicorum, aut cotoneorum, aut utrorumq; succus, mellis admixtus, sæpe mihi fuit satis. Singulis autem horum succorum licet omphacium adijcere. Vehementissimum medicamen reddetur, si punica integra tundas unâ cum corticibus, indeq; succum exprimas, atq; hoc magis si acerbæ fuerint. Acerbissimum etiam fiet, si ad punicorum austerorum ita tusorum succum, omphacium superaddatur cum moderato melle. Præstantius adhuc reddes pharmacum, si tota contusa punica mala, passo cocta excolaueris. Ne uerò ualde exasperet, glycyrrhizæ succum admiscens, conficies optimum pharmacum.

Acerbissima
stomatica con-
ficiendi ratio.

Induratis infla-
mationibus ap-
ta stomatica.

Glycyrrhizæ
stomaticis ad-
dita, ipsa me-
liora reddit.

Putredo obo-
ritur cito, in ca-
lidis & humi-
dis partibus.

Si quid uerò induratum appareat, his succis qui medias facultates fortiuntur, iniicies aliquid, dum coquuntur, ex pulegio, aut thymo, aut origano, hyssopo, mintha, aut calamintha; dein colabis, & habebis optimum medicamen. Quod si calidius efficere uelis, piper addes. Omnibus tamen si glycyrrhizæ succus addatur, melius pharmacum efficietur.

De crustis.

IN calidis & humidis corporis partibus, qualis est os, ex quacunque tandem causa fuerit exulceratum, cito putredo oboritur. Ad cuius ulcera fortissimis sæpe uti cogimur medicamentis. Atqui fortissima sunt, quæ escharam instar catuterij excitant. In externis igitur corporis partibus, ubi parti curandæ crusta fuerit inducta, à fortibus supersedemus pharmacis, transgre-

dientes ad deterforia, quæ escharas tollunt. In his uerò quæ in ore excitatæ sunt, escharis, tutius mihi uidetur esse admiscere ad exteriora pharmaca, alia quædã fortiora, & quæ per se admora, crustas etiam inurerent. Melli itaq; maxima extergendi ui prædito, crustifica medicamenta immiscemus: quemadmodum ad sordida quæ in corporis cuticula oriuntur, miscere illi leuiter extergentia solemus, ut thus, eruum, iridem, aristolochiam, & alia id genus. Porro Andromachus, ad oris crustas, ex nucibus pineis, amylo, alumine scisso, flore rosarum, croco, & melle, composuit optimum stomaticum. Critonis ad oris crustas medicamentum.

Misyos torrefacti, drach. iij. mellis optimi cyathos sex. misceto & utitor. Idem etiam præstat chalcitis assata cum melle. Archigenis ad crustas oris remedia.

Cõmodissimum est stercus canum, aliorum osibus, ex melle illitum: quod etiam in angina auxiliatur. Aut rhus Syriacus ex melle. Aut hirundinum ustarum & stercoreis humani par modus cum melle illitus. Aut hepatis lupi aridi cochlearia duo trita bibenda dato.

Ego uerò medicamẽ ex rhoe damno, q; astringẽtis sit facultatis, quæ minimẽ crustis conuenit. At hepar lupinum eupatorio mistum, ad hepaticas etiam hibitur affectiones. Sorani stomaticũ ad crustas, foetẽtesq; gingiuas & humore pregnantas. Misyos usti, drach. viij. iridis Illyricę, drach. iij. croci drach. j. Trita in pyxide lignea reponito, & tum per se, tũ ex melle utitor.

Aliud nomine Anthera. Iridis Illyricę, sandarachę, cyperi, sing. drach. iij. aluminis scissi, croci, crocomagmatis, sing. drach. ij. tritis & mistis utitor.

Stomaticum Heraclidis Tarentini ad uehementes putredines oris atq; reliqui corporis. Chalcitidis partem. j. calcis uiuæ tantundem. auripigmenti partem dimidiam: tritis & mixtis utitor. Aliud. Florum rosarum, drach. iij. aluminis scissi, gallę, sing. drach. ij.

BBbb iij

Oris pustulis extirpãdis, miscenda exterioris esse uehementissima pharmaca, & quæ per se, admota, excitare possent escharas.

Oris crustis de lãdis remedia uaria.

Crustis nõ cõuenire astringẽtia.

Hepar lupinũ confert hepaticis. Stomaticum Sorani.

Anthera.

Cauterio vten-
dum in putrila-
ginosis oris vl-
ceribus, ubi re-
liqua i cassum
administrant.

myrrhæ drach. j. trita melli misceto, utitorq;. Qui-
dam sale macerato in aceto, resiccatoq;, utunt. Si hæc
remedia putredo ipsa respuat, utendū cauterio est: po-
stea uerò colluendum ulcus p̄dictis, imponendaq; an-
thera, donec crustæ abscedant.

De columella.

Columella,
Gargareon
Cion.
Columna.
Staphyle.
Columellæ in-
flammatae cu-
ratio.

C Aruncula illa quæ ad extremum oris dependens
cernitur, à ueteribus quidem gargareon, & cion,
hoc est gargulio et columna: à neotericis autem cionis,
hoc est columella, uocatur: cuius sanè affectionē quan-
dā, staphylen, hoc est uuam, dicimus. Raro tamē affe-
ctio hæc circa columellam contingit: licet ea sæpe in-
flammeur. Et sanè quemadmodum in alijs omnibus,
in quibus ex humorum influxu contingit morbus, sic
etiam hîc prima auxilia debēt fluxionem ipsam repel-
lere: quare astringentis sint facultatis oportet: uerū
si quidem influxus sit moderatus, moderatè astringen-
tis, quam priuatim austeram uocant: si uerò uehemen-
tior, acerbæ. Ambæ quippe facultates astringunt,

Acerbæ & au-
stere facultates
vt differant.
Collutiōes mo-
deratæ ex qui-
bus fiant.
Collutiōes val-
de astringētes.

sed debilius austera: uehementius acerbæ. Porro mo-
deratæ collutiones fiunt ex palmularum, rosarum, pā-
pinorum uitis, rubi, canirubi, aspalathi, cyperi, cytino-
rum, filiquarum, radicum mori, hypocisthidis, malo-
rum austerorum, pirorū acerborum, ac sorborum de-
cocto. His sortiora sunt myrti, & baccarum eius de-
coctū, & ex acerbis contoneis malis, et uirgultorum te-
nerorū ilicis, arbuti, smilacis, phagi, & ipsarum glan-
dium: mespilorum item, & cornorum, & fructus me-
mæcili. Generosissimum autem est decoctum galla-
rum, & rhois culinarij, & coriarij, fructusq; myricæ, et
Egyptiæ spinæ. Ex his singula tū per se, tum etiā mix-
tū cocta ex aqua, gargarissare oportet. Mirum enim
q̄ mixturæ ipsorum utiliores sæpe fiunt ipso simplicij
usu. Quin & arida etiam columellæ insperguntur. Iam
uerò moderatè astringunt etiam lapis Ageratus, aloë,

Miscellæ me-
dicaminū ali-
qñ esse utilio-
res simplicium
usu.

cyperus, flos iunci odorati, radixq; nardi Indicæ. Exi-
miè astringūt omnia aluminis genera: scissum uerò in-
ter ea tenuiorum est partium, & ob id utilius. At atra-
mentum sutorium uehementem astringendi uim possi-
det: non est tamen expers calfactoriæ: ob idq; putrila-
ginosis ulceribus conuenit. Cæterum gurgulionem
exasperat, etiam si iam scirrhum contraxerit. Corrum-
puntur autem succi omnino, si absq; melle reponantur:
aut resiccantur si plurimum fuerint cocti. Nonnulli
tantam ariditatem asciscunt, ut conteri queant. Tales
sunt hypocisthidis, uuæ acerbæ, glycyrrhizæ, & cen-
taurij succus. Ridiculum autem est quærere, inter duo
eiusdem generis pharmaca, utrum sit ipsorum præstan-
tius. Omnia siquidem medicamenta respectu ad aliqd
tum utilia, tum noxia dicuntur. Quocirca si pronuncia-
ueris pharmaca nihil esse sola per se, rectè dixeris: nihil
enim sunt, nisi nacta fuerint utentem rectè. Si uero con-
trà, pharmaca Deorum esse manus fatearis, similiter re-
ctè dices. Iuuant quippe maximè, si is qui eis utitur, in-
rationali methodo fuerit exercitatus, atq; natura pru-
dens. Porro mistura pharmacorum eiusdem generis,
mediorum pharmacorum usus fit gratia: ob idq; semp
duo contraria medicamenta in unoquoq; affectu uos
habere operæpretium duco: quæ quidem permiscēdo,
multis pharmacis abundabit. Quum autē rarò quis
affectionem inueniat, quæ (exēpli gratia) solis discusso-
rijs, aut repulsijs indigeat, cogimur etiā sæpe diuer-
si generis medicamenta miscere: quemadmodum ubi
cum repellentibus aut anodynis discussoria confundi-
mus: ut si gurgulione inflammato, ad alumen iridem
misceamus illyricam, aut farinam eruinam, aut thus,
aut myrrham. Etenim quum discussoria sint mul-
ta, est semper à mitioribus auspicandum: quandoqui-
dem inflammata exasperantur ab acribus. Quæ
Archigenes scripsit ad gurguliones inflammatos.

BBbb iiii

Aluminis om-
nia genera exi-
miè astringunt:
Chalcanthi fa-
cultas.

Medicamenta
omnia respe-
ctu ad aliquid
tum utilia tum
noxia dici.
Pharmaca ni-
hil sunt sola
per se.
Pharmaca esse
deorū manus,

Discussorijs
mitioribus cur-
fit in principiis
utendū ubi di-
gere est op^o.

Gurgulioni in-
flāmato reme-
dia secundum
Archigenem.

Gurgulionis
affectū curatio
secundum Hip-
pocratem.

Gurgulionis
inflammati cu-
ratio secundum
Archigenem.

Tonsillarū in-
flammatarū cu-
ratio secundum
Archigenem.

Vua laxata, succū cyrenaicū dissolutū illine: aut gallam tritam cum sale: aut ipsum sal dissolutum: aut lycij radicem tritam: aut omphaciū cum melle. Si fortius medicamentum uis, Atramenti sutorij, squame æris, aluminis scissi, misyos, myrrhe, galle, æquas partes tritas, ac uino exceptas illine. In principio tamen, sale nō est priuatim utendum, sicuti nec cyrenaica lachryma: sed ubi columellæ inflāmatio indurata iam fuerit. De gurgulionis aut inflammatione sic Hippocrates differit. Gurguliones cum periculo excinduntur, uruntur, ac resiccantur, quādiu rubri fuerint & magni: quo tempore alijs artibus graciles sunt reddendi. Quum uerò totum id quod appellāt uuam, abscesserit, extremum autem gurgulionis maius, liuidumq; redditum fuerit: superior uerò pars tenuior, tunc sanè intrepidè curationi admoliendæ sunt manus.

Quæ scripserit Archigenes ad uigentem inflammationem gurgulionis & tonsillarum.

SI uerò in uigorem affectio peruenerit, subducatur aluus, aut calidam lotionem furfurum gargarisset, aut ptisanæ succum, aut passum tepidum, aut radicis dulcis decoctum cum passo, & hyssopo, aut ficus uino incoctas, aut succum ptisanæ, in quo uuæ sint passæ incoctæ. Magnopere iuuātur, si amygdalinum oleum in aures infundens, forinsecus spōgij expressis leniter foueris. Quin & omelysis ex cruda hordeacea farina imponenda: aut ex farina seminis lini aut fœnigræci.

Quòd si iam prope ad suppurationem accedere tonsillæ uideantur, coadiuuare assiduè per ficuum decoctū oportet, p̄p̄modumq; incessanter id gargarisma exhibere, similiterq; aquam mulsam calidam. At si nihil tale apparuerit, auge scat autem malum ita, ut ægri uis transglutire possint, ac suffocationis principium sit nobis suspectum, aluus forti clystere, aut glande subducenda est, & secanda cubiti uena, cucurbitæq; cū sca-

rificatione collo ac mento affigendæ. Fomentis etiam & cataplasmatibus robustioribus est frequentius utendum, gargarismisq; assiduis. Quod si ne his quidē remediis mitescat morbus, sed augeat indies, uenæ sub lingua secentur, aut iuxta angulos oculorum, atq; illa quæ in fronte consistit. Illinatur autem assiduè fel tauri, & elaterium cū melle: aut sal cum oleo ueteri, mel leq; & aceto: aut cētaurea cum melle: aut absynthium cum nitro & melle.

Heræ medicamen ad collumellam laxatam. Gallæ omphacitidis, aluminis scissi, salis ammoniaci, sing. pares portiones conterito, inspergitoq;.

Vel Ageratum lapidem derafum in pollinem similiter columellæ imponito. Porro Heraclides Tarētinus rectē sanè post usum medicaminum exacerbantiū, iubet colluamus fauces lentium decocto, ad tollendam uehementem illam astringentium aspredinem.

Ab Asclepiade prodita. Rosarum siccarum sextarium. j. nardi Celticæ unā cū radicibus, & adhærente terra, fasciculum. j. nidi hirundinum syluestrium aridi, drach. iij. myrrhæ drach. viij. gallas omphacitidas numero. xv. contusa & trita digitis apprime. Est enim hoc mistæ potētiae pharmacum.

Aliud. Piperis albi, myrrhæ, sing. drach. j. aluminis scissi drach. ij. gallæ omphacitidis tantūdem, trita admove. Hoc tamen utendum non est in gurgulione uehementer rubente.

Aliud eiusdem facultatis, quo & nos sumus usi. Lapidis agerati, Asix petreæ, terræ samix, sing. drach. iij. aluminis scissi, croci torrefacti, gallarum omphacitidum, singul. drach. ij. tritis utitor.

Critonis medicamentum digerens. Osium palmarum, rucū tenerarum immaturarum, siccarum, ntrarunq; drach. iij. Vrito atq; in puluillum terito, utitorq; arido admoto.

Aliud Sorani, maximè mitigatorium, ac proinde conuenientissimum ad uigentes inflammationes. Glycyrrhizam contundito, &

Venæ sub lingua, uel iuxta angulos oculorum, inflammationis tenillis, quæ incidenda.

Columellæ laxatæ medicamen Heræ.

Faucibus inflammationis remedia ab Asclepiade scripta.

mel & aquam pari mensura affundito: dein coquito, & liquorem ipsum gargarizandum præbeto.

De pharmacis ad ulcera oris

aphthas appellatas.

Aphthæ sunt oris ulcera, præcipue inuadentia infantes. Aphtharum cura tunc per moderate astringentia.

Aphthis uaria remedia a uariis descripta.

Vlcerationes in superficie oris obortas, aphthas appellant, habentes quippiam igneæ caliditatis. Fiunt autem plurimum pueris lactentibus, quum aut uitiosum fuerit lac nutricis, aut non probè ipsum concoxerit infans. Curantur facillè, utpotè quæ uel à moderate astringentibus compescantur. Quandoque tamen diuturnæ fiunt, ægreque solubiles, & progressu temporis nonnihil putrilaginosum acquirunt: atque hæc sanè fortiora medicamenta postulant.

Andromachi medicamen ad aphthas malignas. Aluminis scissi, usti, drach. ij. fructus ericæ, drach. j. oleo excipito, & per digitum locis apprimito. Eiusdem ad aphthas leuiiores. Lycium Indicum uino tritum circumlitum, & ericæ fructus tritus, aut rosæ siccæ cum melle, auxiliatur.

At Crito, adipem suillum, & mel, simul liquefacta, commendat: ut collutionem etiam ex asinino lacte, manducationemque portulacæ intinctæ melle: quæ oia & simplicissima sunt, & pueris maximè idonea.

Quæ scripserit Apollonius ad aphthas.

Ad aphthas albas, chalcitidem oleo tritam penna illinito. Postquam uerò puræ factæ fuerint, myricæ fructum tritum, aut aqua mulsæ, aut uino dilutum, illinito, maximè infantibus. Ad nigras aphthas, uuam passam exacinatam, & anisum, trita cum melle illinito. Vel atramento sutorio trito cum melle utitor. Vel æruginis uermiculatæ, obolos. iij. in uini quarta hemina parte gargarizandos præbe. Vel muriam oliuarum & acetum pari mensura mista, colluenda dato. Mandenda sunt etiam oliuæ muria conditæ. Hæc Apollonius. Etenim oliuæ sic asseruatæ, discutiunt atque uehementer astringunt.

Oliuæ muria conditæ discutiunt & uehementer astringunt.

Quæ Archigenes ad aphthas scripserit.

AD aphthas faciūt collutiōes ex decocto foliorum oleæ, aut myrti albæ. Facit & amurca, & marrubij succus, aut lētis decoctū. Aut fæx uini dulcis cum melle illita. Sūmè facit ad depascētes, fæniculi radicis ustæ cinis. Porro ex colore ipso facilè licebit colligere qui nam humores ipsas aphthas pduxerint. Rubicundiores siquidem, sanguinem præcellere indicant: flauiores, amaram bilem: albescētes, pituitosum humorem: quemadmodum nigrescentes, melancholicum succum. Qui autem hæc rite discreuerit, noueritq; facultates singulorum medicamentorum simplicium, is unicuiq; aphthæ speciei, proprium sciet administrare remedium. Expendet autē simul ipsas naturas corporum. Fortioribus quippe corporibus fortiora medicamenta adhibenda sunt: debilioribus imbecilliora. Ego porro infantibus qui adhuc à nutricibus alūtur, lentem cum modico pane, & medulla cerui, aut uituli exhibeo. Admisceo etiam cibus nonnihil ex astringentibus fructibus. Quādoq; etiam de lactuca, seride, solano, & portulaca coniicio aliquid, si aphtha sit inflammata. Quod si cibum assumere nequeant, nutricē eiusmodi uictu alo, utq; concoquat rectè, prospicio. Veruntamen etiam infantes illino, si quidem subrubras uidero aphthas, in principio quidem, ijs quæ moderatissimè astringunt, & frigefaciūt: deinde uerò, eis quæ citra mordacitatē discutiunt. Si uerò sufflauas uidero, iisdem utor, sed magis refrigerātibus. At si pituitosiores, astringentibus: ut si nigrescentes, discussorijs generosioribus. Cæterum in maioribus pueris, eiusdem generis facultatibus pharmacorum utor, auctis tantum ipsorum uiribus: quemadmodum etiam in perfectis & duris corporibus, singulis relatis facultatibus fortissimis utor. Suffecit autem mihi in his per omnia mihi usus cum uino astringente, quod tum intendit, tum

Aphtharū causas ex colore dignoscendi ratio.

Fortiora corpora ualidioribus egent medicamentis: ut imbecilliora mitioribus.

Aphtharū quæ infestant infantes, curatio.

reniittit uim suam, prout magis aut minus uinum fuerit astringens: & prout crassius aut liquidius efficitur pharmacum ex misyos ac uini mistura. Quòd si sordida appareat aphtha, misy cum uino mulso tero. Iis uerò qui fortiora quàm misy, medicamenta postulant, ærugo similiter dissoluta, est utilis. Commodum est etiam pharmacum ad hanc rem, chalcitis oleo trita. Atque hæc quidem efficaciora. Moderata uerò, & maximè ad incipientes affectus, omphacium cum uino, & cœnomelite: similiter etiam rhus. In pueris sufficit rosarum flos, & ipsæ etiam rosæ siccæ. In summa uerò, moderatæ aphthæ, maximè in corpibus teneris, moderatis pharmacis opus habet: fortes uerò, & maximè in duris corporibus, curantur à ualidioribus. Fortia pharmaca intelligo, tum quæ astringunt uehementer: tum quæ etiam mordicant: sicuti moderata, quæ prorsus sunt mordacitatis expertia, nonnihil quæ astringunt. Porro oleum per se, infestissimum est aphthæ affectui: ueluti etià chalcitis: quandoquidem alterum quidem humectat, & sordes gignit: mordet autem uehementer chalcitis.

Aphthæ moderatæ moderata medicamenta desyderant: ut maligniores, fortiora.

Aphthis fit optimum medicamen ex chalcithide & oleo moderate commixtis. Sarcoticum optimum fit ex cerato & ærugine.

Verum moderata mistura ipsorum, optimum pharmacum efficit. Nam quemadmodum ex cerato & ærugine incarnans efficitur pharmacum solet, tametsi ambo per se sint contraria carnifici- gnendæ: eadem ratione ex oleo & chalcithide aptum medicamentum conficitur.

GALENI PERG.

MENI, DE COMPOSITIO-
NE MEDICAMENTORVM, SE.

cundum partes, Liber. VII.

De affectionibus contingentibus circa
respirationis organa.

SPERAE ARTERIAE Pharma-
maca, mos est appellare arteriaca. Vo-
cant enim arteriam asperam, uiam il-
lam quæ ducit à larynge ad pulmo-
nes, ex chartilaginosi corpusculis,
bronchis dictis, cōflatam: unde etiam

Arteriaca phar-
maca quæ di-
cantur.

Aspera arteria
ex quibus con-
flet particulis,

tota arteria, interdum dicitur bronchos. Vestit autem
ipsam intrinsecus quædam crassa mēbrana, quam ob
crassitudinem nonnulli tunicam nominant. Scripse-
runt porrò ueteres multa & diuersa medicamenta ad
affectus organorum respirationis: ad uocemq; tum in-
terceptam, tum raucam. Etenim ubi instrumenta uo-
cis ab humiditate uehementius atq; tenacius impa-
cta, fuerint imbuta, uox intercipitur: quum uerò mode-
ratiùs humecta sunt, oboritur raucedo. Organa uocis
quum dico, intellige arteriam, & laryngem, & pharyn-
gem, siue epiglottida. Qui igitur ex uehementi clamo-
re uocem amplius oblæsam habet, iis similis quædam
affectio contingit in illa tunica asperæ arteriæ interna,
ei quæ manibus, cruribusq; & musculis, ubi plurimū
laborarunt. Cæterū curationis genus euariat. Siqui-
dem crura & manus confricare per oleum licet: quum
per cutem in adiacētes musculos penetrare ipsius pos-
sit facultas. Iuxta asperam uerò arteriam chartilagines
post cutē sitæ, prohibent in subiectam pelliculā tran-
situm facultatis unguentorum mollientium. Itaq; au-
xiliorum materia congruentium respirationis organis,

Vox quādo in-
tercipitur.

Raucedo, quā-
do gignatur.

Vocis organa
quæ.

Respiratiōis or-
ganis male af-
fectis remedia
unde petenda
sint.

Tunica eadem
uestiri gulam,
pharyngem, la-
ryngem, & in-
terna asperę ar-
terię.

hypoglottides
ex quibus con-
sistunt.

Hypoglottidi-
bus quomodo
sit utendum.

Extergētia ad
uocis puritatē
facientia, quę
sint.

Voci aut impe-
ditę, aut rauę,
ob inflāmatas
affectiones cir-
ca laryngē, aut
asperam arte-
riam obortas,
qualis uict⁹ &
medicinę ra-
tio conueniat.

quum ab alijs petenda est, tum etiam à balneis dul-
cium aquarū, cibisq; & lenibus, & laxantibus. Si qua
uerò aspreo sentiatur, cibis utēdum est, * qui diutius
hæreant partibus quę cum loco affectio commercium
habent. Est enim una, eademq; sibi continua & cohæ-
rens tunica, quę pharyngem, laryngem, gulā, & in-
terna ipsius asperę arterię uestit, obducitq;. Quare ci-
bi congruentes tunc erunt, qui ex lacte, amylo, alica,
ouis, & libis dulciarijs constant. Si uerò per hæc non
curetur affectio ipsa, inuēta sunt à medicis pharmaca
sub lingua tenenda, ob idq; hypoglottides appellata:
quę eadem facultate cum arteriacis uocatis prædita,
ex uino Theræo, gummi, tragacantha, & glycyrrhiza
constantur: quę laxigant quidem, reprimuntq; om-
nes asperitates: quicquid uerò reliqui est, ex inflamma-
tione, concoquunt, & cito persanant. Qui autem phar-
macum linguę subdet, patiens sit laboris oportet, ut
ipsum paulatim liquefcens, in laryngem excipiat, re-
nitens interim tussī, si qua excitari uideatur. Impossi-
bile tamen est, ut hi claram uocem elidant, citra usum
pharmacorum absq; acrimonia extergentium: qualia
sunt faba fresa elixa, prīsana, ac semē lini torrefactum.
His magis detergūt resina terebinthina, thusq;, ac de-
spumatū mel, & amygdalę amarę: quęadmodum
istis rursus fortiora sunt farina erui, semen hormini, ra-
dix iridis, panacisq;. Cæterū his omnibus uina mol-
lia, & passum Creticum, & Theræum, & Scybelites,
& sapa, & decoctum caricarum, conueniūt. Est autem
ab affectionis principio, usq; ad finem eiusdem, paula-
tim progrediendum à leuissimis tum cibis, tum me-
dicamentis, ad ea quę discutiant detergātq; uehemen-
tius. Igitur primi ordinis sunt tragacantha, gummi, sa-
mīus alter, amyllum, sorbitio ex alica & trago, lac, pa-
nes dulciarij, oua sorbilia, sesama, & nuces pineę,
quas strobilos uocant. Ab his autem deinceps est bu

tyrum, & glycyrrhizæ decoctum: id quod præstiterit ad sapam ex musto, uel ad Cretitum passum miscere, rursusq; coquere. Hæc itaq; in affectionibus inflammatis circa arteriam atq; laryngem ortis comoda in principio sunt: donec moderata inflammatio fiat: ac præ omnibus à uini potu hoc tempore abstinendum est. Quum uerò moderatior facta inflammatio fuerit, uinum dulce Theræum, aut Scybelite bibere licet: quo tempore etiã butyrum est aptum, et sorbitio ex amygdalis, necnõ ex lacte & melle diutius coctis, amyloq; iniecto, aut filigine. Qua sanè uictus ratione inflammatio quidem ipsa sedatur: relinquitur tamẽ humiditas multa, ob quam impossibile est claram uocem proferri. Quare transire tunc conuenit ab his eduliis, ad omnia ex melle cocta, & ad fabam fresam elixam, & prisanam, & brasficam, & porrum probè coctum. Similiter etiam pharmacorũ usus idoneus est, quo tempore inflammatio aut aspredo præcellunt, eorum quæ detinentur sub lingua: post hæc magis detergentia & resiccantia exhibemus: idq; gradatim facimus, donec ad ea quæ acredinis nonnihil sortiuntur, perueniamus. Deinceps igitur ex arteriacis quæ à ueteribus prodita sunt, eligens præstantiora, huic methodo adiiciam: quæ quidem nec discernere, nec ijs probè uti poterit, qui in commentariis simplicium medicamentorum accuratè non fuerit exercitatus.

De arteriacis ab Andromacho scriptis.

T Huris, myrrhæ, croci, sing. drach. j. scillæ, drach. ij. passi Cretici, sextar. iij. Scilla in passo coquitur, donec inspissetur passum: dein scilla abiecta, insperguntur reliqua: fitq; electon, hoc est delingibile pharmacum. Alia arteriaca confectio. Aloes sextantem: croci vnc. j. mastiches tantundem. Conficito. Soluit enim aluum, concoquitq; (croci ratione) ea, quoru gratia exhibetur. Alia leniens exasperata, conco-

Arteriaca, hoc est ad affectus organorum uocis & respirationis cõgruentia, pharmaca Andromachi.

quensq; & extergens. Thuris, succi glycyrrhizæ, sing. vnc. j. tragacanthæ, drach. vj. nardi, drach. j. myrrhæ, amomi, croci, sing. drach. iij. mellis Attici quod sit factis. Conficito.

Tabidis arteriacū optimū.

Alia arteriaca, optima ad tabidos, & omnes inueteratos pulmonis & thoracis affectus. Cinamomi, thuris, utriusq; vnc. j. succi glycyrrhizæ, myrrhæ, tragacanthæ, nardi Indicæ, amomi, singul. drach. iij. croci drach. j. Melle Attico excipito.

Hæmoptoicis arteriaca confectio.

Alia ad arteriam affectam, ulcera pulmonis, puris & sanguinis reiectiones, fluxionesq; in thoracem, & ad ea quæ ægrè educi possunt, uehementer efficax. Resinæ terebinthinæ, croci Cilicij, thuris, myrrhæ troglodyticæ, cinnamomi, amomi, nucis pinæ, glycyrrhizæ absq; medulla, asteris famij, chalbanij, costi, singul. drach. iij. nardi Syriacæ, drach. ij. S. cassiæ nigræ, drach. ij. tragacanthæ, palmularum Syriacarum carnis, sing. drach. iij. Mellis Attici heminas. iij. Conficito.

Hypoglottides, hoc est orbiculi sub lingua tenendi, ad aspredines gutturis, interceptam uocem, & sanguinem reiectantes. Tragacanthæ drach. vj. gummi drach. v. thuris, drach. j. obol. j. myrrhæ drach. j. obol. ij. croci tantundem: succi glycyrrhizæ, drach. j. obol. iij. aut rad. drach. ij. S. piperis albi, grana. xxv. palmularum pinguium carnis, drach. iij. Tragacantham passo maceratam & tritam reliquis tritis committito, singitoq; catapotia magnitudine fabæ.

Hydropi recepti optimū medicamen.

Arteriace delingibilis, ad tabescētes, purulentos, adq; hydropas incipientes, & tusses inueteratas congruens. Datur per diem & noctem cochlearij mensura. Succij scillæ, sext. iij. passi Cretici, sext. iij. Vini Falerni sext. viij. Mellis Attici sext. iij. myrrhæ trientem. croci, thuris, utriusq; sextantē. aristolochiæ oblongæ, minam. j. S. glycyrrhizæ, minam unam. radicis eryngij, sextantem. Cassiæ, nardi Celticæ, sing. vnc. j. xylobalfami, bessem. Lignosa illa confusa in uino macerato per triduum

MED. SEC. LOCA. LIB. VII. 401

triduum, dein ad lētum ignem ad tertias coquito, atq;
ita exprimito, & retrimētis abiectis, passum, mel, &
scillæ succum coniūcto, & ad mellis crassitudinē co-
quito. Crocum uerò, thus, & myrrham, cum uino teri-
to, atq; ubi optimè habuerit pharmacū, addito: postq;
uerò fuerint modicè fusa, ab igne tollito, & reponito
ad usum.

Alia arteriaca media medijs congruens
arteriæ affectibus. Croci, uue passæ exacinate, utriusq;
drach. j. amygd. dul. drach. viij. myrrhæ, obol. iij. tra-
gacanthæ, drach. iij. piperis albi ob. iij. melle cocto ex-
cipiantur.

Critonis Arteriaca, ad uocem interce-
ptam. Ficum & eryngium probè coquito, & ad deco-
ctum ipsorum gummi addito, ut melle durior confe-
ctio fiat: exhibetoq; ad noctem.

Alia eiusdem, fa-
ciens ad affectus arteriæ, & ulcera tum auriū, tum etiā
pudendi. Thuris, ob. iij. myrrhæ drach. ij. passi cya-
thos. iij.

Passum ad mellis spissitudinē coquito: dein
myrrham & thus cum passo semicocto ablato, misce-
to. Facit etiam ad dysentericos & cœliacos. Rectif-
simè autem fecerit, qui artericas concoquentes atq; le-
nientes, in duplici uase coxerit, nempe uasculum quod
coquendum pharmacum cōtinet, in aliud plenū aquæ
feruentis imponens.

Confectio Critonis ex capi-
tibus papaueris, diacodyō dicta, ad affectus organo-
rum respirationis conducens. Capita papaueris agre-
stis octingenta. aquæ sextarios. lxxx. Coquito ad ter-
tias, hoc est donec flaccida appareāt: atq; expressis ad-
dito mellis, lib. x. Si uerò uariā efficere uis, adde cro-
ci, myrrhæ, succi hypocisthidis, sing. drach. xij. thuris
drach. vj. acaciæ drach. xij. Optima tamen est sim-
plicissima.

De usu confectionis ex papaueris capitibus.

V Sus eius est in ijs qui somno opus habēt: quibus
etiam ex opio confecta sæpe exhibere cogimur.

Opus habēt maximè huiusmodi pharmacis iij, quibus

Voci intercepte
arteriaca Cri-
tonis.

Vlceribus au-
riū, pudendiq;
medicamentū.

Coquenda es-
se arteriaca le-
nientia in du-
plici uase, &
quomodo.
Diacodyō Cri-
tonis.

Diacodyō, hoc
est ex capitibus
papaueris,
cōfectū medi-
camentū, qbus
conueniat.

Tomus IIII.

CCc

Mellis usum fu-
giendum esse,
ubi tenuis flu-
xus a capite
ad asperam ar-
teriā destillat,
recipiendū aut-
em crassus.
Diacodyō me-
dicamine uten-
di modus.

Arteriaca me-
dicamenta ab
Asclepiade re-
licta.

Hypoglossis,
hoc est medica-
mē sub lingua
tenēdum Dio-
scoridæ.

tenuis fluxus à capite ad asperam arteriā destillat, non permittens dormire ob consequentem tussim. In tali-
bus ego etiā ex sapa, hoc est hepsenate, siue musto co-
cto, quod etiam siræon uocant, pharmaci compositio-
nem parare soleo. Quin & per passum aut Therēum
Creticū melius est q̄ per mel cocturā fieri, ubi fluxus
ualde tenuis extiterit. Mel siquidem fugiendū tunc est,
quum tenues fluxiones augeat, facultate tenuandi pre-
ditum. Admiscetur etiam huiusmodi pharmaco gly-
cyrhiza, ita ut simul cum ipso coquatur. Si uerò in pul-
mone consistat copia humoris delapsi à capite, confe-
ctio ex melle est præstantior. Datur commodiora
mensura duorum cochleariorum satis magnorum co-
pia. Augebis autem & minues hanc copiam, respiciēs
ad magnitudinem corporis cui exhibiturus es, necnon
ætatem, anni tempus, atq; regionē. In omnibus enim
his frigidioribus minimum dabis: calidioribus am-
plius. Arteriaca ab Asclepiade scripta. Brassicae
succum melle coctum lingendum exhibe. Alia.
Cremoris eryngij, in aqua cocti, heminas.ij. Cremo-
ris caricarum similiter coctarum, tantūdem. His adde
gummi subtilissimè dissoluti, drach. vii.j. coquito dili-
genter ad arteriaca spissitudinem, & inde cubitum itur-
ris ad cyathi mensuram lingendum dato. Alia.
Chalbani drach. vj. piperis drach. j. nitri tantūdem. mel-
lis Attici cyathos. vj. Chalbanum & mel coquito, de-
sataq; adijcito ceteris, utitorq;. Alia insignis. Cro-
ci, myrrhe, succi glycyrhizæ, thuris, calicæ, sing. drach. j.
piperis grana. xxiiij. passi Cretici sext. iij. mellis Attici,
cyathos. vj. utere. Hypoglossis Dioscoridæ.
Crocī, myrrhæ, tragacanthæ, succi glycyrhizæ, sing.
drach. j. nūces pineas repurgatas, contusasq;, numero.
lx. amygdalas mundas totidem. Excipiantur melle de-
cocto. Datur nucis ponticæ magnitudine sub lingua te-
nenda. Alia Mithridatis. Myrrhe, croci, utriusq;

drach. iij. nardi Indicæ, terebinthing, utriusq; drach. ij. thuris, castig, cinnamomi, sing. drach. j. passi Cretici heminas. iij. Passum & terebinthinam ad perfectâ compagem coquito, & cum siccis cōmittito: indeq; ad nucis ponticę magnitudinem sub lingua tenendum dato.

Alia mirificè faciens ad affectiones thoracis. Farinæ fabaceę tostæ, hem. j. iridis Illyricæ, quadrantem. nucū pinerarū tostorum, sextantē. pulegij aridi contusi, sesquidrachmā. seminis urticæ, drach. j. piperis, vnc. S. Mellis boni, sext. ij. Farinam cum melle ad densitatem coquito. Seminis lini etiam tusi, tosti, & cribrati heminam unam in promptu habeto, cum ceterisq; adijcito.

Alia ad tussum & spiritus prolationem, ualde probè expurgans. Hyssopi, pulegij, utriusq; sextantē. iridis, sem. sinapis, nasturtij, anisi, piperis, sing. vnc. j. tusa & cribrata melle cocto excipito. Datur cochlearis boni mensura.

Confectio ex marrubio Platonis. Myrrhæ, styracis, opij, succi marrubij, chalbani, croci, equalis partes. Vtere melle cocto exceptis. Pharmacum Harmonia dictum ad destillationes, insuperabilemq; defluxū conducens. Styracis, castorij, piperis, cardamomi, sing. drach. iij. opij, myrrhæ, sem. hyoscyami albi, sing. drach. iij. passo excepta in catapotia reducito, datoq; ciceris magnitudine ad somnum.

Medicamen Andromachi, Ambrosia dictū, ad phthysicos & febres repetentes per circuitus. Nardi, croci, myrrhę, costi, castig, cinnamomi, iunci rotundi odorati, piperis nigri & albi, castorij, chalbani, terebinthinæ, styracis, succi papaueris, seminis hyoscyami, sing. drach. j. tragacathę, drach. vj. anisi, sem. lini. sing. drach. j. mellis quod sit satis, vini Phalerni heminam. Tragacantham uino sufficienti macerato, & reliqua simul cū melle cōmittito. Datur febrietibus sesquidrachma ex aqua mulsa: febre carētibus vncia dimidia cum melle & aceti cochleario uno, et uini Phalerni cyathis duo.

CCCC. ij

Hypoglottis
Mitridatis.

Hypoglottides
uariæ, multi-
q; ulus.

Marrubio con-
stans medica-
mentum.

Harmonia di-
ctū medicamē-
tū, defluxui ad
pectus cōferēs.

Ambrosia An-
dromachi.

Febribus repe-
tentibus p cir-
cuitus Ambro-
sia Androma-
chi confert.

bus. Aliud ad omnem tussim. Anisi drach. ij. costi, obolos. iij. myrrhæ, castorij, chalbani, piperis albi, sem. hyoscyami, opij, succi glycyrrhizæ, sing. drach. j. passo excipito, redigitoq; in catapotia, ciceris magnitudine. Aliud ad omnem tussim, & fluxionem, & abscessus internos. Sagapeni, gentianæ, myrrhæ, opopanax, piperis albi, sing. drach. ij. baccarū lauri mund. drach. iij. trita, & aqua excepta, exhibeto ad Græcæ magnitudinem fabæ: ischiadicis tamen paulo plus, ex uini diluti cyathis tribus.

Tussi omnigenæ medicamentum optimum.

De reiectione sanguinis.

Hæmoptico-
rum curatio.

IN reiectione sanguinis primum periculū est, ne imoderata eius uacuatio fiat. Vbi uerò suppressus est, curatio eius quidem, quæ ex refectione osculi aliquius uasis contigit, per obturationem fit osculi dilatati: eius uerò quæ ex uasis ruptura, per conglutinationem eiusdem: quemadmodum eius quæ ex erosione, per erosorum renutritionem. Obturatur igitur osculum refectionem, per astringentia: cōglutinetur autem ruptum, per eadem, & quæcunq; ipsis in compositione miscentur, citra mordacitatem resiccantia, & glutinosum quiddam habentia, uelut est Lemnia terra, & Samius aster. Renutrientur corrosa per cibos boni succi, & pharmaca carnem gignētia. Igitur iuxta primam rationem, ex talibus pharmaca componuntur congruentia ad curandam sanguinis eiectionem: iuxta secundam uerò, in his qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut larynge reiectionem sanguinem, miscentur predictis congruenti mēsurā calida & tenuium partium medicamenta, quæ infestissima sunt tribus illis affectionibus dictis: miscentur inquam gratia distributionis, ut uidelicet astringentibus medicamentis præparent, ac ueluti sternant uia. At quum ex locis circa stomachum, aut aluum, aut aliquod intestinum, sanguis educitur, huiusmodi pharmacorum mistura non est opus: infestissimum tamen his

Obturbatio uasorum a quibus fiat.

Glutinatior ruptorum uasorum a quibus fiat.

Renutritio erosorum, a quibus fiat.

Distributionis ratione misceri astringentibus medicamentis contraria distributioni hæmopticoz.

MED. SEC. LOCA. LIB. VII. 405

est id genus pharmacorum, q̄ in tantum refrigerat, ut affectum stupefaciat: quāuis & hæc misceantur medicamētis ad sanguinis reiectiones congruentibus: quū altiore somnum cōcilient, & cōmodissima sint ijs q̄ tusli lancinantur, sistētia nimirum sanguinem qui ad uas affectum deferitur: atq; hoc per suam frigiditatem. Atq; hi sanè sunt compositionis scopi.

Quæ An. dromacho ad sanguinis reiectionem scripta sunt.

Acaciæ drach. iij. rosarum siccarum, balauſtij, singul. drach. viij. gummi, drach. ij. tragacanthæ, drach. j. cum aqua pastillos facito, quorum singuli pendeant drach. mam unā. Dato ex aqua pluuiæ: habet enim uim astringendi.

Aliud sistens sanguinē. Croci Cilicij, myrrhæ, iridis, nardi Indicæ, thuris, acaciæ, sing. vnc. j. succi papaueris, costi, piperis, sing. vnc. S. rosarum siccarum trientem. Melle excipito. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudo.

Aliud. Succu hypocisthidos, balauſtij, acaciæ, gallæ, cytinorum, sing. drach. xij. succi papaueris, drach. vj. croci tantūdem. Redigito in triobolares pastillos.

Aliud egregium. Balauſtij, acaciæ, opij, myrrhæ, sing. drach. ij. tragacanthæ, succi hypocisthidos, florum rosarum, seminis hyoscyami, sing. drach. iij. thuris drach. iij. excipito succo polygoni.

Aliud ad hemoptoicos & dysentericos. Floris rosarū, opij, acaciæ, gummi, balauſtij, hypocisthidos, sing. quadrantem, gallæ vnc. j. seminis plantaginis, eiusdemq; succi, utriusq; sextantem. Lycij Indici, succi rosarum, utriusq; vnc. j. redigito in pastillos drachmales.

Quæ Asclepiades ad sanguis reiectiones scripserit. Radicis polygonij manipulum: rad. symphyti tantūdem. rhois rubri, acetabulum. aquæ sextarios. iij. coquito ad tertias, & expressi liquoris cyathum unum dato, cum gummi tenuissimè triti & dissoluti drachma una.

Aliud. Mororum rubrorum nondum maturorum lib. xvj. aquæ pluuiæ sextarios. xvj. coquito ad tertias

Stupefacientis
medicamenta
qua rōne phar-
macis cōgruē-
tibus ad san-
guinis reiecta-
tiōes, misceant
Hæmoptoicis
remedia ab An-
dromacho scri-
pta.
Sanguinis reie-
ctioni reme-
dia.

Dysentericæ re-
medium.

Hæmoptoicis
remedia ab As-
clepiade scri-
pta.

CCcc iij

& expressum liquorem reponito. Idem licebit facere etiam de corni fructu. Aliud. Balaustrij, terræ Samiæ, corticis thuris, gummi, singulorum æquale pondus. Trita & cribrata exhibe cochlearis mensura in aquæ frigidæ cyatho uno.

Aliud. Succij hypocisthidos, succij acaciæ, succij rhois syriaci, balaustrij, opij, gummi, sing. drach. iij. Vini myrtitis, quod satis est.

Pastillorum ex succino. Confectio, quos haberi trochiscos de charabe appellant.

Conficito, & utitor. Pastillus ex succino, hæmoptoicis, diuturnæ & recentius, phthificis, sanguinem reiicientibus, purulentis, coeliacis, dysentericis, et inflatis conferens. Psyllij mundi, drach. xlv. iridis Illyricæ, mastiches, ramentorum succini, croci, sing. drach. xxx. opij, drach. xv. Psyllium in aquam calidam coniectum macerari finito. Vbi uero suo glutine & mucilagine ipsam aquam infecerit, liquorem exprimito, & cum eo pharmacum in pastillos cogito. Ex quibus obolos. iij. ad somnum dato. Sint autem aquæ sextarij terni.

Pastillus ex corallio.

Pastillus ex corallio. Corallij, terræ Samiæ, utriusque drach. viij. Balaustriorum, amyli, terræ Lemniæ, sing. drach. iij. sem. hyoscyami albi, opij, hypocisthidis, sing. drach. ij. Excipe succo arnoglossæ, cogeque in pastillos, & exhibe.

Anodyna. Andromachi, ad affectus organorum respiratorum, aliasque internas dispositiones, congruentia.

Confectiones sedantes dolorem, tabescentibus & sanguinem reiicientibus, internorumque affectibus, comoda, ab Andromacho scriptæ. Radicis panacis, seminis dauci, castorii, sem. hyoscyami, opij, sing. drach. iij. Mellis quod sit satis. Dantur oboli quatuor, cum aquæ cyathis tribus.

Alia sedans dolorem, ualens ad tormina, & dysenterias. Sem. apij, drach. ij. anisi drach. j. piperis albi, tantundem myrrhæ castorii, utriusque obolos. iij. opij, croci, sing. obolos. iij. gentianæ drach. ij. Pastillos triobolares conficito, uarieque utitor.

Alia iucunda appellata. Iridis Illyricæ, succini, croci, mastiches Chiæ, sing. drach. xxx. psyllij, drach. xlv. succij papaueris drach. xv. cum aqua pluuiæ

MED. SEC. LOCA. LIB. VII. 407

pastillos, quorum singuli pendeant drach. j. S. confici-
ro, & exhibeto. Psyllium tñ per diem ac noctē aqua
pluuiali macerato: dein coquito, & exprimō, cremo-
remq; cum aliis miscero. Alia dolorem sedās, ad

omnes internos affectus & sanguinis reiectiones, un-
decunq; erumpant. Facit & ad nephriticos & hepati-
cos. Hanc ne prius dederis, q̃ mercedem accipias.

Cinnamomi, casie, utriusq; drach. ij. myrrhæ, piperis
utriusq; chalbani, sing. drach. j. opii drach. ij. Trita cū
melle pauco, in catapotia redigito, partim magnitudi-
ne fabæ, partim quantitate araci. Dato iuxta cuiusq; ui-
res cum aqua, aut pro iudicio tuo. Alia ad eadē,

Mysterium dicta. Croci, costi, castorii, asari, sem. hyo-
scyami, opii, styracis, sing. drach. j. Excipito melle uti-
torq;.

Anodyna ad easdem affectiones ab Ascle-
piade scripta. Seminis cucumeris hortensis decortica-
ti, drach. viij. amyli, drach. iij. sem. lini, sem. papa. alb.
utriusq; drach. ij. Tusa & cribrata excipe tragacanthæ
cremore, & i drachmales pastillos redige. Dant oboli.
iij. nō febriētibus qdē, ex uino: febriētibus uerō, ex suc-
co rhois. Faciūt ad fluxiōes thoracis. Cōfectio Pan-

chrestus dicta, hoc est multi usus, ad tussim antiquam,
purulētos, orthopnoicos, tabescētes, ad oēsq; inflatiōes.
Pellit secūdas & menses, medeturq; uesicæ affectibus.
Terebinthinæ, drach. viij. styracis drach. vj. myrrhæ,
drach. v. croci, iridis, chalbani, sing. drach. iij. Seminis
hyoscyami, corticis mandragoræ, irionis torrefacti,
opopanacis, singul. drach. ij. piperis, spumæ nitri, utri-
usq; drach. j. passo excipito.

Antidotus Aristarchi
admiranda, conferens ad affectiones prædictas, reni-
tensq; uenenis, exterminansq; febres repetētes per cir-
cuitus, una hora ante exacerbationem exhibita. Cinna-
momi, costi, chalbani, castorii, succi papaueris p peris
nigri & longi, styracis, sing. vnc. j. mellis sextariū unū.

Arida teruntur & cribrantur. Chalbanum coquitur cū

CCcc iiij

Anodyna ad
internos affe-
ctus ab Ascle-
piade scripta.

Panchrestos
Asclepiadis,
multi usus ad
uarios interno-
rum affectus.

Antidotus Ari-
starchi admi-
randa.

melle: excolatis uerò reliqua adduntur, reponunturq; in uitream pyxidem, argenteam'ue. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudine, cum aquæ mulsæ cyathis duobus, instillatis digito guttis aceri nouem.

De orthopnoea.

*Asthmatici cur
sic dicantur.*

*Orthopnoici
cur sic dicant.*

*Orthopnoeæ
causa.
Purulentæ.*

*Peripneumo-
nici.
Respirationis
organorum an-
gustia quæ effi-
cere possint.*

*Potum esse de-
bere modicum
iis quibus or-
gana respirati-
onis ab aliquo
tumore angus-
tantur, contra
multum illis, q-
bus bronchia
a crassis & uis-
cidis succis ob-
struantur.*

Qui citra febrem dense respirant, ob symptoma id dicuntur Asthmatici, hoc est anhelosi. Eisdem etiam ob symptoma aliud orthopnoicos appellant, quod thorace recto spirare cogantur, metu suffocationis. Minus est autem quod hi inspirant, quam pro usu respirationis, etiam thorax ipsis plurimum dilateat. Ex quo manifestum fit, internam capacitatem coarctatam ipsis esse preter naturam, id quod ægri etiam haud obscuro sensu perceptant. Fit etenim & purulentis locorum coarctatio, ob collectum inter thoracem & pulmones humorem. Fit etiam peripneumonici, ob pulmonis inflammationem. Restant autem adhuc affectiones duæ quæ angustiam locorum faciunt in uis per quas aer inspiratur: quum aut humorum crassorum & uiscidorum multitudo pulmonis bronchiis fuerit impacta: aut tumor abscessui similis in ipso constiterit. Cæterum curatio ambæ affectionum aliquid cõe habet: aliquid priuatum, & alteri tantum proprium. Commune quidem utrisque est, ut absumatur redundantia humoris affectiones gignentis: proprium, affectioni quidam uiscidorum humorum, ut per attenuantia & extergentia pharmaca dissipentur: ei uerò quæ propter tumorem accidit, ut per attenuantia & exiccantia eadem cõsumptio fiat: quæ curatio rursus omnibus in profundo abscessibus communis existit. Vini itaque potus ambabus competit. Omnis autem potus modicus sit in iis qui alicubi abscessum habent: multus contra, in illis, quibus uiscidis & crassis succis sunt obturata bronchia. Quippe pharmaca eiusmodi repurgantia humores, rufes necessario excitant: non uerò facile per sputum reijcitur, quod expurgatum est, nimirum ob crassitudinem.

Quapropter humectatione multa opus habet quo effe-
ratur facile.

Quæ scripserit Asclepiades ad dys-
pnoicos. Scillæ crudæ succum exprimito, eiq; parem
Attici mellis mensuram addito, & ad prunas admo-
tas coquito. Dato inde & ante & post cibum mystri
mensuram.

Aliud. Origani drach. viij. comæ thy-
mi, iridis Illyricæ, calaminthæ siccæ, piperis albi, anisi
torrefacti, sing. tantundem. Cribrata melle cocto ex-
cipito. Dato rucis ponticæ magnitudinem.

Aliud.
Vuæ passæ rhodiæ, exacinatæ, acetabulum. scenigræ
ci loti tantundem. aquæ pluuiæ sextarium. j. Coquito
donec dissoluantur, & liquorem excolatum reponito.

Ex hoc præbeto assiduè, & iuxta singulas irritationes,
cyathi mensuram calfactam.

Aliud. Anisi, sulfuris
uiui, utriusq; quadrantem. ammoniaci thymiamatis,
castorij, melanthij, sing. drach. iij. aqua diluta in cata-
potia cogito, unumq; in aceti mulsi cyathis tribus pro-
pinato. Hæc omnia sunt ab Asclepiade scripta illis, qui
bus pulmonis bronchia crassæ & uiscidis humoribus
sunt referta. At uerò abscessus qui attenuatibus & re-
siccantibus opus habent, maximè gaudēt aromatum
facultatibus, quæ & tenuium partium sunt, & resicca-
toriæ, præter hoc quod calfaciunt. Porro ijs qui pro-
priè orthopnoici & asthmatici nominantur, pharma-
ca conueniunt secantia citra calfactionem: ob idq; iu-
uantur maximè ab scillitico aceto: necnon ab scilla, &
ab aceto mulso eodemq; scillitico. Quemadmodum
autem in hac affectione uehementer cauendum est, ne
calfaciamus, propterea qd uiscidi & crassi succi nō mo-
dò non iuuantur, sed offenduntur etiam usu calfacien-
tium: eodem modo quæ ualde refrigerant sunt omni-
no uitanda.

Quæ pharmaca scripserit ad eiusmo-
di affectiones Andromachus.

Ad dyspnoeam,
Sulfuris uiui drach. j. Sem. rutæ syluestris, tantundem;
aristolochiæ, absynthij, ammoniaci thymiamatis, ab

Dyspnoæ re-
media ab As-
clepiade scri-
pta.

Scillinum ace-
tum orthopnoi-
cis asthmati-
cisq; maxime
opitulatur.

Dyspnoæ re-
media Andro-
machi.

410 GAL. PERG. DE COM.

rotoni, sing. drach. iij. trita cum aceto in catapotia fabarum instar redigito. Dato mane tria, & uesp̄i totidem.

Aliud. Ammoniāci thymiamatis, abrotoni, sing. drach. ij. sulfuris uiui, drach. j. formato cum aqua pastillos, & cum aquæ mulsæ cyathis tribus præbeto.

Aliud. Scillæ, sulfuris uiui, bituminis, sing. partē unam. Dat. tur. obol. iij. in aceto mulso.

G A L E N I P E R G A


MENI, DE COMPOSITIO.

NE MEDICAMENTORVM SE-

cundum partes, Liber. VIII.

De pharmacis congruentibus ori uentriculi.

Instrumēta duo nobis fuisse data a natura, necessaria ad uitæ actiones, experientiā nempe, & rōnem: quorum semp̄ ad perfectā disciplinam alterum indiget al-



Inflāmationes oris uentriculi et hepatis, cum relaxatibus miscellam astringentium pharmacorum desiderant.

ORRO' DIFFICILLIMUM est, ad ueritatem eos reuocare, qui sese alicui sectæ seruiliter addixerunt. At qui prudentes sunt, ueritatis q̄ ardenti desyderio tenentur, ij (ut spero) custodient ea quæ à natura nobis ueluti iudicandi instrumenta concessa sunt, ad actionum uitæ cognitionem, Experientiam nempe & Rationem: quorum semp̄ alterum, ad perfectam disciplinam, altero indiget. Etenim falsæ opiniones animos hominum præoccupantes, non solum surdos, sed adeo etiam cæcos efficiunt, ut uidere nequeant, quæ ab alijs conspicuè cernuntur. Proinde fit, ut complures Empirici, nec pauci etiam ex ijs qui sese Methodicos iactant, per pharmaca relaxantia curantes inflammationes oris uentriculi & hepatis (quæ miscellam astringentium desyderant) ægros omneis ad unum occidant, atq; in exitium adigant. Quippe nisi facultatem quæ firmitudinem addat, in illarū par-

tiū affectibus ad relaxantia permisceas, uita in discrimen uocatur. Igitur astringentia omnia quæ ad illarum partium affectus, partim emplastris atq; ceratis mista adhibentur extrinsecus: partim intus uorantur: impresentiarum ea ipse indicabo, auspicatus ab ijs quæ conueniunt inflammationibus: q̄ maximè in ipsis ægri periclitentur. CERATVM ergo quo assidue utor, ex aloë, mastiche, cera pontica, & unguento nardino constat. Cæterum ad unciam unam mensuralem nardino olei, hyenie quidem. viij. æstate autem. viij. ceræ ptes induuntur. Liquatis igitur in duplici uase, refrigeratisq; & deraſis, addes aloes & mastiches, reductorum in pollinem, utriusq; drachmam. j. & quandoq; plus: sic tamen ut ad sesquidrachmam non progrediaris. Quod si ampliori opus sit astrictione, nimirum tanta imbecillitate existente, ut uentriculus retinere cibos nō possit, addes drachmam unam omphacij: id quod primo iniici debet in cerati præparatione. Similiter licebit absynthij succum miscere: quandoq; etiam ambo: sicuti & tertium hypocisthidis: & quartum cenanthes. Quin & rhois succum non raro admiscui. Cerati tamen augenda est copia, iuxta proportionem numeri aliorum pharmacorum. At inueteratis atq; induratis inflammationibus, magis uaria conueniunt pharmaca, & quæ ex aromatis quippiam habeant, nonnihilq; etiam emollientium atq; digerentium sortiantur: cuiusmodi est quod ex meliloto conficitur, congruēs omnibus iuxta præcordia inflammatis. Porro os uentriculi, nonnulli hodie communiter stomachum nominant: quam partem olim frequentius cardiam, hoc est cor, appellabant: unde uox cardialgia est deducta, quæ minimè quidem cordis, sed oris uentriculi dolorem & mordicationē significat. Fiunt quippe in ipso tū morsus, tum inexplibilis fames, ut interdū etiam nauseosæ dispositiones: in quibus omnibus communis qui-

Ceratum Galeni ad inflammationes oris uentriculi & hepatis maxime congruum.

Os uentriculi, quod olim cor noīabant, nonnulli hodie stomachū uocant. Cardialgia significat morsum oris uentriculi.

412 GAL. PERG. DE COM.

Affectus inter-
ni ut cognoscā-
tur opus est cō-
iecturis.

Intemperantię
particularę sūt
octo, quas per
contrarias qua-
litates reduce-
re ad medici-
nam oportet.

dam astringentium pharmacorum usus inuentus est : admista autem sunt plerisque ipsorum calfacientia simul & resiccantia. Verum affectus in profundo sitos, ut cognoscamus, maximis utamur cōiecturis est opus: ob idq; utilissima Medicę artis pars est, quę cognitio- nem ipsorum indicat. Quum igitur octo sint in singulis partibus intemperantię corporis: atq; hę omnes aut secundum solas nudas qualitates gignantur: aut accedente alicuius humoris complexu: certē earum singulę per contrarias qualitates sunt reducendę ad mediocritatem. Quia uerō plurimę intemperaturę hominibus ex redūdantia humorum, magis q̄ ex inopia sunt, pharmaca resiccantia plerisque magis iuuant. Quum autem resiccantia ipsa, partim quidem astringant, cogendo astringendoq; substantiam eorum quę contingunt: partim uerō discutiant, & in hoc substantiam eorum dissoluant: ob hoc ipsum sanē plures sunt qui astringentibus indigent. Verum si humida intemperies coeat cum frigiditate, læduntur qui per sola astringentia curantur, quę frigidę facultatis existunt. Quare meritō plurima pharmaca per experientiā inuenta, ex miscellanea materia constituuntur, astringēte uidelicet atq; calfaciente: quorum omnium differen- tiam cognosces, si simplicium pharmacorum faculta- tes memoria tenueris.

Confectiones stomachicę Andromachi.

Stomachicę cō-
fectiones An-
dromachi.

Hierę picre ua-
rię compositio-
nes.

Aloes lotę &
illotę facultas.

Hiera ad stomachicos. Floris iunci odorati, xylo- balsami, mastiches, croci, nardi Indicę, asari, cin- namomi, sing. drach. vj. aloes lotę, drach. C. Simul trita repone, præbeq; ieiunis cochlearia. ij. Sunt tamen qui ad aloes drach. C. singulorum aliorum, octo dra- chmas adiiciant. Non desunt qui absq; flore iunci odo- rati conficiant. Porro ad uentris subductionem illota aloes est aptior: elota autem multum de medicamen- tosa ui amittit: quam etiam febricitantibus dare aliq̄s

possit, si febris sit ualde mitis. Infestissima autem est aloe, uel lota, ijs qui citra uitiosos succos in temperie affliguntur calida & sicca. Proximam ab his cladē percipiunt, qui siccam intemperiem habent, uel frigiditatem etiam implicitam: & in uniuersum, qui ex sola qualitate particulam aliquā affectam ac lāsam possident. Etenim intemperantiæ in humoribus consistentes, pharmacis ipsas euacuantibus egent; quæ uerò absque his infestant, penitus commigrant in tabem, ob pharmacum huius ex aloe constantis exhibitionem. At ubi uitiōsa humiditas perrigat uētriculi tunicas, hiera ex aloe est utilis. Omnino autē sic affectis plus aut minus adfunt nausæ quædam symptomata. Iam uerò purgatio quam aloe molitur, imbecillior est, q̄ ut uniuersum corpus purgare queat. Additur illi mastiche, ut uires eius refringat, uenriculo existens etiam grata, & odorata. Cinnamomum uerò, quum ob easdem causas, tum etiam ut partium suarum tenuitate aperire uētris meatus possit, extergereq; atq; attenuare si quid uisco sum aut crassum in humoribus insit. Crassos quippe succos ob purgatoriæ facultatis imbecillitatē aloe trahere non potest. Quapropter biliosarum uentris dispositionum optimum pharmacum est. Adhæc cinnamomū uim obtinet alteratricem uitiosorum humorum, in id quod naturæ modo respondet. Scire itaq; licet, eas dispositiones quæ à prauis succis circa uentrē stomachumq; oboriuntur, maximè per medicamenta ex aloe iuari: mirum autem in modum lædi, ab edulij, potionibus, & pharmacis astringentibus. Contra uerò, ubi humores non qualitate sed copia os uentriculi affligerint, utilissimus astringētium est usus, nimirum languida tunc existente ipsa particula affecta, instar laxatorum articulorum, quorum etiam per astringentia affectio corrigitur. Porro polychresta, siue multi usus medicamenta apparantur, quum unum habere uiginti

Aloe est infestissima iis, qui citra uitiosos succos in temperie affliguntur calida & sicca.

Aloes usus, laborantes intemperie citra redundantia humorum, deducit in tabem.

Hiera p̄iora quibus utilis.

Hiera ex aloe est infirmior, q̄ ut totū corpus purgare possit.

Mastiche uenriculo grata. Cinnamomi facultas.

Aloe biliosarum dispositionum uētris optimū est medicamē.

Astringentia esculentia potu lentaq; maxime lædunt dispositiones uētriculi a prauis succis obortas: iuuant aut eas, quæ a multis, non prauis trahunt ortum.

Polychresta,
hoc ē multi ul⁹
medicamenta,
relinqui, ab iis
quæ ad singu-
las affectiones
parantur.
Hiera Antipa-
tri faciens ad
stomachicos.
Stomachica
Galli,

Ventriculi tu-
nicis humores
crassi altius im-
bibiti, qualia
medicamenta
desyderent.

Ventriculi fri-
gidam affectio-
nem significat,
prorsus nihil si-
tire.

Stomachica
ab Asclepiade
scripta.

Confectio ex
fructib⁹ Ascle-
piadis, subuer-
sioni ventricu-
li, coeliacis &
dysentericis fa-
ciens.

affectionibus cōgruum malumus, q̄ tot numero alia:
quā tamen ad singulas affectiones unum aliquod de-
stinatum eo quod ad plures paratum est, melius exi-
stat.

Ad stomatichos hiera Antipatri. Aloes ele-
ctæ, drach. iij. mastiches, drach. ij. asari drach. iij. rosa-
rum siccarum, iunci odorati, mei, phu, cassiæ, sing. se-
munciam. Tritis utitor.

Stomachica Galli, affe-
ctionibus quæ calferi & siccari postulant, utilis.

Corticis radiceis fœniculi, lib. S. aceti acris, sextarium
unum. S. aloes quadrantem. Mellis Attici, lib. j. Ra-
dices lotas ad triduum aceto macerato: deinde coqui-
to, atq; ubi coctæ fuerint expressas projcito, & affuso
ad acetum melle, simul coquito. Dein aloen inspergi-
to, & cochlearia. iij. cum aqua dato. Etenim ubi per
profundum ventriculi, hoc est altius, copiosa, sed non
præta, fuerit defixa humiditas crassa simul & nescida,
opus est mistura pharmaci attenuatorij, perrosuiq;
quale est tum acetum, tum oxymeli. Si uerò nec talis
sit humiditas, nec altius imbibita, sola ad curationem
astringētia suffecerint. Est autem sufficiens signū fri-
gidæ affectionis uētriculi, si æger se nō sitire p̄cipiat.

Asclepiadis stomachica, ad roborandum uen-
triculum, exprimendasq; illius aduen-
titias humiditates congruentia.

AD stomachi subuersiones. Nucleorum mali pu-
nici tusorum succi, sextarios. iij. succi mentæ, se-
xtar. j. mellis Attici tātundē. Coquito in fictili uase,
assiduè agitando, & ubi densata fuerint, ab igne ab-
lata reponito: porrigitoq; mystrum unum, aut. ij. an-
te cibum. Confectio ex fructibus, ad stomachi
subuersionem, coeliacos, & dysentericos faciens. Ma-
la cotonea numero. x. sorba numero. L. mespila toti-
dem. Rhois rubri sextarium unū. Aquæ congios. viij.
fructus tusos & in aquā coniectos, diligenter coqui-
to: & ubi dissoluti fuerint, liquorē exprimito, ac rur-

sus coquito. Quum uerò tertia pars liquoris superfue-
rit, addito mellis Attici, lib. iij. & ad prunas astidue
agitando coquito, ac spissata reponito.

Catapota ad subuersionem uentriculi. Rosarum recentium
defectis unguibus, drach. viij. sem. papaueris albi,
drach. iij. sem. hyoscyami, drach. ij. aloes, obolos. iij.
asari tantundem. Cum aqua diluta in pilulas redigi-
to, præbetoq; ciceris magnitudinem.

Ad ardo- rem stomachi catapotium restinguens sitim. Seminis
fatiui cucumeris drach. viij. sem. portulacæ tantundem.
tragacanthæ. drach. iij. Tragacantham ouorum cru-
dorum recentium candido dissolutam, probè tritis re-
liquis addito, & ex eis mistis fingito catapotia, quo-
rum assiccatorum in umbra, sub lingua unum tenen-
dum dato. Hæc Asclepiades. In uniuersum autem fu-
gienda ea pharmaca sunt in uentriculi affectibus, quæ
chalcanthon, mandragoram uel, aut alia id genus re-
cipiunt.

Ad uoluulosas stomachi subuersiones
pastillus Amazonum ab Asclepiade scriptus. Semi-
nis apij, & anisi, utriusq; drach. vj. absynthij drach.
iij. piperis, myrrhæ, opij, castorij, sing. drach. ij. cinna-
momi drach. vj. cum aqua pastillos fingito, & sum-
mum drachmam unam dato, stomachicis cum pro-
tropi diluti cyathis. iij. cholericis & uomētibus cibum,
cum frigida: coeliacis & dysentericis cum baccarum
myrti decocto: spleneticis, cum hydromelitos cyathis
tribus. Ego uerò quòd myrrha aliquid medicamen-
tosum cōtineat, sine illa maioris securitatis gratia hoc
pharmacum præparare consueui, piperis quātitatem
adaugens.

Porro per eiusmodi uoluulosas dispo-
sitiones, aliquando stercus per uomitum redditur: ubi
uidelicet particulæ affectæ, à serosis medicatisq; hu-
moribus affliguntur magnopere. Quod si etiam im-
becilliores sint, geminatur malum. Erit itaq; in his cu-
rationis scopus, ut ad affectas partes odorata, admo-

Catapota ad
subuersionē uē-
triculi.

Catapota ad
ardorem uen-
triculi cōferen-
tia, si sub lingua
teneantur.

Ventriculo af-
fecto fugienda
eē ea pharma-
ca, quæ chalcā-
thon, mandra-
goramue reci-
piunt.

Pastilli Ama-
zonum, ad uol-
uulosas uentri-
culi dispositio-
nes.

Myrrhæ usum
nō esse admo-
dum tutum.

Voluulosas uē-
tris dispositio-
nes esse podo-
rata curandas.

Graueolentia
subuertunt sto-
machum.
Absynthii fa-
cultas.

Cinamomi fa-
cultas.

Cassia licet ut
pro cinnamo-
mo.

Pharmacum
unū multis af-
fectibus opti-
mum, reperiri
non posse.
Conuulsio fit
ob repletionē
simul & inani-
tionem.
Singultus a q-
bus fiat causis.

Singultui quæ
medeantur.

ueamus, cuiusmodi sunt anisum, apium, daucus, cu-
minum, & seseli. Nam quemadmodum graueolentia
omnia stomachum subuertere solent, sic odorata cor-
roborare. At absynthium miscetur in prescripto phar-
maco, q̄ habeat uim extergendi, repurgandi, & subdu-
cendi uitiosos stomachi humores: quodq; cōstringat,
& denset, roburq; affectæ particlæ addat. Cinnamo-
mum autem foetidis omnibus, putrilaginosiq; humo-
ribus aduersatur. Cæterum si cinnamomum nō ad-
sit, licebit cassiam pro illo assumere. Alia Stoma-
chica Asclepiadis compositio, utilis ardorem sentien-
tibus, & ad intensos singultus, & stomachi uoluulo-
sas dispositiones. Costi, spicæ nardi, chrysobalano-
rum, rosarum uiridiū, mastiches, sing. drach. iij. aloes,
asarī, utriusq; drach. ij. opij, drach. j. succo psyllij exci-
pito, atq; ad pastillorum formam reducito: obolosq;
tres exhibeto. Dictum mihi tamen iam est, impos-
sibile esse ut inueniamus phatmacum, ad affectiones
multas optimum: multoq; præstantius esse, quod sin-
gulis earum destinatur. Porro Hippocrates fieri con-
uulsionem prodidit ex repletionē simul & euacuatio-
ne: quemadmodum etiam singultum. Quanquam
hic aliquando excitari citra plenitudinem aut inani-
tionem solet, ubi uenterculus ab acribus, serosis, me-
dicamētosisq; humoribus mordicatur: quos ubi quis
uomitu eiecerit, singultu subito liberat. Multi etiam,
deuorato pharmaco dia trion pepereon, si uinum insu-
per bibant, omnino singultiunt. Similiter ex cibo in-
mordacem qualitatem corrupto, nonnulli singultiunt,
confestimq; à uomitu liberantur: ut alij ex rigore oris
uentriculi, corripuntur singultu. Verum pueros ma-
ximè singultire contingit, tum ob alimenti corruptio-
nem in uentre: tum ob partis frigiditatem. In uniuersum
autem, uomitus est sufficiens medela eorum, qui
ob copiam, aut mordicationem singultiunt: ut calidi-
tas, eorum

tas, eorum qui ob frigiditatem. Ex medicamentis quæ
pharmacum illud constituunt, opium, rosæ, & psyllij
succus refrigerant. Spica nardi & chrysobalanus, di-
gerunt & corroborant. Asarum, per urinas deducit ui-
riosos succos. Aloe prauos humores purgat. Crocus
concoquit & partes corroborat. Costus calfacit abun-
dè, astringitq; mediocriter. Stupefacientibus miscen-
tur calfacientia, ut eorum malignitatem corrigant,
eisq; sint instar uehiculi. Quippe uiuentium corpora
mortificationi simile quid perpetiuntur ab eorū me-
dicaminum usu, quæ ex opio, hyoscyamo, & man-
dragora constant: ita ut infestantes causas non sen-
tiant. Quare multi qui talibus assidue utuntur, par-
ticulas ad immedicabilem frigiditatem perducunt.

Descripsit etiam Asclepiades Hieræ compositio-
nem, in hoc ab Andromacho disfidens, qd ille qdem
aloes drac. C. ac reliquorum sing. indiderit drac. vj.
hic autem octo drachmas scripserit: floremq; iunci
odorati omiserit, quem alijs miscuit Andromachus:
quodq; nō xylobalsamo (ut Andromachus) sed pro
illo sit carpobalsamo usus. Confert autem huiusce
modi pharmacū ijs qui ob uiriosos humores, & præ-
cipuè biliosos, tardè concoquunt. Siquidem quibus
bilis altius tunicas uentriculi infestat, n̄ præstantius
pharmacum non inuenient. Cuius moderata exhibi-
tio ad quatuor usq; drachmas extenditur. Similiter
auxiliatur uiscerum iam concoctis inflammationi-
bus. Rectè autem hoc pharmacum tardè cōcoquen-
tibus, aut bilē uomentibus propinatur ex aquæ cya-
this quaternis: ut ex aqua mulsa, ad uiscerum incli-
nantes inflammationes: ac deniq; ex uino mulso, dum
aut urinas ciere, aut promouere menses est animus.
Aduerte autem nos appellare drachmam, quod Ro-
mani uocant denarium.

Stomachicum dictum
Aster inexpugnabile, ab Asclepiade prodictū, sedans

Tomus. IIII.

DD d d

Crocus conco-
quit, & partes
corroborat.

Stupefacienti-
bus misceri cal-
facientia ut eo-
rum malignita-
tem corrigant,
eorumq; uires
deducant.

Stomachicum
dictum Aster
inexpugnabile

Hiera quibus
conueniat.

Hieræ modera-
ta exhibitio
ad quatuor dra-
chmas extendi-
tur.

Drachma &
denarius Ro-
manus est idē.
Stomachicum
Asclepiadis di-
ctum Aster in-
expugnabile

dolorem, inducens somnum, ac uarios affectus fanans. Myrrhæ, styracis, nardi Indicæ, casia fistulæ, terræ Lemniæ, corticis mandragoræ, piperis, singul. drach. iij. Croci, succi papaueris, sing. drach. vj. seminis dauci Cretici, anisi, fœselis, seminis apij, sing. drachmas. viij. Myrrha, styrax, & opiū, uino dissoluntur odorato, & teruntur: arida uerò cribrata miscentur, subigunturq; atq; in pastillos coguntur, quorum singuli drachmam dimidiam pendeant.

Quę scripserit Archigenes ad affectus uentriculi.

Ventriculi affectib; cōgruentia medicamentis ab Archigene prodita.

VBi ructus acidus editur, coriandrum cochlearij mensura edendum ante reliquum cibum dato: insuperq; merum bibendum. Ad exolutum uentriculum absq; febris, mentæ ramulum contritum bibendum dato. Aut cœnanthen similiter tritā cum nardo Indica bibendam dato. Aut marrubij succum cum melle: & ubi paululum quieuerint, uinum cū polenta exhibeto. Aut Chia mastiches cochlearium ex aqua frigida dato. Aut glaciē ieiunis quotidie porrigito. Dolores oris uentriculi lenit, ac maximè ijs quibus tristitia aut desperatio accedunt, lac asininum, aut muliebre, aut bubulum, filicibus incoctis, potatum. Si unā cum humectatione uentriculi etiam inflammatio adsit, cœnanthen cum meliloto, aut rosam siccam cum cerato rosaceo, parum resinæ ustæ habente, imponito. Quibus autem ob atram bilem, quam gignūt, stomachus inflatione tentatur, spongiās aceto acerrimo calido imbutas ad stomachum ipsum imponito. Quod si tensio adhuc perseueret, alumen liquidum cum atramento sutorio trito, melle exceptum imponas. Aut hæc & aloë pari portione mista, & myrteo cerato excepta. Aut armetariæ bouis sterco aridum uino incoctum. Aut polij fasciculum coquito, & bibendū dato. Aut calaminthæ decoctū per noctem sub dio expositum,

modico melle & piperis drachma admittis, porrigi-
to.

Soluit autem dolores cuminum apiumq; to-
sta, si modica portione, cum aqua bibantur. Aut
aloes obolos.ij. cum uino mulso, aut uino, aut aqua,
bibendos dato. Aut abrotoni & thymi, utriusq;
obolos duos, ex uino prebe bibendos. Ligaturas in-
super extremorum fortiter adhibe, & circa ipsum sto-
machum cucurbitulis & fomētis uarijs utere. Quod
si uehemens sit distentio, etiā uenæ sectio efficax erit
auxilium, & alui solutio per glandem supposititiā.

Porrō eos qui ex ingenti fame linquantur animo
reuocabimus odoramentis aceti aut pulegij, aut ma-
lis, aut piris. Excitantur etiam ad carnem suillam as-
satam, & ad omnia quæ multum alunt, præsertim ea
quæ nidorosum odorem exhibent. Instaurabis au-
tem ipsos ijs quæ confertim uires reficere possunt: cu-
iusmodi sunt oua forbilia, bulbi, cochleæ.

At singultientibus rutam cum uino dato, aut nitrum in
aqua mulsa, aut opium, aut castoriū, aut abrotonum,
aut aristolochiam.

Medicamen ex cydoniorum

succo, sanans mediocres oris uentriculi affectus.

Succi cydoniorum malorū, Sextarios.ij. Mellis Atti-
ci, tantundem. aceti sesquiseptarium: uel sextarium

unum. Zingiberis quadrantem. piperis albi, vnc. j.
Arida insperges, ubi malorum succus cum melle &
aceto coctus ad mellis crassitudinem fuerit.

Quæ pharmaca Asclepiades scripserit ad
affectus oris uentriculi.

EMplastrum ad subuersiones oris uentriculi, do-
loresq; atq; etiam inflammationes. Oenanthes,
drach. vj. croci, myrrhæ, floris rosarum, meliloti, ma-
stiches, aloes, corticis mandragoræ, singul. drach. iij.
Carnis palmularum, quadrantem. Omnia cerato ex
rosaceo confecto excipito, admouetoq;.

Aliud

Nicerati, coeliacis, dysentericisq; admodum genero-

DDdd ij

Cucurbitulas
admouēdas es-
se dolenti uen-
triculo monet
Archigenes.

Deliquium ani-
mi patietes ex
fame insigni,
quomodo sint
reuocandi.

Singultientibus
quæ opitulen-
tur.

Dia cydonio-
rum medicamen.

Oris uentriculi
affectib⁹ phar-
maca ab Ascle-
piade scripta.

sum. Oenāthes vuc. ij. rosarum siccarum, mastiches, aloes, gallarum omphacitidum, aluminis rotūdi, acaciæ, sing. vnc. j. ceræ lib. j. picis brutiæ quadrantem, olei myrtei, lib. j. Arida committito liquidis.

Aliud ad eadem insigne. Oenanthes, omphacij, galle omphacitidis, aluminis scissi, acaciæ, cytinorum mali punici, balauſtij, mastiches, sing. vnc. j. Vini myrtitis, quantum satis est his subigendis. Carnis phœnicobalanorum, sexuncem, exceptis lentiscino cerato utitor.

*Stomachica
medicamenta
debent habere
astringentia uim
præpollentem.
Hepatica me-
dicamenta mi-
sta esse debent
ex astringenti-
bus & relaxan-
tibus.*

*Malagma dis-
soluens hepatis
lieniscq; duri-
ties.*

Nili crocerum.

*Malagma Hie-
raticon ex me-
liloto, uiscerum
doloribus ac-
commodatum.*

*Malagma po-
lyarchion.*

Etenim in his, q̄ sint stomachica, meritò astringentia uis dominatur. At in medicamentis hepaticis relaxantia misceri astringentibus debent: quemadmodum sit in his quæ iam subdam, etiam ab Asclepiade prodita.

Malagma Nilo inscriptum, faciens ad præcordiorum dolores, dissoluensq; omnē duritiem, spleneticis atq; hepaticis maximè salutare. Ceræ, ammoniaci thymiamatis, olei cyprini, sing. lib. j. croci semunciam, aceti quod sit satis. Ammoniacum dissoluito: deinde arida adiungito.

Aliud Nili crocerum prædictis affectionibus accommodatum, faciens etiam ad erysipelata.

Ammoniaci thymiamatis, ceræ, rosacei, sing. lib. j. croci, vnc. j. aceti quod sit satis. Conficito.

Malagma ex meliloto, Hieraticon dictum, ad uiscerum dolores accommodatum.

Nardi Celticæ, cyperi, myrrhæ, sing. drach. x. cardamomi drach. viij. meliloti drach. xl. croci, amomi, utriusq; drach. viij. cypheos sacrificulorum, drac. xvj. ammoniaci thymiamatis, drach. xl. resinæ terebinthinæ, drach. viij. ceræ minam unam, olei Cyprini, drac. cxx. Vini odorati Italici, heminam. j. præpara, & utere.

Malagma Polyarchiō, peripneumonicis, stomachicis, lienosis, hydropicisq; maximè ex usu, faciens etiam ad affectiones circa uesicam aut uterum, ad omnemq; neruorum per consensum affectionem. Cere, terebinthing, bdellij, ammoniaci thymiamatis, carda-

momi, cyperi, sing. minam unam. meliloti, a momi, nardi Indicæ, croci, myrrhæ, thuris, xylocinamomi, sing. drach. xxv. olei cyprini heminam. j. Vini Italici quod sit satis. Conficito & utitor. Malagma An dromachi ex meliloto. Nardi Celticæ, cyperi, iridis Illyricæ, myrrhæ, sing. drach. viij. croci drach. iij. meliloti drach. xxv. ammoniaci thymiamatis drach. L. terebinthinæ tantundem. ceræ drach. C. Cyprini hemina dimidium. Aceti quod sit satis.

De hepatis affectibus & facultatibus.

PLeriq; Idiotæ quemadmodū stomachicas, sic hepaticas affectiones, uocant complures dispositiones iecinoris, tametsi maximè inter se contrarias: hoc est sub eodem genere plurimum inter se distantes. Non peccauerit autem quispiā dicens, propemodum omnia contraria eidem esse generi subdita. Cæterū contrariorum notio contingit, ubi plurimum inter se distant. Atqui plurimum in quoq; genere utrinq; distant à medijs extrema. Porro ipsius imbecillitatis iecinoris licebit nobis unicā assignare dispōnem, ceu causam: nēpe intemperie: quæ quidem quum in octo intēperātias distribuatur, rursus non malè dixerō, intemperiem ipsam non unā, sed octo dispositiones existere. Adhæc iuxta aliam sectionem duæ intemperie rum differentiæ fiunt: ac iuxta aliam tres: dum uidelicet aut secundum qualitates tantū alterantur partes affectæ: aut accedente etiā humorum affluxu, qui aut spatia tantū occupent in particulis affectis contenta: aut etiam substantiam ipsarum imbuant. Igitur circa uentrem & intestina quidem, una in singulis cavitates est, quæ possit uitiosam humiditatem suscipere: circa hepar autem, tot numero sunt, quot habentur arteriæ & uenæ. Etenim quum hæ omnes oscula angusta possideant, qua parte huius uisceris sima, cum gibbis coeūt, obstructions ab illis uitiosis suc-

Malagma An dromachi ex meliloto.

Contraria esse quæ sub eodē genere plurimum inter se disident. Extrema plurimū utrinq; distant a medijs in quoq; genere. Hepatis imbecillitatis intemperies est causa. Intēperies est octuplex.

Hepatis obstructions fieri quæ parte eius sima cū gibbis coeunt.

DDdd iij

cis aliquando oboriuntur, breui in frigidis intemperaturis: ut temporis progressu in calidis: ad quas tandem obturationes putrefactio cōsequitur. Quum autem hoc uiscus tot facultates sortiatur, quot actionum species, contingit sæpe unam ipsarum præcipuè laedi, sæpe duas & tres, atq; omnes quatuor simul. Est itaq; actio ipsius una quidem, ad se cibū & alimentum attrahere: altera uerò, ambire, cōtinereq; donec alterās ipsum, sui ipsius illud partem efficiat. Atq; hæc sanè dicitur alteratrix facultas, inter alias principalissima existens, & cui ferè primæ debentur partes. Quæ uerò iuxta hanc alterationem remanent excrementa, ea per excretricem facultatem exterminantur. Ostensum autem est has quatuor facultates, uniuersis, quādiu uiuunt, inesse corporis partibus. Vocatur autem alteratio ipsa, donec alimentum parti que nutritur assimiletur, concoctio. Vbi uerò iam parti apponitur, nutritio. Quum igitur hepar præ imbecillitate ex uentre & intestinis alimentum trahere non potest, liquida per sedem, & nondum exquisitè excocta excernuntur: simulq; cruda, si etiam cum hoc uiscere nentriculus imbecillus existat. Si uerò traxerit quidem alimentum hepar ex uentre simul & intestinis: in sanguinem autem ipsum nequeat conuertere, ob facultatis languorem: quemadmodum in uentre multiformis corruptio contingit, eorum quæ cruda remanent, sic etiam circa hepar. Est enim peior transmutatio in peregrinam qualitatem, iuxta cruditatem facta: moderatior uerò, in qua alimentum diu propriam naturam retinet, nullam dum alterationem indeptum. Atqui & tertia præter has, species frustratæ concoctionis existit, ubi semiconcoctum alimentum relinquitur. Ac per hanc sanè dispositionem, quæ ab hepate dericiuntur, referunt prorsus aquam, in qua uictimæ recens mactatæ carnes ablutæ fuerint. Au-

Hepatis facultates.

Alteratrix facultas hepatis est inter alias principalissima.

Facultates quatuor naturales inesse cunctis, quæ diu uiuunt, corporis partibus.

Hepatis lægum, de ab intestinis trahentis symptomata.

Mutatione ciborum per cruditates in peregrinam qualitatem, esse aliarum omnium deterrimam.

Hepate imperfecte mutante chylum in sanguinem, qualia excrementa excernantur.

Etiam autem affectu, nihil tale amplius excernitur, sed multiformes alia qualitates, consistētēq; expurgantur, ueluti à uentre dum cruditate laborat. Calida igitur intēperies si uiscus affligat, colliquationes accidunt, primum quidem, humorum: dein carnis ipsius hepatis: deīciturq; bilis crassa, graueolens, atq; admodum colorata, quemadmodum contingit in pestilentibus febribus. Si uerò frigida intemperies præpoleat, neq; assidue excretiones, neq; multæ fiunt: durat tamen affectus diutius, & per aliquos dies profuit ipsis uenter confertim magis: neq; fœtor excrementorum similis est ijs quæ ex calore sunt liquefacta: neq; color aut consistentia similis: uerum minus graueolentia ab his excernuntur, speciem putrefacti sanguinis, non colliquatae carnis, habentia. Aliquando uerò id quod deīcitur, nigrum sanguinem refert: diligenter tamen cōsyderanti, nec sanguis niger est, nec grumus, sed ueluti limus quidam sanguinis crassus, qui propè ad atram bilem accedat: in summa, plures, ægreq; iudicabiles colores circa huiusmodi affectionem cernuntur in alui excrementis.

SCOPVS igitur curationis in huiusmodi affectibus, communis quidem sit iuxta contrarietatem intemperantiae: peculiaris autem unicuiq; per cuiusq; contrarietatem. In uniuersum autem, affectio hepatica peculiariter appellata, ueluti etiam coeliaca, stomachicaq; citra tumoris præter naturam circa ipsas partes ortum, contingit. Siquidem quum citra manifestum aliquod in uiscere malum, in actionibus proprijs languescit hepar, tunc ægrum uocāt hepaticum.

Quæ pharmaca ad hepaticos ab Andromacho sint conscripta.

Antidotus cyphoides, ad hepaticos et omnia thoracis uitia. Vuæ passæ carnis, drach. xxv. croci drach. j. calami drach. ij. S. bdellij, tantundem, cassiæ

DDdd iiij

Hepatis intemperie calidam quæ sequantur symptomata.

Hepatis frigida intemperie signa & symptomata.

Hepatis intemperantias, per contrarias sanandas esse. Hepatici proprie dicuntur, quibus citra malum insigne, hepar in functionibus proprijs languescit.

Hepaticis remedia cōgruentia ab Andromacho scripta.

sesquidrachmam. cinnamomi obolos. iij. spicæ nardi
 drach. iij. floris iunci odorati, drach. ij. S. myrrhæ, tere-
 binthinæ, sing. drach. iij. rametorum aspalathi, drac. ij.
 mellis drach. xvj. uini quod sit satis. Conficito. Et
 enim cinnamomum omnes putrilaginosas, uirulen-
 tasq; corrigit facultates: quæadmodum cassia, & post
 hanc omne aromatum genus. Crocus astringens &
 cōcoctorium pharmacum, etiam putrefactiones cor-
 rigit. Vua passa astringit quidem quantum requirit af-
 fectum uiscus: habetq; uim aliquam concoquendi cru-
 dos humores, & coercendi maligna, existens etiam
 secundum totam substantiam iecori familiaris.
 Quippe ad intemperantias uiscerum ea pharmaca op-
 tina sunt, quæ præter quàm quòd intemperiem cor-
 rigunt, etiam alimentum largiuntur.
 Quo nomine uinum conuenientissimum est, citra in-
 flammationem, aut erysipelas, aut abscessum, aut intē-
 periem calidam, laborantibus. Nam & nutrit, & con-
 coquit, & roborat, & putrefactioni aduersatur, & si in-
 temperies ab humiditate & frigidityte profisciscatur,
 eam citra omnem molestiam, atq; tutò, per sanat. Ea-
 dem est & mellis facultas, præter q̃ quòd non conden-
 sat substantiā contacti corporis: sed pro hoc uim exter-
 gendi, & aperiendi, & puros reddendi meatus, uri-
 namq; ciendi, nō parua sanè auxilia, posidet. At bdel-
 lium sufficienter emollit, concoquitq; necnon mode-
 ratè discutit. Consimilem fermè uim terebinthina for-
 titur, supra hoc quòd angustos meatus extergit, expur-
 gatq; quibus auxiliis uiscus curandum indiget. Siqui-
 dem obstructio meatuum solet putrefactiones effice-
 re. Nōnulli autem huiuscemodi pharmacis opium, aut
 hyoscyamum, aut aliud quippiam refrigerantium mi-
 scendo, ad calidas intemperies utilia medicamēta effi-
 ciunt: quanq̃ ex hepaticis pharmacis nullū esse debet
 uehementer refrigerans. Alia ad hepaticos &

Putrefactiones
que corrigit.

Vua passæ fa-
cultates.

Viscerū intem-
perantiis ea ef-
se optia phar-
maca, quæ nō
modo intēpe-
riem corrigūt,
sed etiam ali-
mētum largiun-
tur.

Vini facultas.

Mellis facul-
tas.

Bdellium.

Terebinthinæ
uires.

Hepaticū phar-
macū nullum
esse debet ue-
hementer refri-
gerans.

MED. SEC. LOCA LIB. VIII. 425

Ictericos. Amygdalarum amararum, drach. ij. anisi, absynthii, cumini, seminis apii, sing. drach. j. cornu cerui, obolos. iij. Trita cum aqua in pastillos triobolares redigito, ex eisq; unū mane ac uesperī, cum uino mulso dato.

Hepatica Athanasia, ad nephriticos & ictericos, copiose sudorem promouens. Croci, drach. ij. nardi tantundem. cinnamomi, cassiæ myrrhæ, iunci odorati, sing. drach. j. Melle Attico excipito: datur fabæ ægyptiæ magnitudine: febricitantibus ex aqua mulsa.

Potio ad hepaticos, spleneticos, nephriticos, hydropicos, stomachicosq; Auxiliatur etiā molestiis ex partu, & cōuulsis. Prodest & cōualescentibus: nec non ad humores uitiosos, ictericos, tusfientes, pleuriticos, nec non ad letalia uenena, & ferarum ictus. Nardi Indicæ, costi, utriusq; drach. ij. cassiæ, croci, utriusq; drach. j. piperis albi, obol. v. seminis apii, drach. j. obolos. iij. iridis Illyricæ, tantundem. acori drach. j. obol. j. opobalsami, drach. j. succi ari masculi, drach. iij. uuæ passæ exacinate, drach. vj. Terito cum passo: aut melle excipito: ac drachmam unam cum uino dulci dato, aut cum aquæ mulsæ cyathis. iij. Nullum tamen horū medicamentorū calidis intēperaturis cōuenit, sed aut humidis, aut frigidis, aut ex utrisq; compositis.

Confectiones hepaticæ ab Asclepiade proditæ. Succu cichorii cyathum unum cum aquæ calidæ cyathis tribus, & mellis Attici cochleari uno, porrigito.

Aut filicis, aut feridis succi cyathum unū cum aquæ mulsæ cyathis tribus dato. Porro cichorium & feris ex genere cibariorum existunt. Facultas autem ipsorū subfrigida & subamara est, moderateq; astringēs: quarum qualitarum ratione, calidis hepatis intemperatiis summè conueniunt. Nam ultra hoc q; moderatè refrigerant, uisceri firmitudinem addunt. Sed nec frigidas intemperies magnopere lædunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatem absq; astrictione aut amaritu-

Ictericis optimū medicamē

Athanasia hepatica, nephriticis ictericisq; conueniens, copiose sudorē promouens.

Potio hydropi, aliisq; interaneorum affectibus summe utilis.

Hepaticæ compositiones ab Asclepiade scriptæ.

Cichorium.

Seris.

dine possident, facere solent. Iam, ob miscellam mellis, humores per urinas eliciunt. Quare si siccata & tusa quis potioni inspergat, itidem iuuant. Ad uisceris autem expurgationem, apertionemque; meatum, citra manifestam calfactionem aut refrigerationem, filix optimum pharmacum est, amaram qualitatem habens prædominantem.

Hepaticum catapotion.

Catapotion hepatices. Radicis chamæpityos, drach. viij. rad. cichorii, drach. iiij. contunde, & excipe melle cocto, præbeque; nucis ponticæ magnitudinem; & aquæ calidæ cyathos. iiij. insuper bibendos dato.

Hepaticus pastillus.

Pastillus hepaticus. Anisi, sem. apii, asari, amygd. amar. mund. absynthii, sing. drach. iiij. macerata ex aqua in pastillos redigito: exhibetoque; drachmā. j. cum uini diluti cyathis. iiij. febrientibus tamen cum hydromelite.

Hepaticum eclegma.

Eclegma hepaticum Paulini: auxiliatur confestim. Chamæpityos siccæ, lib. j. myrhæ, vnc. j. passi protropi, sextarios. iiij. Chamæpityn & uinum dulce coquito ad tertias. Postea liquorem exprimito, ei que; mellis Attici libram dimidiā adicito, ac rursus coquito. Dein uerò myrrham addito assidue agitando: quæ ubi dissoluta fuerit, ab igne ablata reponito, & ante cibum mysticum propinato.

Adhuc cochlearum trium carnem probe tritam, & cum tribus uini nigri cyathis calfactam porrigito. Hec enim iuxta totam substantiam sunt efficacia: non secundum unam aut alteram qualitatem. Similiter & lupini hepatis drachma una læuigata cum uino aliquo dulci, exhibitaque; manifestè hepaticis auxiliatur.

Hepar supi auxiliatur hepaticis.

Diureticum medicamen.

Confectio ciens urinas. Facit ad induratas hepatis affectiones, ad spleneticos, & ægrè se à morbo recuperantes: nec non ad hydropicos. In uniuersum, probum colorē conciliat. Croci, nardi, cassiæ, sing. drach. ij. costi, floris iunci odorati, cinnamomi, myrrhæ stactæ, sing. drac. j. mellis cocti, drach. xxvj. datur fabæ Ægypticæ magnitudine, cum uini mulsi cyathis. iiij. Alia, eadem

commoda præstans, ad aliasq; internas affectiones, citra tussum, conducens. Rad. gentiane, chamæpityos, marrubii, seminis petroselini, fellis ursi, sinapis, sem. cucumeris, scolopendrii, panacis, rubrici sinopice, rubig, seminis brassicæ, aristolochie longe, piperis albi, spice nardi, costi, sem. eruce, eryngii, baccarū iuniperi, sem. fraxini, chamædryos, dictamni Cretici, seminis cestri, sem. dauci, sing. vnc. j. mellis Attici quod sit satis. Confito. Datur nucis pontice magnitudo, ex passu Cretici cyathis duobus.

Hæc Asclepiades ad indurata viscera. Miscenda tñ in hisce affectibus sunt cum discutientibus etiam mollientia pharmaca, quæ præparentur indurata corpora, aptaq; prædictis medicamentis excipiendis efficiant. Siquidem citra præmollitionem diffunduntur quodammodo ea ipsa corpora, & euestigio manifestam imminutionem habent: sed quod reliquum ex affectu est, ubi exiccatum improbè fuerit, immedicabile permanet. Ceterum quum hepatis corpus sit consistentia humidū, moderatis emollientibus eget.

Quæ Archigenes scripserit ad hepaticos.

Vnguenti nardini cochlearia. iij. quotidie bibenda dato, & maximè in induratis. Aut aristolochie obolos. iij. ex aqua quidem, febrientibus; febre autem carentibus, ex uino porrigito. Aut fel ursinum in uase leniter feruefacito, & in sole assicato, atq; ex eo hepaticis cochleare unum dato.

In magna durtia abrotoni succum q̄ crassissimum da bibendum. Aut acori obolum unum: panacis tantundem, propinato ex aqua.

Aut spice nardi decoctum assiduè exhibeto. Cataplasma hepaticū sit ex malis cotoneis cum farina hordeacea, & scenogreco concoctis. Aut ex semine lini trito cum polenta uino incocta. Aut ex capparis radice in aceto mulso percocta. Aut ex farina hordeacea cum ficibus. Aut ex palmularum carne tusa, mistaq; pari rosacei cerati portione.

Malagina

Discutientibus medicamentis, quæ ad indurata viscera propinantur, cur miscenda emollientia.

Hepatis corpus moderatis emollientibus eget.

Hepatica medicamenta ab Archigene scripta.

Hepatica cataplasmata ex quibus conficitur.

Hepatica ma-
lagmata.

Andromachi ad hepaticos. Ammoniaci thymiamatis drach. cxliiij. bdellii drach. xxiiij. aceti heminas. iij. Cyprini heminam. j. Conficito. Malagma Apolophanis. Cere drach. lxxx. ammoniaci thymiamatis, tantundem. Terebinthine drach. xl. manne thuris, tantundem. Cum irino contundito.

G A L E N I P E R G A
M E N I D E C O M P O S I T I O N E
M E D I C A M E N T O R V M S E C V N
dum Loca, Liber Nonus.

De Ictericis.

Ictericæ per
morborum iu-
dicationes or-
tæ, curatio.



Ictericia ex ob-
structione orta
absq; febre p-
manet, quod
non contingit
illi quæ ab in-
flammatione du-
cit originem.

IVNT etiam icterici, ratione optime iudicationis in febris, prouente nimirum ad cutem bilioso humore: ac facile sanè hi curantur balneis potabilium aquarum, & olei discussorii affricu, omniumq; rarefacientium cutem: quale est anethinum oleum, chamæmelinum, atq; cicinum. Post hæc etiam unguenta faciunt, gleucinum, & comaginum: dein irinum atq; amaracinum. Verùm alias confectiones priuatim ictericas appellatas, ne putes ad huiusmodi ictericos cõuenire, sed ad eos, qui uasorum iuxta hepar obstructione laborant: necnon ad illos qui ex inflammatione icterici fiunt. Cæterùm qui in regium morbum ex obstructione inciderunt, absq; febre permanet. Qui uerò ex inflammatione, omnino febricitant. Quæcunq; igitur admodum medicamentosa existunt, iidemq; facultate calida, febrientes magnopere lædunt. Talia sunt gentiana, struthion, helenium, costus, aristolochia, poliu, centaurea. Conueniunt autem ictericis ex inflamma

to hepate, quæcunq; sanant inflammationes: quemadmodum etiam iis qui ex obturatione, omnia quæ strenuè extergent, etiam si medicamentosam substantiâ, calidamq; facultatem sortiantur. Si uerò obstructio simul & inflammatio coeant, laxantibus simulq; extergentibus opus erit.

Ad ictericos absq; febre, medicamen Andromachi. In colocynthidis calicem uinum fundito, calfacitoq; & bibendum dato. Subducit enim aluum.

Aliud. Adianti obolos. iij. nardi obolos. ij. absynthii drach. j. myrrhe obolos. iii. Passo excipito, instarq; auellane nucis ex aquæ cyathis duobus porrigito.

Asclepiadis remedia ad Ictericos. Cichorii succi cyathos. vi. Febrientibus per se dato: febre uerò carentibus, cum uini cyathis tribus.

Aliud. Anchuse tenuis simè tritæ cochlearia. ij. cum aqua potabili exhibe.

Aliud Nicerati urinam ciens. Cicerum siccorum sextarium. j. roris marini, manipulum. aquæ sextarios. vi. fœniculi manipulum. j. rad. asparagorum palustrium, manipulum. j. Decoctum excolatum porrigito assiduè, febrientibus quidem, simpliciter: febre autem carètib; ex uino diluto.

Aliud. Asari, absynthii, utriusq; drach. viii. seminis anisi, fœniculi, apii, amygdalarum amararum repurgatarum, sing. drach. iij. Aqua subigito, atq; pastillos formato: ex quibus drachmam. j. cum uini mulsi cyathis tribus non febrientibus exhibeto.

Errhinon trahens bilem per nares. Nasturtii & roris marini uiridium succum, aut elaterium cum lacte muliebri tritum, infundito naribus, atq; attrahere iubeto.

Archigenis remedia ad ictericos. Chelidoniæ herbæ succum cū uino aut aqua mulsa propina. Vel adianti, uel rubiæ radicis obolos. iij. cum aqua mulsa exhibe.

Aut felis ursini cyathum bibendum dato. Aut stercoris canini albi sextantem, cum mellis quadrâte ad triduum bibendum dato.

Aut adianti, & mentæ, & rubig

Ictericis quæ
medicamenta
conueniant.

Ictericorum re
media varia, a
diuersis con
scripta.

Errhinon tra
hens bilem per
nares.

parem mensuram in aqua feruefacito, & heminā inde bibendam exhibeto, diutius ad solem insolato, sitienti; & anheloso, quo post acceptum potum exudet. Quippe statim transmutat colorem.

De splenis affectibus.

Partes singulas familiare sibi alimentum trahere.

Lienem ali a sanguinis sedimento.

Lien cur induretur facile.

Lieni affectio qualia conueniant medicamenta.

Liene trahente languide, sæculetus sanguis per uniuersum corpus digeritur.

Lieni cur amara, quibus astringentia sint mista medicamenta conueniant.

QUum autem omnes corporis partes familiarē sibi ipsis ex uenis humorem trahant, lien certē id quod ueluti fœx sanguinis est, ex qua gignitur atra bilis, ad sui alimoniam asciscit: unde hoc uiscus minimo negotio contrahere sibi scirrhum est natum, sanguine nimirum in uenis ipsius obturato, et ob crassitudinem nec excerni, nec discuti faciliē potente. Attenuatibus igitur opus habet pharmacis, citra manifestam caliditatem, ne impactus in ipso succus impingatur uehementius. Quo uerò actiones ipsius cōseruentur, ex austeris aliquid eis admiscetur: quale etiam astringentium genus existit. Porro quum uniuersæ particulæ, propriæ incolumitatis gratia, certas quasdam facultates possideant, attractricem uidelicet familiarium, ac tum alienorum expultricem, tum assimilatricem eorū quæ sibi attraxerunt, aliquibus ipsarum insuper inest, ut ex accidenti sint uniuerso corpori ex usu. Ex horum itaq; est genere lien, qui ex hepate ad se ueluti limum sanguinis trahit, quēadmodum fellis uesica bilem: atq; renes urinam. Si igitur præ imbecillitate eiusmodi sanguinem ad se attrahere sit minimè potens, per uniuersum corpus uitiosus humor dispergitur. Ob id itaq; naturalē ipsius firmitudinem custodire oportet, quo conueniēs sibi alimentum alliciat, per quam actionē uniuerso corpori ad humorum bonitatem conducit, & excrementa genita in ipso demittere in uentrem potest, ut unā cū excrementis alui excernantur. Igitur hac ratione ipsi ualde amara medicamenta exhibemus: quibus miscemus etiam ex austeris nonnulla; sicuti & alia quædam, ceu materiam congruentem ad unguentorum & cataplas-

MED. SECT. LOCALI LIB. IX. 431

matum cōpositionem; cuiusmodi sunt cera, resina, pix,
& bitumen. Nam primaria ratione acetū & oxymeli,
visceri cōmoda existūt, utpote secare et attenuare cras-
sos humores ualentia, citra calfactionem. Deinceps
itaq; eorum pharmacorum mentionem faciam, quę lie-
ni indurato auxiliantur.

Pharmaca potabilia ab
Andromacho ad spleneticos cōscripta. Porio Antipa-
tri. Carnis myrobalani, drach. iiii. scolopēdre, drach. vi.
cort. rad. cap. costi, sing. drach. iiii. chamēdryos, drach.
vi. polii drach. ii. rad. cotyledonis, drach. ij. corymbo-
rum hederæ nigræ, grana. xxv. ammoniaci thymiamatis,
drach. iiii. sem. hyperici drach. ij. chalbani tantū dē.
sem. periclymeni drach. j. aut rad. drach. iiii. cardamo-
mi nigri sesquidrach. succi scillæ, drach. xvi. Dantur
oboli duo in aceto mulso.

Aliud stomachicum,
splenicumq;. Myrthæ, nardi Indicę, cort. rad. cap-
paris, radice panacis, rad. peucedani, dictamni, cort.
rad. periclymeni, sing. drach. iiii. costi, drach. v. polii
drach. ij. rubiæ drach. iiii. S. ammoniaci thymiamatis,
drach. iiii. S. iridis tantū dē. Excipito aceto mulso, da-
toq; obolos duos cum oxymelite.

Pharmaca po-
tabilia ab Asclepiade ad splenem conscripta. Cyno-
glossi manipulum cum uini cyathis. iiii. terito, & expres-
sum liquorem ante cibum bibendū dato. Colligere ta-
men oportet herbam sinistra manu ante solis exortum.

Aliud. Trixaginis manipulū cum uini sextario uno
coquito, & expressum liquore reponito; atq; ex eo cya-
thos. ij. ante cibum dato. Catapotium splenicū.

Myricæ fructum tusum & cribratum chalbano exci-
pe, in catapotiaq; redige, quæ exhibebis pro uiribus.

Pastillus splenicus. Fructus ericæ drach. iiii. pi-
peris albi, nardi Syriacæ, ammoniaci thymiamatis,
sing. drach. ij. arida tunduntur & cribrantur. Ammo-
niacum dissoluitur aceto scillitico, & aridis additum in
pastillos cogitur, quorum singuli pendeāt drachmam.

ad hoc insi-
dium, sicut
IA de p...
hol ob...
...
...

Lieni congru-
entia pharma-
ca, Androma-
cho scripta.

ad hoc insi-
dium, sicut
IA de p...
hol ob...
...
...

Lieni pharma-
ca ab Asclepia-
de scripta.

ad hoc insi-
dium, sicut
IA de p...
hol ob...
...
...

ad hoc insi-
dium, sicut
IA de p...
hol ob...
...
...

Lieni epithe-
mata, cataplas-
mataq; ab As-
clepiade scri-
pta.

Lieni pharma-
ca optima ab
Archigene scri-
pta.

Lienosis eadē
cataplasmata
opitulari, quæ
hepaticis.

Lieni, si malū
sit pertinax, cu-
curbitulas effi-
gendas esse, cū
scarificatu.

Daturq; drach. j. ex oxymelitis cyathis. iiii.

Epithemata & emplastrata eiusdem Asclepiadæ. Fo-
liorum tenerrimorū sabuci arboris, lib. iiii. aloes, lib. j.
cum aceto subigito, & linteolo infarcta admoueto.

Vel. Cera, resinæ pinus, & frictæ, sing. lib. ij. arsenici,
aluminis scissi, calcis uiuæ, sing. sextantem. aceti, olei,
utriusq; cyathos. viii. conficito & admoueto.

Malagma Antiochidis, ad spleneticos, hydropicos, is-
chiadicos, arthriticosq; conueniens. Cera lib. iiii. resi-
næ terebinthinæ, tantundem. retrimentorū ab expressa
myrobalano reliquorum, spumæ nitri, floris lapidis
Asij, ammoniaci thymiamatis, sing. lib. j. olei Cypri-
ni, lib. iiii. Aceti quod sit satis ad ammoniacum dissoluē-
dum.

Malagma aurei coloris. Auripigmenti,
unc. j. aluminis scissi, calcis uiuæ, sing. sextantem. Ce-
ra, resinæ frictæ, & pinus, sing. lib. ij. myrrhæ sextantē.
Arida increta, leuigataq; per affusionem aceti cyathos.

Pharmaca ad sple-
neticos ab Archigene scripta. Potus sit aqua quæ fer-
rum candens extinxerit: sola quidem, febrientibus: ui-
no autem immista, iis qui febre carent. Aut corti-
cis radicis periclymeni, & seminis eius, quantum tri-
bus digitis apprehendi possit, in uino albo meraco ca-
lido, ieiunis curriculo xl. dierum bibendum dato.

Aut uulpis hepar siccum ex oxymelite propinato.

Aut folia capparis arida & trita exhibeto. Cataplas-
mata autem eadem splenicis quæ hepaticis admoue-
bis: ampliusq; cinerem ex ferraria officina cum aceto.

Aut nasturtium & fœnumgræcum, & calcem uiuā,
& nitrum, cum melle emollita imponito. Aut fe-
cem acris aceti, aut capparis radicem cum aceto impo-
nito.

Perseuerante malo cucurbitas cum scarifica-
tione affigito. Aut uenā retro sinistram aurem seca-
to, & detracto sanguine confricato affectum lienē.

Remedia ad hydropem ab Asclepiade scripta.

Malagma

MED. SEC. LOCA. LIB. IX. 433

M Alagma Ipoterium, resorbens humiditates ab alto, simulq; duritias discutiens. Cerae, picis

aridae, utriusq; lib. i. liquidi, sulfuris uiui, mannae, nitri rubri, sing. lib. j. resinae frictae, lib. iiii. olei ueteris, heminam. j. Arida liquidis permisceto.

Malagma ex baccis lauri ad eadem.

Cerae, resinae pinus, picis brutae, baccarum lauri ficcarum, nitri rubri, ammoniaci thymiamatis, adipis uitulini subacti, sing. lib. j.

Liquefabilia liquentur, & frigesacta misceantur aridis reductis in tenuissimum pollinem.

Emplastrum tōsoris, ad splenicos & hydropicos, quo etiam

ischiadicos liberauit. Picis aridae lib. iiii. cerae, resinae pinus, ammoniaci thymiamatis, nitri rubri, bacca-

rum lauri aridarum, sing. lib. ij. adipis taurini lib. j. iri-

dos lib. ij. canchryos, vnc. xviii. farinae scenigreci, pol-

linis, radice chamæleonis nigrae, tenuissimè tritae, sin-

gul. sextarium unum. cumini tenuissimè triti, sesqui-

sextarium. passi sextar. j. Conficito & utitor.

Cleophanti cataplasma ad hydropicos. Cerae, resinae,

spumae nitri, sing. drach. C. chalbani, propolis, ammo-

niaci thymiamatis, sing. drach. xij. S. cyprini, cyathos.

ij. acetum tantundem. conficito cataplasma.

Archigenis remedia ad hydropicos. Stercus bouis armenta-

riae tritum, coctumq; in posca, inspersaq; sulfuris uiui

quarta portione, redigito in cataplasma, idq; toti uen-

tri admoueto.

Aut elaterii, staphidis syluestris,

hyssopi, fellis taurini, æquales omnium partes ficibus

contusis excipiens, mulsaq; læuigans, similiter applica-

to.

Aut ueratrum nigrum, fel taurinum, nitrum,

piperq; ex æquo mista, melleq; excepta, per semihoræ

rempusculum uentri imposito. Per omne autem cura-

tionis tempus, Cotyledonis, scillae aridae, sing. drach. j.

in uino mulso diluto quotidie exhibe.

Aut corticis rad. ari, similiter drach. j.

Aut radicem calaminthe co-

ctam propina. Ad hæc hydropicos diutius ad solē, sed

Hydropicis co-
guentia malag-
mata ab Ascle-
piade scripta.

Hydropicis re-
media ab Ar-
chigene scrip-
ta.

Tomus IIII.

EE e e

Hydropicos esse sub ardenti sole fricandos oleo saluginofo, perfundendosq; muria: necnon talos illis scarificandos.

confecto capite inungito ex oleo, cui multum salis admistum sit: ex multaq; perfundito salugine calida. Inflatos uerò maximè locos, uescicis magnis probè inflatis quotidie continenter pulsato. Incisis item, aut scarificatis ipsorum talis, & uulnuscule impactis, in ferculo ipsos aut lectica circumuehito. Summè etiam faciunt Theriacæ omnes urinam cientes, insuperq; potiones aquam ducentes.

De pharmacis dolorem sedantibus, anodynis & colicis appellatis.

Anodynis uti quibus de causis soleamus.

Huiusmodi pharmacis, ob dolores ingentes, aut uigilias, aut ne per uolentam tussim lancinemur, uti consueuimus. Ad quas quidem affectiones, si modicæ sint, confectiones ex seminibus, priuatim tussiculares dictæ, sufficiunt: quæ & ipsæ aliquid ex soporiferis seminibus possident, uerum modicum inter multa adeò semina, quæ odorata, & tenuiū partiū, ac urinam mouētia existūt. Cuiusmodi sunt cuminū, daucum, feli, apiumq; & anisum.

Philonis antidotus ad graues interaneorum cruciatus conferens.

Opii uires.

Opio miscēda qualia esse debeant medicamenta.

Compositiōis medicamento-riū opio cōstantiū optimū scopum tria sibi proponere.

Philonis Antidotus, ad omnes graues dolores uiscerum, ad aliaq; multa conueniens. Croci, drach. v. pyrethri, euphorbii, spicæ nardi, sing. drach. j. piperis albi & hyoscyami, utriusq; drach. xx. opii drach. x. Melle Attico excipito. Etenim opium ualidissimum est inter ea quæ sensum stupefaciunt, atq; soporem conciliant. Operatur autem hæc, etiam solum sapa dilutum, tomentoq; exceptum, ac sediditum, necnon illitum fronti & naribus. Si uerò cum alio quoque uim ipsius moderante misceat, moderatius hæc facit. Verum quæ admiscantur ipsi, aut concoquant, aut mitigent dolorificam affectionē oportet, aut humores affectionem gignentes discutiant, aut dissecant, aut attenuent, aut iuxta totam substantiam alterent. Quum igitur optimus cōpositionis scopus, tria sibi proponat: nimirum ut & sensus stupefiat, & nullū in posterum circa particulam inde detrimentum rema-

neat, amplius q; ut affectio ipsa inde iuuetur: ad hec omnia respiciens Philo, prædictum composuisse uidetur pharmacum: ex opii quidem, hyoscyamiq; mistura soporem, sensutricisq; facultatis stuporem inducere uolens. Quo uero hæc citius distribuere, & totâ affectuum partium penetrarent profunditatem, calfacientia admiscuit, pyrethrum, euphorbiû, & piper, quæ nocentes humores discutere possunt, extergere uiscidos, incidere crassos, ac deniq; flatulentos attenuare & dissoluere. Est aut, non modica concoctoria uis omnium frigidarum affectionum in nardo sita: quæ aut Indica, aut Celtica iniicienda est. At crocus humorum crudorum est concoctorium, atq; item affectionum uirulentarum.

Nardi facultas.

Croci facultas

Celtica medicamina Andromachi.

Colica medicamina Andromachi. Anisi drach. vi. seminis apii, drach. xij. nardi, drach. iiii. castorii, drach. iii. petroselini drach. iiii. piperis albi & longi, utriusq; drach. v. myrrhe drach. vi. iunci odorati, drach. iii. succi papaueris drach. vi. croci drach. iii. Melle excipito. Datur ad summum nucis regie parua magnitudo ex aquæ calidæ cyathis. iiii. minimû nucis ponticæ magnitudo. Aliud admirabile colicû ad uoluulosos, & sterCUS per os reddentes. Piperis albi, sem. hyoscyami, utriusq; drach. xl. opii drach. xx. croci drach. x. spice nardi, euphorbii, pyrethri, sing. drach. ij. Excipe melle cocto. Datur magnitudine fabæ in aquæ frigidæ cyathis iii. aut. iiii.

Colica Isotheos dicta, ad stomachicos, oculorum dolores, uteriq; labores, ex aqua mulsâ, ubi ruta fuerit incocta. Croci sesquidrachmam. nardi drach. ij. myrrhe drach. viii. costi, piperis albi & longi, chalbani, sing. drach. j. opobalsami, drach. iiii. cinnamomi, succi mandragoræ, castorii, sing. drach. ij. seminis dauci drach. iiii. S. sagapeni drach. iii. cassiæ drach. iiii. excipe melle Attico.

Alia non minus admirabilis. Succu centaureæ, castorii, scille assatæ, piperis albi & longi, myrrhæ, rutæ hortensis, hyssopi, labrotoni,

EEcc ii

riidis Illyricæ, sing. drach. ij. croci, ammoniaci thymia-
 matis, rad. acori, phu pontici, zingiberis, ueratri albi,
 sing. drach. j. oxymelite excipito. Datur etiam drach-
 ma. j. ex aceto mulso. Chariclis, ad coli inflationes,
 remedium. Cumini Æthiopici, drach. vi. sem. apii, dra-
 ch. v. seminis dauci Cretici, drach. ij. piperis albi, dra-
 ch. j. Tusa & cribrata reponito. Datur cochlearia duo,
 cum aquæ mulsæ cyathis tribus. Confectio Lin-
 gonis colica, quæ data ex frigida, statim soluit dolores.
 Sem. hyoscyami albi, drach. xx. opii, seminis dauci Cre-
 tici, utriusq; drach. x. petroselini, drach. vi. croci, spi-
 cæ nardi, pyrethri, sing. drach. iiii. euphorbii, opobalsa-
 mi, cinnamomi, sing. drach. ij. Excipito melle cocto, ac
 fabæ Ægyptiæ magnitudinem exhibeto, cum aquæ te-
 pidæ aut frigidæ cyathis. iij. in irritationibus.

De dysentericis.

Dysenterici ue-
 ri sunt, quibus
 est aliquod in-
 testinum exul-
 ceratum.

Dysentericis
 remedia scri-
 pta ab Andro-
 macho,

DEinceps medicamenta scribemus, quæ uerè dy-
 sentericis auxiliantur, quos nulla alia infestat af-
 fectio, præter ulcus intestinorum, aut nudum, aut cum
 putredine obortum, quam nomen appellant.

Quæ ab Andromacho ad dysenteriam scripta sunt.

Potio ad dysentericos & hæmoptoicos. Florum rosa-
 rum, opii, acaciæ, gummi, sing. drach. iiii. balauſtii tan-
 tundem. succi hypocisthidos tantundem. gallarum, se-
 minis plātaginis, succi eius, sing. drach. ij. lycii Indici,
 succi rosarum, sing. drach. j. Cōſice pastillos drachma-
 les, & uariè utere. Ad dysentericos & celiacos

confectio ex fructibus. Mala punica integra, xx. cydo-
 nia toridem. erui sextarium. j. prunorum syluestrium,
 sextarios. ij. Sorborum Ephesinorum, tantundem. Rhois
 Syriaci, sextar. iij. pira Terentiana. xx. Cestiana. xxx: si-
 liquas xl. baccarum myrti nigrarum, sextar. iij. musti
 aminæi ad tertias decocti sextar. xlviij. Coquito simul
 ad mellis spissitudinem, & in figulino reponito.

Alia. Nardi, croci, utriusq; drach. viii. aloes, thuris,

MED. SEC. LOCA LIB. IX. 437

ſing. drach. ij. acaciæ, myrrhæ, ſucci hypociſthidis, roſarum ſiccarum, lycii Indici, tragacanthæ, opii, ſing. drach. iij. piperis drach. ij. Aqua excipito: paſtillos q; duarum drachmarum facito, et cum uino myrteo exhibeto.

Ad dysentericos, coeliacos, & hæmopticos, ex Cornelio medico. Myrrhæ, thuris, aloes, croci, opii, rhois Syriacæ & coriariæ, lycii Indici, acaciæ, malicorii, ſucci hypociſthidis, gallæ, balauſtiorū, ſing. par pondus in paſtillos cogito, & ad noctem febre carentibus ex uino: febrientibus uero ex frigida propinato.

Hæmopticis
medicamē Cor
nelii.

Potio Apollonii ad fluxum muliebrem ſiſtendum. Corallii, balauſtii, utriuſq; obol. iij. gummi obol. j. Excipe oui crudi candido: & dimidium totius cum aqua cyathis quatuor propina.

Fluxui mulie
bri ſiſtendo po
tio Apollonii.
Clyſmi dysen
tericis apti.

Infuſa Dysentericis cōmoda. Infuſum Athenæi ad recti inteſtini ulcera. Omphacii, aluminis ſciſſilis, calcis uiuæ, ſquamæ grise, ſing. drach. vi. auripigmenti drach. viij. ſandarachæ, drach. iij. chartæ uſtæ drach. xv. cum uino myrteo paſtillos drach. iij. aut trium, formato. Infunde autem cū uini duluti cyathis. iij. & aque tepidæ cyathis duobus.

Infuſum Heræ. Chartæ uſtæ, cadmiæ, auripigmenti, ſing. vnc. j. calcis uiuæ extinctæ ſucco plantaginis, vnc. S. Omnia redigito in pollinem, & cochlearia. ij. cum decocto baccarum myrti, aut uino myrteo, infundito.

Infuſum Nicoſtrati. Calcis uiuæ drach. j. gypſi, drach. viij. acaciæ drach. ij. omphacii, drach. j. ſtibii drach. iij. thuris drach. j. gallæ drach. iij. tragacanthæ, drach. ij. cum uino myrteo in paſtillos redigito.

Aſclepiadis ad dysentericos remedia. Rhois Syriacæ, farinæ polentæ, uux paſſæ, ſing. drach. ij. malicorii ruſi & cribrati, drach. j. Excipito melle cocto, atq; myſtrum unum ante cibum porrigito, Aliud probatum. Gallarum redactarum in pollinē, cochleare unū. piperis albi, rhois rubri, malicorii tenuiſſimè triti, ſingul. tantundem. Omnia oui luteo excipito, & in uacuā

Dysentericis
remedia ab Aſ
clepiade ſcri
pta.

EEee iii

mali punici testam conicito, atq; obturato cum farina osculo ipsius, ad prunas torrefacta depurgata mali punici testa, cochlearium unum edendum dato. Pastillus

Philippi ad dysentericos inueteratos, dolorem sedans, qui bibitur q; & infunditur Balauftii, acaciae, succi hypocisthidis, rhois, apii, thuris, myrrhae, baccarum myrti ingrarum, croci, gallarum, lycii, aloes, rhei pontici, malicorii, sing. drach. iij. Excipito uino Italico, cogito q; pastillos pondere obol. iij. ac porrigito non febricitantibus quidem, ex uino: febricitantibus uero ex mulsa.

Dysentericis
epithema com-
modum.

Epithema coeliacis, dysentericis q;. Sem. hyoscyami albi, apii, utriusq; trientem. anisi, floris rosarum, succi hypocisthidis, balauftii, rhois Syriaci, sing. sextantem. succi papaueris, croci, utriusq; vnc. j. Singula cum uino myrteo terito: dein mista in pastillos redigito, quos in umbra assiccato. Inde uero quantum sufficit tundens & cribrans, palmulis passis excipito, ac tandem linteolo imposita, uentri admouero.

De affectibus sedis.

Sedis uicera
cur ægre cura-
tionem recipiunt,
& qualia phar-
maca possunt.

Sedis uitia, ob ipsius partis sensum exquisitissimum, & ob crebrum per ipsam excrementorum decursum, ægre curationem recipiunt. Aptissima autem ipsis pharmaca sunt, quæ absq; aspredine astringunt: qualia maximè sunt, quæ ex metallicis neq; acris, neq; acerbis existunt. Hæc si quidem lota, citra mordacitatem (id quod requiritur) operantur.

Sedis medica-
menta ab An-
dromacho scri-
pta.

Medicamenta sedis ab Andromacho scripta. Cerussæ, lithargyri utriusq; drach. v. thuris, aluminis scissi, utriusq; drach. iij. croci obolos. iij. Vini & rosacei quod sit satis. Conficito.

Aliud. Butyri, cere, utriusq; fescunciam medullæ ceruinæ, cæsyti, thuris, sing. vnc. j. aluminis scissi quadrātem. Lycii, sextantem. Vini & rosacei, quod sit satis. misceto.

Aliud. Adipis anserini curati, ceræ, thuris, medullæ cerui, florum rosarum, pompholygis, cadmiæ, plumbi loti, sing. drach. iij. cerussæ drach. viij. cerebri

gruis drach. ij. succi papaueris sesquidrachmam. œsy-
pi drach. v. succi seridis heminam. j. rosacei heminā. S.
confundito.

Pinguis compositio ad achoras & Pforis utilis
pforas. Spumæ argenti, cerussæ, utriusq; drach. xxxij. compositio.
atramenti sutorii, drach. xvj. sulfuris uiui, drach. viij.

Olei myrtei & aceti quod sit satis: misceto.

Ad prolabentem sedem. Recrementi plumbi, drach. Sedis plapfus
viij. Rhois Syriaci, tantundem. floris rosarū drach. iij. remedium.

myrrhe Minnææ drach. ij. Insperge siccū, ubi prælu-
ris uino austero, aut uini decocto.

Aliud. Gallæ
omphacitidis, rhois coriarii, sing. drach. ij. plumbi usti,
drach. iij. spumæ argenti, drach. viij. trita inspergito.

Hæmorrhoidibus extrahendis pharmaca ab Af- Hæmorrhoidi-
clepiade scripta. Piperis, nitri, utriusq; drach. j. teri- bus ab Afcle-
to admoueto q;. Aliud. Spumæ nitri, fellis tauri, sta piade scripta
phidis syluestris, sing. drach. j. Trita, excepta q; modi remedia.

co melle, adhibeto. Postea uerò q; eminentes fue-
rint, atq; in propatulo, accipe cerussæ vnc. j. spumæ ar-
genti quincuncē, pompholygis vnc. j. olei myrtei bes-
sem. Vini boni tantū dē, butyri vnc. j. Confundito q;,
& applicato. Cæterū ad arduos sedis dolores, oui
assati uitellum uino albo terito, & cerato myrteo exce-
ptum, illinito. Ad pudendorum affectus.

EXulcerati pudendi cognitio, ex manifesto circa ip-
sum dolore paratur: unā cum hoc, q; etiam circa Pudendorū vl-
mictiones excernitur quid ex corpusculis ulcери ipsi in cera dignoscē-
sidentibus. Discernuntur autem hæc ab ijs quæ ex ue- di ratio.

sica ferunt, q; statim ī ipso primo locii exitu appareāt:
q; uerò à uesica excernunt, deferant cū urinis pmissa.
Cæterū ulcera pudendorum, & circa sedē citra inflā-
mationem consistentia, resiccantibus ualde, indigent
pharmacis, qualia sunt, quod ex charta combusta con-

stat, & anethum ustum, & cucurbita usta. Verū sic-
cis & recentibus ulceribus, etiam aloë bonum est me-
dicamē. Omnium autem maximē dolorem sedat, nec
tulentur.

EEee iij

Vlcera vesicæ
uteriq; iisdem
quibus puden-
di vlcera medi-
camentis indi-
gent.
Metrenchyte.
Catheteres

Pudendo tume-
scēti remedia

Pudendi fissu-
ras, tubercula
q; quæ sanent.

Pudendorū in
flāmationibus
quæ opitulent.

Priapismus est
auctio colis p-
manens, in lati-
tudine, longitu-
dinemq; citra
rei venereę ap-
petentiam.
Priapismi cu-
ratio.

ullo minus efficax est pompholyx. Si uerò humectio-
ra sint ulcera, pinus cortex per se, & lapis hematites: ut
si profunda, manna etiam prædictis addatur. Porro
quæ circa uterum aut uesicam consistunt ulcera, eisdē
medicamentis indigent, sed instrumētis insuper opus
habent, quæ ipsa intromittant, ut sunt metrenchyte, &
catheteres uocati. Aptiora itaq; sunt arida, qualis est
crocus, pompholyx, & aloe, quæ facili plantaginis, aut
alteri tali succo miscentur. Ad scroti & pudendi do-
lores. Butyri & resinæ pari mensura utere. Aut se-
men lini cum aqua coquito, & admista myrrhæ fermē
decima parte, & resinæ tantundem, imponito. Ad
pudendum intumescens. Foliorum uitis tenerorū dra-
ch. j. cerussæ drach. v. trita cataplasmatibus uice impone.
Aut lenticulā in aqua coquito, & cum mali punici cor-
tice tritam imponito. Si uerò ē sudoribus ulcera in
scroto fiant, gallam tritam cum alumine inspergito.
Ad tubercula in pudendis nascentia, piri semen insper-
gito, & fel hircinum oblinito. Fissuras & rimas iuuat
rosaceum, amyllum, & thus, paribus portionibus mi-
sta. Aut foliorum hederę aridorum ustorūq; cinis,
cum oleo in plumbeo mortario triti. Ad pudendorū
inflammationes, farinam hordeaceam hydromelite in
coquito, & uitis folia tenera cum polēta terito, simulq;
omnia imponito. Excrescentem testiculorum car-
nem cinis sarmenticius cum nitri & aqua subactus sa-
nat, cataplasmatibus uice impositus.

De Priapismo.

Priapismus est auctio colis permanens, in longitu-
dinem atq; orbem tumefacti, citra rei Venereę ap-
petentiam. Cuius affectionis est causa flatulentus spi-
ritus ex humoribus crassis & uiscidis genitus per mo-
deratam caliditatem. Debent igitur refrigerari leniter
partes per ceratum rosaceū in aqua maceratum, itēq;
per chamæmelinum ceratum, tum pudendo ipsi, tum

lumbis impositum. Victus & pharmaca esse debent attenuatoria, citra manifestam calfactionem. Præterea nymphaea in potu est danda, & uiticis semē: nec non ruta uiridis obsonijs misceatur, post aliorum tenuantium usum. Quod si euacuatione uti libeat, administretur per uomitum. Ad eos qui se in somno permingunt, uesicam caprillam, aut ouillam ustam, ex posca bibendam dato: & ad uesperam siticulosos inire somnum iubeto. Facit & testiculus leporis in uino odorato seruifactus, atq; ita potus. Aut calamintham & myrrham in uino ante coenam bibendam dato. Oblinant autem pudendum cimolia tera cum perdicij succo.

Ad uteri affectus.

In uteri suffocatione contingit sensus ac motus priuatio, & pulsus obscurus, & paruus, & penitus interceptus. In aliquibus uerò tum sensus, tum motus adest, ratioq; cōstat, cæterum uix respirant. Aliquibus etiam uox interceptitur. Alijs contrahuntur artus.

Fiunt igit uidiuis sensus, & motus, & respirationis interceptiones, ob frigiditatem: perspirantibus ipsis tunc per arterias totius corporis, neq; utētib; illa, quæ per os fit respiratione. Etenim quum prius probè repurgarentur, conciperent, atq; coirent uiris, uerisimile est, postea quum omnibus his priuantur, humidum & frigidum in ipsis semen totum corpus perfrigerare. Ad uulua itaq; strangulatus conuenit agarici drach. j. in potu accepta cum uino: & plantaginis semē & succus cum uino: necnon acetum scillinum absorptum. Olfactu excitant strangulatas, bitumen, castorium, chalbanum, pix liquida, cedria, pili usti, ruta, allium, cepa. Eandem in rem & cornu cerui suffitur: & ruta cum melle lana excepta in anum inditur.

Mingentibus inter dormiendum remedia.

Vteri suffocationes quæ sequantur symptomata.

Vteri suffocatione affligente, per arterias tantū fieri perspirationes.

Vteri suffocationis causa.

Vteri suffocationis remedia.

G A L E N I P E R G A M E N I , D E C O M P O S I T I O . N E M E D I C A M E N T O R U M S E .

cundum locos , Liber. X.

Nephriticorū
medicaminum
differentiæ.



X Nephriticis Antidotis, hoc est renali-
bus, quædam enim calculosos renes iu-
uant: quædam uerò inflāmatos & ulcera-
tos, quæ etiā ad uesicam affectam conue-
niunt. Maximè autē contrarij inter se sunt,

Renum inflam-
mationib⁹ qua-
lia medicamē-
ta conueniant.

Calculosis con-
grua medica-
menta, omnia
fere esse ama-
ra.

Vesicæ ulceri,
& urinæ diffi-
cultati reme-
dium.

predictorū pharmacorū facultates. Siqdem quæ ad in-
flāmatas et exulceratas affectiones cōponunt, mitiga-
torijs medicamētis indigēt. Ceterū quū impossibile
sit hæc cito penetrare ad regionē renum, ob id ipsis mi-
scemus diuretica. At quæ calculosis opitulātur, unicam
facultatem postulant, quæ secare & extergere est nata,
cū conspicua caliditate. Sunt autem talia ferè oia ama-
ra.

Confectiones Andromachi ad renum
& uesicæ affectiones. Potio ad uesicā exulceratam
& urinæ emittendæ difficultatem. Seminis lini, sem.
papaueris albi, sem. cucumeris, tragacantæ, sing. drac.
ij. amyli drach. iij. Cum aqua in pastillos redigito: ex-
hibetoq;. Alia ad eadem, & uesicæ dolores. Cro-
ci, seminis rutæ syluestris, seminis maluæ syluestris,
sing. drach. vj. sem. hyoscyami, drach. xij. opij drac. vj.
sem. apij, drach. xij. nuces auellanas. xij. amygdalas. xx.
sem. cucumeris drach. xij. mellis Attici, quod sit satis.
Datur magnitudo ponticæ nucis cum uini mulsi cya-
this. iij.

Sanguinē e ue-
sica fluentē re-
medium sup-
primens.

Calculos fran-
gens medica-
mentum.

Alia ad profluvia sanguinis ex uesica.
Aluminis drach. j. tragacanthæ drach. ij. gummi obo-
lum. j. Dato ex passo quandoq; obolum. j. quandoq;
duos.

Alia calculos frangens, ita ut non renascan-
tur. Cassiæ, piperis albi, sem. pastinacæ, anisi, sem.
papaueris albi, spicæ nardi, sem. smyrnij, cyperij, sing.
drach. ij. seminis apij, thuris, styracis, iridis Illyricæ,
amygd. amar. asari, sing. drach. iij. myrrhæ minnæ,

drach. iij. Mellis Attici quod sit satis. Conficito & quotidie exhibeto nucis pōticæ magnitudinē ex aquæ cyathis tribus: idq; ieiuno, stomacho.

NEPHRITICAE cōpositiones ab Asclepiade con-
scriptæ. Seminis satiui cucumeris tosti, drach. iij. se-
minis maluæ, drach. v. nucum pinearum drach. vj. se-
min. apij drach. vij. seminis lini drach. j amyg. amara-
rum mund. drach. ix Excipe passo, & exhibe nucis pon-
ticæ magnitudinem cum protropi cyatho. i. & aque ca-
lidæ cyathis duobus. Alia. Maluæ sylvestris & ru-
tæ sylvestris, & apij montani radices in uino coquito,
& expressi liquoris cyathos. ij. cum pari aquæ portio-
ne exhibeto. Alia. Seminis balsami, lapidis qui
spongijs inest, pulegij aridi, seminis maluæ sylvestris,
ocymi aridi, sing pares portiones tundito, incernitoq;
& reponito. Propinato autem cochleare unum cum ui-
ni di uti cyathis duobus. Pastillus ciens urinas,
atq; expellens lapillos. Asari, petroselini, phu-
Mei, singul. drach. iij. acori, sem anisi, sem. dauci, apij
montani, carpobalsami, tragacanthæ, sing. drach. ij. Tra-
gacantham passo dissolutam aridis adijcito, & pastil-
los formato: indeq; obolos. iij. cum passi diluti cya-
this. ij. exhibeto.

Nephriticæ cō-
positiones ex
Asclepiade.

De ischiade, podagra, & arthritide.

EX genere arthritidis est tum ischias, tum podagra.
Quod enim in omnibus articulis est arthritidis, hoc
in uno iuxta coxedicem quidem, ischiada, iuxta pedem
uerò, appellant podagram. Incipit igitur plerunq; po-
dagræ generatio ex uno articulo, temporeq; in omnes
progreditur. Communem habēt hi tres affectus re-
dundantiam humoris. Cæterum aliquādo irruens hu-
mor sanguineus est: ut plurimū autem pituitosus: aut
ex pituitoso & bilioso mistus: quibus etiam interdum
miscetur sanguis. Porrò ubi pituitosus humor, qui
propriè appellatur crudus, in articulis delituerit diu-
tius. crassior atq; uiscosior efficit, tofisq; aut callis di-

Arthritidis.
Ischias.
Podagra.

Articulatum
morbore com-
munes causæ.
Toforum gene-
ratio fit a pitui-
toso humore im-
pacto in articu-
lis: ob idq; sunt
incurabiles.

ctis præbet generationem. Qui quidem postq̃ pro-
ducti fuerint, non est q̃ speres illos posse exactè dis-
solui. Differentia affligentium humorum: faciliè ex co-
lore dignoscitur. Præterea biliosus sanguis multæ ca-
liditatis sensum exhibet ægrotanti, à calorificis q̃; reme-
dijs exacerbatur: quæadmodum remittitur rursus à fri-
gidis. Curatio autem ipsa exordièda est ab euacuatione
affligentis humoris: si quidem ex æquo humoribus re-
dundarit corpus, uenæ sectione primo omnium admi-
nistrata: dein purgatione, quibus accedat pharmaco-
rum dicendorum conueniēs atq̃ opportunus usus: ita
ut in manibus pedibus q̃; pharmacis repellētibus flu-
xionem utamur: iuxta coxendicē uerò, ea minimè ad-
ministremus. Quum enim iūctura ea in profundo sit
sita, sanguis ex uicinis & ambientibus uasis à muscu-
lis ad illā truditur. Mitigatorijs igitur in principio me-
dicamentis utendum est ad dolores coxendicū, & que
nec refrigerent multum, nec fortiter calfaciant. Exacer-
bantur enim per ipsa fluxiones, caliditate nimirū plus
attrahente ipsas, q̃ impediente. Rarò itaq̃ fit coxendi-
cum dolor ex sanguinis multitudine, citissime q̃; cura-
tur, uenis circa poplitē aut malleolos pertusis. Quem-
admodum autem sola sæpe sanguinis euacuatio suffi-
ciens auxilium existit, sic cōtra in omni dolore coxen-
dicū, & præsertim eo, qui ex humorum copia est exor-
tus, si quis ante euacuationem totius corporis acribus
pharmacis circa affectam partem utatur, affectū ægrè
curabilem reddet, copia uidelicet indissolubiliter ibi-
dem condensata. Ob id q̃; ab euacuatione incipiendum
est, nō solum à cruribus, sed à cubito etiam sanguinis
detractione facta. Auxiliantur etiam uomitus ipsis is-
chiadicis, magis utiq̃ q̃ euacuationes per uentrem: ut
qui reuellant humorem repentem deorsum. Mouen-
di itaq̃ sunt uomitus in principio ab accepto cibo: po-
stea uerò, etiam per uomitoria medicamenta, initio à
mediocribus facta. In quibus autem uehemens hu-

Articulares do-
lores a quibus
gignantur hu-
moribus, quæ
notæ indicen-
tur.

Articularis
morbi curatio.

Repellentibus
quidem uten-
dum esse, si hu-
mores fluāt ad
articulos redū
aut manuū: mi-
nime autem, si
in coxendicem
irruant.

Ischiadi? qua-
lia remedia in
principio con-
ueniant.

Ischias raro ori-
tur a sanguine:
facillime q̃; cu-
ratur tunc po-
plitis uenis aut
malleolorum
incisis.

Ischiade urgē-
te acribus me-
dicamentis non
est utendū, ante
totius corporis
euacuationem.
Ischiadicis con-
fert uena secta
in cubito, uo-
mitusq̃.

morum densatio, quæ ægrè dissolui possit, à medicis
intempestiuè utentibus acribus pharmacis facta est,
ijs maximè cucurbita affixa auxiliatur, & purgatio per
clysmos efficaciores, qualis est qui ex colocynthide
constat.

COMPOSITIONES ab Andromacho
scriptæ ad ischiadicos. Emplastrum è profundo ex-
trahens humores affligentes coxendicem. Seminis
rutæ syluestris, silphij, spumæ nitri, baccarum lauri,
abrotoni, colocynthidis medullæ, cardamomi, animij,
singul. drach. iij. rutæ uiridis, minæ octauam partem.
Quidam horum singulorum drach. xx. accipiunt: nec-
non picis, adipis taurini, terebinthinæ, myrtæ, ceræ,
sing. tantundem. chalbanij, ammoniaci thymiamatis,
utriusq; drach. vj. opopanacis, sulfuris uiui, sing. drac.
iij. Conficito, & admoueto.

Aliud ad coxen-
dicum, capitisq; dolores, atq; ad alios omnes anti-
quos. Ceræ drach. xxiiij. ammoniaci thymiamatis
drach. vij. terebinthinæ tantundem. succi thapsiæ,
drach. viij. olei cyathum unum. Aliud. Ceræ drach.
C. uisci quercini, drach. xvj. myrrhæ drach. vj. tere-
binthinæ drach. xxv. chalbanij drach. vi. iridis Illyri-
cæ tantundem, ceræ heminam. S. Cyprini tantundem.

ASCLEPIADIS Malagmata ad ischiadicos.

Myrrhæ stactæ, bdellij onychis, medullæ ceruinæ,
ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ, sing. lib. ij.
opopanacis, chalbanij, styracis, mastiches, floris lapi-
dis Asiæ, succi sycomororum, canchryos, piperis albi,
sing. lib. j. ceræ, terebinthinæ, utriusq; lib. v. Tunden-
dum est pharmacum ita, ut qui tundit, facē unguenti
irini adhibeat, quo mollius reddatur. Aliud mirè
iuuans ischiadicos, discutiensq; omnem duritiē. Ce-
ræ, uisci quercini, terebinthinæ, iridis siccæ, myrrhæ,
chalbanij, sing. drach. xlviij. Olei cyprini, aut unguenti
Aegyptiaci, quod sit satis. Conficito. Aliud. Picis
liquidæ brutæ, lib. iij. fæcis aridæ ustæ, lib. ij. nitri ru-
bri, lib. j. S. resinæ pini, ceræ, staphidis syluestris, sulfuris

Ischiadis indu-
ratæ curatio.

Ischiadicis ca-
taplasinata de-
scripta ab An-
dromacho.

Ischiadicis ma-
lagmata ab As-
clepiade scri-
pta.

ris uiui, sing. lib. j. pyrethri, lib. S. cardamomi sext. j. Picem, ceram, atq; resinam, soluito: arida tundito, cribratoq; & liquefactis committito. Porro DAMOCRATES, Archigenesq; plurimum ad ischiadicos commendant malagma ex iberide herba (quam nasturtium syluestre uocant) cum adipe porcino tusa confectum: quod sanè imponi iubent ad horas tres, indeq; ad balneum accedere.

De podagricis & arthriticis affectionibus.

SCopus in hisce affectibus est, si quidem adhuc fluant humores, ipsos per astringentia repellere: si uerò amplius non influant, discutere qui sunt iam impacti.

Arthriticis cō-
gruentia epithe-
mata ab Ascle-
piade scripta.

EPITHEMA ASCLEPIADIS, ad arthriticos, mirè dolorem sedans. Succu papaueris, drach. iij. croci drac. j. cum lacte bubulo, caprillo uel & panis medulla contundito, læuigatoq; ac deniq; ex rosaceo emolliens, conficito cataplasma. Aliud. Styracis drach. ij. opij drach. j. Confice, utereq;.

Aliud tofos & duritias discutiens. Farinæ fœnigræci, floris lapidis Asij, lomenti fabæ nigræ, farinæ lupinorum, sing. sextar. j. Omnia mixta & aqua subacta calida, imposito. Pastillus podagricus. Aloes lib. j. succi centauri sexuncem. Thuris masculi trientē. myrræ tantundem. floris lapidis Asij, opij, succi mandragoræ, aluminis scissi, sing. sextantem: passo excepta in pastillos redigito. Vsu expetēte, lacte dissolutos cum penna illine, & supra illitionem linteolum passo imbutum impone. Aliud, quod auxiliatur confestim. Visci, terebinthinæ utriusq; lib. j. adipis taurini, floris lapidis Asij, calcis uiuæ, mannæ, sing. quadrātem. cyprini lib. j. Conficito, utitorq;.

* FINIS. *

Ex industria omisimus libellum de facilibus paratu remedijs, q̄ omnia quæ in illo habentur, reperiuntur in hisce commentariis longè cumulatora.

ILLVSTRI ADMODVM, ATQVE

Ornatissimo Viro, D. D. Ario Gonz=

zalo, Comiti Pugni in Roſtro: An=

dreas Lacuna, Secobiensis,

Doctor Medicus, Mi=

les. S. Petri.

Salutem.



ALENI COMMENTA=

rios de Theriaca & de antido=

tis hoc nomine dicare tuæ Digna=

tioni statui, Vir citra controuer=

siam Splendidissime, ut genero=

sum istum animum tuum, ex tam

longa lite & controuersia defa=

tigatum, uaria eorum lectione, dulcissimaq; oblecta=

rem: contra iudiciariasq; molestias, atq; ingentes dif=

ficultates (quæ optimorum ingeniorum ueluti delete=

ria & exitialia uenena existunt) salutari alexiphar=

maco communirem, atq; corroborarem. Quanquam

hercle adeo inuicta, insuperabilisq; tua ista est animi

magnitudo, ut nullis tormentis succussa possit unquam

euerti, aut quoquomodo labefactari. Nam tametsi ua=

rij fortunæ fluctus, acerbissimaq; procellæ, & quæ

uel fortissimum queng; prosternere minimo negotio po=

tuiſſent, iam ante multos annos in te maximum im=

petum fecerint, adeo tamen fortiter sustinuisti omnes

eius insultus: tam heroicè restitisti afflictionibus undiq;

tua moenia circūuallantibus, ut ob nullam tempesta=

tem ingruentem, uultum unquam, aut colorem, muta-
 ueris. Quam sanè tam insignem constantiam, animiq;
 raram serenitatem, non aliunde q̃ à philosophia com-
 parasti: cuius nimirum amator longè indulgentissi-
 mus es. Siquidem præter alias uirtutes quibus te exor-
 nauit Deus Optim. Max. etiam in seuit tibi ardentis-
 simum quendam omnium disciplinarum amorem, quo
 accensus, adeò illis perpetuò indulges, ut ab ipsis re-
 uocari non possis. Id quod ipse exploratum habens,
 non posse me Dignaioni tuæ rem ullam gratiorem
 facere existimaui, q̃ si ad eam mitterem hosce com-
 mentariolos Galeni, ut mole exiguos, sic plenos eru-
 ditione, uarijsq; naturæ misterijs auctos. Tuum
 igitur fuerit, Vir Clarissime, hoc nostrum
 quantulumcunq; munusculum, illius fer-
 uentissimi amoris, quo Optimus
 pater meus prosequabatur
 olim totam familiam
 uestram, offi-
 cijq; mei
 in
 Tuam Amplitudinem, futurum
 ueluti monumentum quod-
 dam perenne, æqui bō
 niq; consulere.
 Vale.

Venetijs. Calen. April. M. D. XLVIII.

Galenī

GALENI PERGA

MENI, DE THERIACA

ad Pisonem, Liber vnus.



EDICAMENTVM Ex
uiperis meritò est apud homi-
nes inter alia omnia celebratis-
simum, Optime Piso, & q̄ uim
habeat efficacissimam, & q̄ ne-
minem promissis frustratur. Si
quidem nullū à feris commor-
sum, hac statim epota antidoto,

Theiaces cō-
mendatio.

perijsse, memorie proditum est. Nullus etiam, eadem
præsumpta, uel si paulo post impeteretur morsu, in-
terijt: id quod indies experiuntur prætores, in homi-
nibus capitali supplicio damnatis. Cæterum, si epo-
ta theriaca non purgetur qui hausit medicamentum
purgans, id tibi erit indicium, antidoton præstantis-
simam esse, quæ sæpissimè solet adulterari. Porro Di-
uus Marcus Aurelius, qui legitimè aliquando gesit
habenas imperij, affatim & ueluti alimento quodam
hoc utebatur medicamento: primusq̄; fuit, qui ipsius
existimationem, fidemq̄; auxit. Verum illius quidem
principis tempore, ad familiarium tantum notitiam,
theriaces perueniebat opus: sub hisce autem monar-
chis maximis, usus eius prodijt in publicum. Siqui-
dem nobis omnibus licet eorum bonis probè uti, li-
beraliterq̄; alijs mederi, alio ab alio medicamentum
capiente: quum non solum hoc nomine cæteris om-
nibus antecellat, q̄ imperium à Dijs sint adepti, sed
q̄ etiam uniuerſa bona cunctis libenter impartiant,
ac non secus q̄ Dijs ipsi, tantum ex æquo gaudiij con-
cipiant, * quantum illi qui ab ipsis seruantur: quum
nimirum censeant maximam regni esse partē, com-

Theiaca per-
fecta purgan-
tium pharma-
corum opera-
tionem suppri-
mit.

Marcus, Aure-
lius Imp. auxit
fidem Theria-
ces.

Seuerū & Lu-
cium eiusdem
imperij mode-
ratores, colle-
gasq̄, magnifi-
ce commendat
Galenus.

Regni maximā
esse partē, com-
munem omniū
salutem.

Tomus. IIII.

FFff

munem omnium salutem. Quo sanè regio candore præditi, adèd exquisitè & diligenter theriacem præparant, ut ipsi quidem nihil prorsus omittant: antidotus autem, admiranda opera exhibeat. Igitur morbi cuiusq; natura comperta, differentiaq; simplicium pharmacorum penes temperamentum, cognita, singulis morbis quod congruum sit, medicamen compositum præparabimus. At simplicium medicaminum vires sensu & experientia cognoscimus, quibus postea rationem iungentes, eamq; ceu ducè sequentes, hallucinari non possumus. Etenim quum cernamus liquidò, scammoniam bilem flauam educere: epithymum, atram bilem: ac deniq; coccū gnidium, pituitam: nec credamus medicamenta ipsa purgantia, in suam naturam humores trāsmutare & conuvertere (id quod Asclepiades somniauit) sanè persuasum habemus, quemedmodum magnes trahit ferrum, sic medicamēta singula, sua insita facultate, conuenientem sibi succum attrahere: nimirum id ratione comprehendentes, quod proprietatem facultatis naturæ cuiusq; pharmaci uerè *testari atq; exprimere potest. Medicamentorū itaq; alia per totas substantias agūt: alia in substantia sua miscellaneā facultatem sortiuntur: adèd ut sæpe in corpore effectus maximè contrarios producant. Siquidem lapathi folia comesta subducunt aluum, quam sumptum eius semen astringit. Similiter & succus brasicæ, & uetulorum gallorum ius, & cochlearum marinarum cremores, uentrē commouent: olus autem ipsum, atq; illarum carnes comestæ, eundem comprimunt. Aloe, squamaq; æris, excrecentes ulcerum carnes astringunt: assumpta uerò per os, uniuersum corpus expurgant. Lac ubi à nobis diuiditur, contrarias facultates ostendit. Nam serum ipsius bibitum, uētre m resoluit. Caseus ingestus, ipsum cohibet exactè. Trifolium herba, decocta, im-

Simplicium vires cognosci sensu, experientiaq; quibus adiuncta sit ratio. Scammoniū trahit flauam bilem.

Epithym⁹ atram bilem expurgat.

Coccus gnidius soluit pituitam.

Medicamenta singula propriū sibi succum attrahere.

Medicamenta plura, secundū diuersas sui ipsorum partes, uarios effectus producere.

Lactis substantiæ diuersæ.

Trifolii affli.

posita; ferarum moribus auxiliatur: quæ si sanæ pti affricetur, non secus q̃ ferarum morsus eam affligit.

Cicuta sturnos quidem, alit: nos autem è medio olit. Veratrum coturnicibus cibus, homines malè perimit. Nonnulla præterea partes quasdā certas corporis uitiant. Nam lepus marinus, pulmonem exulcerat. Cantharis uescam peculiariter afficit.

Econtrario, affecto iecinori sæpe fuit herba eupatoria ex usu. Myrobalanus lienem adiuuat. Sarxiphagon, & Betonica, renes optimè afficiunt. Quum igitur ueteres illi Medici reputarent secum, inuitabiles esse noxiarum ferarum morsus: necnon deleteriorum pharmacorum symptomata esse omnino letalia: quumq; etiam perpenderent, hominum naturas differre inter se plurimum, aliudq; aliq̃ medicamentum idoneum esse, meritò ipsius theriacis accuratā, exquisitam, & uariam, sunt moliti preparationem, ut hoc nomine ipsa in omnibus suū finem assequeretur, & ob usus necessitatem magno studio eam mortales omnes expeterent. Nihil siquidem inter uitæ incommoda difficilius mihi uidetur deleterijs medicamentis, ac feris noxijs. Primum autem qui antidoto contra ferarum morsus immiscuit feras, fuisse perhibetur Andromachus, Vir me hercules memorabilis, nec multo ante nos natus: q̃ppe qui Neroni (cuius affecula fuit) ipsius uires atq; compositionem dicarit. Summa autem descriptionis habet in hunc modum.

Andromachi senioris, Neronis Archiatri, Theriace ex uiperis, cui nomen est Galene, maximè salutaris ad serpentium atq; omnium ferarum ictus, pharmaca deleteria, affectiones uentriculi, anhelationes, dolores colicos, morbum arcuatū, hydropa, phthisin, omnimodam conuulsionem, pleuritidem, uescæ ulcera, suppressiones urinæ, cruciatus renum, pestiferos morbos, ac deniq; canis rabidi morsus, si pondere fabæ Aegyptiæ

git sanas particulas:

Cicuta sturnos alit: nos pimit.

Veratrum alit coturnices: homines enecat.

Lep^{us} marinus pulmonē exulcerat.

Cantharis uescam afficit.

Difficilius iuita nihil reperi-
ti posse deleterijs medicamentis, ferisq; uis-
tus eiaculantibus.

Andromachi commendatio,

Theriace quibus conueniat affectibus.

**Artis scorū the-
riacorum præ-
paratio.**

**Pastillorū scil-
linorum præpa-
ratio.**

**Theriaces anti-
doti secundum
Andromachū
compositio.**

sumatur, cū ternis aquæ calidæ cyathis. Igitur captas uere ineunte uiperas, ceruices illis atq; caudas præci-
dito, quantum arcta pygmæi manus extenditur: nam utraq; parte uenenum gerūt. Postea uerò excoriatis, euisceratisq; ab ipsisq; omni adipe amoto, in fictile uas conijcito, affundēs aquæ quod satis esse uideatur, addensq; germen anethi, ac pauxillum salis recentis, & finito coqui, donec facilè à carne ipsæ spinæ amo-
ueantur. Tunc itaq; carnes ipsas exemptas, cum suffi-
cienti ad pastillos fingēdos medulla panis purissimi, contundito & læuigato, affusoq; iusculi quod satis esse uideatur, manibus opobalsamo intinctis, conficito or-
biculos, eosq; in umbra reponito ad totius antidoti compositionem. Dein fermento illine scillam recen-
tem, non admodum magnam, eamq; in furno uel in patina coque, ut torreātur omnes eius partes ex equo. Id ubi factum fuerit, partes eius internæ & tenerrimæ cum pari portione optinæ farinæ eruinæ contundan-
tur & læuigentur, atq; in orbiculos digerātur. Verūm Andromachus duplicem portionem eruinæ farinæ adiūciendam censeret: quum tamen æqualis modus fin-
gendis pastillis sit optimus. Hæc ubi facta fuerint, ac-
cipies pastillorū Theriacorum drac. xxiiij. pastillorum scillinorū, drach. xlviij. piperis longi, succi papaueris, magmatis, hedyochroi, sing. drach. xxiiij. rosarū siccarū, iris Illyricæ, glycyrrhizæ, seminis napi syluestris, quem buniada appellant, scordij, opobalsami, cinna-
momi, agarici, sing. drach. xij. myrrhæ, costi, croci, ca-
sie, nardi, schoeni, idest iunci odorati, floris, thuris, pipe-
ris albi, & nigri, dictamni, prasiij, rheu, stœcados, pe-
troselini Macedonici, calaminthæ, terebinthinæ, zin-
giberis, quinq; folij radice, sing. drach. vj. polij, cha-
mæpityos, styracis, amomi uuæ, meu, nardi Gallicæ
Lēniæ sphragidis, phu pontici, chamædryos Creticæ
foliorum malabathri, chalcitidis tostæ, Gētiang, anisi,

THERIA. AD PISO. LIB. 453

hypocisthidis succi, carpobalsami, gummi, marathri
femini, cardamomi, fefelis, acaciæ, thlaspi, hyperici,
sagapeni, ameos, sing. drach. iij. Castorij, aristolochiæ
tenuis, dauci femini, bituminis Iudaici, opopanacis,
centaurij tenuis, chalbanij, sing. drach. ij. mellis lib. x.

Vini falerni quod sit satis. Conueniebat tamen prius
hedychroum unguetum describere, cuius apud Ma-
gnum talis est præparatio. Aspalathi radiculae cor-

ticis, calami aromatici, schoeni floris, phu, costi, asari,
xylobalsami, sing. drach. vj. cinnamomi drach. xxiiij.
amomi tantundem. amaraci drach. xx. nardi Indicæ

drach. xvj. foliorum malabathri, drach. vj. myrrhæ
drach. xxiiij. mastiches drach. vj. Croci drach. xix. Ex-

ciuntur uino falerno, manibusq; opobalsamo intin-

ctis, in pastillos coguntur, & assiccantur. Elegit por-

ro Andromachus ex alijs feris solas uiperas ad huius

præparationem antidoti, q̄ hæ minus alijs tabificam

uim obtineant. Nam basiliscus, belua sufflaura, & tripli-

ci frontis apice munita, uel si cernatur tantum, aut si

bilus eius audiatur, actutū hominem perimit. Quod

si ex cæteris animalibus aliquod attigerit animal à ba-

silisco extrinctum, subito etiam exanimatur. Dryinus

serpens, tam esse perniciosus proditur, ut si qui ipsum

per imprudentiam calcarint, eis pedum plantæ exco-

rientur, totaq; crura intumescant, periclitenturq; etiam

illorum manus, qui ipsis auxilium tulerint. Hæmor-

rhus, & hæmorrhoids, adeo inimici sunt homini, ut qui

ab ipsis percussus fuerit, sanguine per os & nares, ac

per uniuersum corpus effuso, uita fungatur. Cōmorfi à

dipsade, conficiuntur caufonide. Nam & inexpugna-

bili siti, & æstu uehementi cruciati, interdum & disru-

pti, diem obeunt. Acontias serpens, ubi se multū ex-

tenderit, ceu iaculum quoddam insiliens corporibus,

ita perimit. Inter aspides nominata Ptyas, ceruicem

exporrigens, longitudinemq; interualli metita, uene-

Hedychroum
guenti præpa-
ratio.

Viperas alijs
feris minus ob-
tinere tabificæ
facultatis: ob-
idq; ad antido-
tum ab Andro-
macho electas
Basiliscus con-
spectus, audis-
tus ue hominē
perimit.
Dryinus ser-
pens.

Hæmorhus.
Hæmorrhoids.

Dipsas sitim in-
fert iexpugna-
bilem.

Acontias ser-
pens ut pimat.

Ptyas uenenū
corporibus in-
spuit.

FFff iiij

Aspidum tres
species.

Cleopatra post
uictum Anto-
nium, ne uiua
duceretur Ro-
mam a Cæsa-
re, aspide sibi
mortem cōsci-
uit.

Polyxenā de-
disse operā, ut
eū decoro iam
moribunda ca-
deret.

Viperā ore ex-
cipere genitu-
ram a mare,
ei⁹ q̄ caput ab-
scidere post se-
men exceptū.
Vipereā pro-
lem iniuriæ pa-
ternæ uindicē,
matris uētre
perfcindere, at-
q̄ sic nasci.

num corporibus inspuit. Etenim harum ferarum una
(tres quippe aspidū sunt species, hæc uidelicet, & cher-
sea, necnon chelidonia) perhibēt reginā Cleopatram,
quum uellet latere custodes, citra suspicionē sibi mor-
tem subitō consciuisse. Nam quum Augustus deuictō
Antonio eam capere incolumen uellet, ac uiuere, stu-
diosius q̄; (sicut par erat) seruare, ut Romanis tam insi-
gnem mulierem in triumpho ostenderet, hæc, re in-
tellecta, optauit regina adhuc ex humanis potius de-
cedere, q̄ priuata Romanis cōspici. Quo cōsilio duas
mulieres fidissimas, Naeram nēpe et Carmionē, quas
ad pulchritudinem corporis mundo subministrādo ha-
bebat, ad se uocauit: eis q̄; iussit ut ferā uuis ficibus q̄;
tectam importarēt quo (ut dixi) custodes falleret, prius
factura periculum in ipsis mulieribus, an subitō perī-
mere posset. Quæ quidem quum actutum periissent,
ferunt ipsam postea sibi exitium pariter conciliasse:
fuisse q̄; tandē inuentam, manu dextra capiti admota,
& diadema, sicut est consentaneum, tenente, ut uel eo
usq̄ spectatoribus uideretur esse regina: quemadmo-
dum Polyxenā scribit Tragicus, quæ & ipsa moriēs,
accuratē tamē dedit operam, ut cum decoro caderet.
Qua ex re Augustum uehementer fuisse attonitū me-
morāt: partim ob ancillarum erga reginam amorem,
ut cum ea mori non dubitarint: partim, q̄ illa genero-
sam potius mortē maluerit oppetere, q̄ uiuere in ser-
uitute. Recitauī hanc historiam, ut ex ipsa intellige-
remus, q̄ subitam id genus feræ nobis perniciē concī-
lient. Cæterū uipera inter reliquas omnes feras ca-
put habet ad inferendum exitium, promptius. Aiunt
autem ipsam os aperire ad excipiendam genituram
à mare: qua excepta, illius caput abscindere: atq̄ hunc
ipsis esse prauī complexus modum: deinde prolem ex
semine genitam, matris uētre erodere, foras q̄; erum-
pere, ac sic iniuriæ paternæ uindices, propriā matrem

THERIA. AD PISO. LIB. 455

perimere. Mirum autem esse nō debet, si capiribus & caudis præcisis, reliquæ uiperarum partes, efficacius medicamentum reddant: præcipuè carnes ipsarū, quibus ad seruandum facultas quædam est insita: quum reliquorum animalium etiam pleræq; partes, multis morbis opitulentur. Nonnullis quippe murium capita usta, ex melleq; illita, alopeciam sanare possunt. Milui quoq; caput absq; plumis combustum, si quis ex eo quantū tribus digitis comprehendi potest, bibat, aut podagræ opitulari. Cameli cerebrum arefactum, potumq; ex aceto, comitialibus morbis medetur: & mustelæ similiter. Hirundinis cerebrum ex melle, ad suffusiones oculorum conducit: ut ouillum, ad dentitiones infantium. Taurini cornu rasura cum aqua pota, sanguinis eruptionem cohibet: femoraq; combusta, etiam sanguinem supprimunt, ut sæpenumero aluum solutam. Ceruini cornu ramentum adustū, & cum uino tritum, circunlitumq; uacillantes dentes cōfirmat: id quod bouis talus etiā facere perhibetur: qui etiam ex lacte potus, educit rotundos lumbricos, ex oximelite lienem consumit, & leucas tollit illitus, mediocriterq; ueneris existit. Testiculi castoris poti, conuulsionibus auxiliantur. Stercus bubulum, aridū, combustumq;, trium cochlearium mensura iuuat hydropicos. Muscerda ex aceto trita, alopecias persanat: in potu autem sumpta, lapides uesicæ comminuit. Adeps anserinus inflammationibus cum rosaceo medetur. Cerui medulla mitissimum medicamen existit. Vacchini lactis potus dysentericos adiuuat. Fel hyænæ, uisum exacuit. Hippopotami cutis usta, & læuigata ex aqua, illitaq;, digerit phymata: quemadmodum pellucula uiperæ reducta in pollinem, alopecijsq; imposita, mirè pilos regenerat. Exuium aspidis ex melle tritum, illitumq;, acutissimum uisum conciliat. Cancer fluuiatilis tritus, illitusq;, spicula & surculos extrahit.

Murii capita.
Milui caput.

Cameli cerebrum.
Hirundinis cerebrum.

Cornu taurinū

Cornu ceruinum.

Castorium.
Stercus bubulum.

Muscerda.

Lac uaccinum
dysentericos
sanat.
Viperæ pellucula
mirè pilos
regenerat.

Cancer fluuiatilis.

FFff iiij

Cantharis.**Terræ intesti-
num.****Alauda.****Stellio uisus ab
scorpionibus,
eos perimit.****Amphisbena.
Viperæ solæ
morsibus ab ip-
sismet factis
epitulantur.****Helenii succo
infectas sagit-
tas esse letales.****Muris aranei
pulvis sanat ab
ipso emorsos.**

Cantharis similiter læuigata, cum bryoniæ radice po-
ta, educit uermes. Scorpius assus, atq; ex pane come-
stus, uesicæ lapides conterit. Terræ intestinum ex ui-
no assumptum, idem molitur. Tritum & ex melicrato
bibitum, arcuatum morbum explodit. Ex rosaceo ce-
rato impositum, podagricis inflammationibus conue-
nit. Accipiter in susino unguento decoctus, hebetudini
oculorum medetur. Scarabæus in oleo frictus, auriq;
instillatus, doloribus ipsius auxiliatur. Alauda uita si
edatur, mirificè colicos iuuat. Multa etiam, uel conspe-
cta duntaxat, uim suam ostendunt. Stellio quippe ui-
sus ab scorpionibus, susstringit ipsos & perimit. Am-
phisbenam si quæ mulier grauida supergrediatur, facit
aborsum. Itaq; non est mirabile, si uiperarum cor-
pora, amputatis partibus illis, auxiliandi etiam robur
obtineant: imò nec si morsibus ab ipsismet factis, solæ
uiperæ succurrere possint, uel si nobis inimicissimæ
sint. Traditur siquidem nonnulla animalia, si sangui-
nem quidem humanum ex uulnere manantem con-
tingant, commorsos occidere: si uerò uorètur, nec san-
guinè degustarint, uulneratos seruare incolumes pos-
se: quæadmodum & de Helenio etiam proditum est:
quo nimirum Dacas, Dalmatasq; aiunt cuspides telo-
rum imbuere: quod uidelicet postquam sanguinem uulne-
ratorum attigerit, ipsa occidere possit: quum ab ipsis ta-
men citra ullam noxam edatur, ceruiq; à sagittarijs per
contactum eius enecti, tutò etiam comedi possint.
Iam uerò à crocodilo oblectis, ipsius adipem uulneri im-
positum, fummo esse præsidio nouimus: murisq; ara-
nei morsus equè letales, ab ipso redacto in puluerem,
superpositoq; citra dolorem iuari. Similiter qui à ui-
pera sunt percussi, effugiunt periculum, si trita ipsarum
corpora uulneribus imponantur. Etenim si quid uene-
ni in uiperea carne est relicu, id multiplex ea præpa-
ratio delet: plurimum autem illi facultatis auxiliatricis

THERIACE AD PISONEM. 457

largitur. Cantharis nāq; sola exhibita, uesicam exulce-
rat, & inimicum est ipsi medicamentum, sæpenume-
roq; sua facultate uehementi, hominem iugulat: mista
uerò quibusdam alijs, salutaris uesicæ reddit, urināq;
uehementer prouocat. Succus etiam papaueris, q̄ po-
tus per se, admodum perniciosus existat, latēre nemi-
nem arbitror: sin autem cum nonnullis alijs sit præpa-
ratus, ægros ita subinde iuuat, ut maximē saluiferum
esse ipsis medicamentum uideatur. Itaq; phrenitico-
rum deliria sæpe generosē curauit: destitutosq; robore,
ob diuturnas uigilias, concilians illis somnum, manife-
stē restituit. Quin etiam ab araneis cōmorsos, ipsi ara-
nei triti, & cum uino poti, malo liberant. Si igitur solū
uinum feris mistum, à periculo reddit securos, nimirū
theriaca maximē salutare medicamē existet, utpote ex
tot talibusq; confecta pharmacis, quorum, qualitates
totæ per totas miscentur, & alterantur, conspirantesq;
in unam eādēq; naturalem temperiem, communem
quandam facultatem atq; naturā adquirunt, ab ea di-
uersam, quæ antea singulis inerat. Eligenda tamē sunt,
explorandaq; singula medicamenta, prius q̄ antido-
to indantur: solent quippe à fraudulentis hominibus
q̄ creberrimē adulterari. Vnius autem cuiuspiam, ui-
tium, subinde uniuersa contaminat. Porrò quum ua-
rii uariē hanc antidotum preparent, nos compositione
Andromachi, ceu omnium præstantissima uimur: in
regiosq; usus eam preparamus. Venari autem oportet
uiperas initio ueris, quū latebris relictis, foras in apri-
cum prodeunt, & non adhuc uirus tam exitiale reti-
nent. Intus nāq; delitescētes, quum nulla ex parte
diffidentur, magis sunt perniciosæ. At egressæ, exu-
uium, crassum, tegumentum, solent deponere. Qua-
re non statim ipsas capere oportet, sed permittere,
ut aere aliquandiu fruantur, consuetōq; uescantur ci-
bo, hoc est herbis, buprestibus, cantharidibus, & pi-

Cantharis per
se, uesicā exul-
cerat, alijs autē
admista saluta-
re illius reddi-
tur medicamē.
Papaueris suc-
ci facultas

Aranei triti po-
tiq; ex uino,
morsos ab ip-
sis, afferunt,
Theriace cō-
stituentiū phar-
macorū quali-
tates, totas per
totas miseri,
conspirareq; i
naturalē quan-
dā cōmunēq;
omnium tem-
periem.

Theriace An-
dromachi præ-
fertur cæteris.
Viperę qñ ve-
nandæ.

Viperæ quales
sint deligendæ

Viperæ fœmi-
næ masculiq;
discrimina.

Theriaces con-
ficiundæ ratio.

Theriace repo-
nendi ratio.

Theriace duo-
decim annis
ad perfectionē
cōcoqui effect;
validam vsq;

tyocampis. Eligendæ autē sunt colore sufflauæ, * exi-
mia quadam agilitate mobiles, ceruices admodū extē-
sas habentes, oculos q; tum inflammatos, tum impu-
dentes, atq; adeò intuentes ferinum. Sint etiam latiore
capite, corpore autem atq; uentre crassiori, meatum q;
habeant magis ad extremum caudæ locatum: quæ nō
inuoluta, sed potius conuersa esse debet: ac deniq; tran-
quillum incedant: qua sanē re à masculo distinguit fœ-
mina: q; q; caninos dentes habeat plures duobus. Iam
uero si caudis capitibus q; amputatis, exanguia proti-
nus, imobilia q; ac prorsus mortua, ipsa animalia cer-
nantur, ad medicaminis compositionē non conferunt.
At si motum, sanguinem q; cōseruare aliquandiu pos-
sint, tunc eas, ceu præstantissimas coques ad conficien-
dos trochiscos, quatenus dictum est. Porro medicamē-
ta reliqua, contundere, cribro q; incernere q; subtilissi-
mo oportet: nam leuia insigniter admodum mihi iuua-
re uidentur, q; facilius apponantur corporibus. Quæ
conspergenda laxiganda q; sunt, ea uino Phalerno lax-
uigentur & conspergantur. Deinde omnibus in hunc
modum contritis, Hymettii mellis mediocriter cocti,
libras denas adijcies. At resinam chalbanum q;, seor-
sum prius eliquata, in mortario postea ipsi medicamē-
to immiscebis: omnia q; tandem manibus modicē opo-
balsamo intinctis, simul atq; accuratē confundes: atq;
itaq; antidotum in uitreis aut argenteis uasis repones.
Non autem uehementer ipsa replebis, sed relictō quo-
dam spatio, quo medicamentum perspiret. Quare fre-
quenter operculum detrahes, ut & liberius exhalet, &
maturior tibi ipsius usus contingat. Quippe haud mo-
dico tempore ad concoctionē indiget, ut quando usus
postulet, antidotus probè sit cocta. Concoquitur autē
plurimum duodecim annorum spatio. Cæterum qui
uigentiore ipsa uti uolūt, etiam quinto anno, septimo q;
eam exhibent: præsertim ijs qui à uirulentis bestijs

THER. AD PISONEM 459

& à cane rabido sunt commorſi: nec non in medicamē
tis letalibus. Eſt autem potens medicamentum aduſq;
triginta annos. Nam in alijs affectibus, ubi tanta nox
cauſa nō eſt, ſufficere uidetur, quum uſus exigit, etiam
ſexagenarium. Etenim ubi huius antidoti facultas eſt
ualida, ſi ſumatur poſt pharmacum purgans, eius ope
rationem ſupprimi; ſi uerò imbecilla, minimè purga
tionem impedit. Iuxta differentias autem affectuum,
ipſius medicamenti quantitatem metimur, congruumq;
miſturæ modum adminiſtramus. Siquidē præter affe
ctus dictos, capitis diuturnos dolores atq; uertigines
ſanat, auditusq; difficultatem, & oculorum hebetudi
nem corrigit. Comitialibus etiam opitulatur, reſcien
tesq; ſanguinem plurimum iuuat, ſi quis ipſam cum
ſymphyto decoctam, dilutamq; ex aqua exhibuerit. In
ſuper inteſtinorū uermes exterminat, hepaticos & lie
noſos reſtituit, dyſenterias, lienterias, uoluulosq; præ
fertim quum inteſtina uacant inſlāmatione, perſanat.
Præterea quum corpus multis & copioſis ſudoribus
diffluit, ipſiusq; robur eſt exolutum, nec morbus uini
potionem admittit, theriace epota ſudorē ſiſtit, & col
lapſas uireis corroborat. Iam uerò in mulieribus etiā
menſes educi, & uteri ſedisq; ſuppreſſas hæmorrhoi
das ſubinde aperit. Nam quum uaria miſtaq; facul
tate ſit prædita, ideo alia diffundens, extenuansq;, co
git ut excernantur: alia ob uirtutis imbecillitatem præ
ter modum fluentia, ſolet, uires inſtaurans, cohibere.
Quinetiam uniuerſis articularibus morbis auxilio eſt,
quum præterierit augmenti tēpus, uigorisq; ſtatus ac
ceſſerit. Tunc nāq; fomentis dolorem leniens, antido
tum ppinabis: quæ ſanè fluxiones inſarctas diſcutiet,
& irruētes arcebit. Prodeſt theriace & ſanis, ſi crebro
ipſam aſſumant. Hoc auxilio uſi ſæpe ſuccurrimus ele
phlāticis. Nec uerò corporis tantum, ſed animi quoq;
affectibus auxiliatur. Quippe melancholicis uitijſ, ſi

ad, annos. trigi
ta, iuuareq; et
ſexagenarium

Theriace pro
bandæ ratio.

Theriace qui
bus opituletur
affectibus.

Theriace cor
poris & animi
affectibus au
xiliatur

Quartanæ fe-
bris curatio.

Aquæ pauoris
omniū morbo-
rū pessimi de-
scriptio.

Canis rabidi
notæ.

Morsus a rabi-
do cane contra-
cti, curatio.

Morsum rabi-
di canis esse
conseruandū.
apertū, ut mi-
nimum quadra-
ginta dies.

Theriace etiā
ad mortā vulne-
ri, auxiliari ca-
nis rabidi mor-
sui.

sæpe exhibeatur, medetur, ipsam atram bilem exhau-
riens: quare pulchrè ad febrem etiam quartanam con-
uenit, quādoquidem ab atra bile trahit ortum. Ego igitur
multos laborantes quartana, hoc præsidio facillè li-
beraui. Nam uomitu prius secundum cibum ipsos eua-
cuans: deinde in sequenti die succū absynthij exhibēs,
ita horis duabus ante accessionem, ppino antidotum,
protinusq; æger frequenter liberatur ab accessione.

Aquæ etiam pauorem, omnium morborum pessimū,
qui morsos à cane rabido sæpe inuadere solet, tollere
hoc medicamen consuevit. Quo quidem morbo corre-
pti, aquam timent, ac propter multam ariditatem, hu-
midi desyderio tenentur: cæterum à potu abstinent,
quia mente alienati, id quod auxiliari possit, non con-
syderant. Proinde fit, ut aquam fugientes, inarescāt, &
conuellantur; ob febrem qua intus uruntur: miserrimi-
moq; tandem mortis genere intereant. Canem porrò
furentem & rabidum, ab eo qui nihil tale perpeffus sit
facillè digno: cere licet. Siquidem si audieris gracilem
corpore, siccum, oculis inflāmat, cauda demissa, spu-
mante ore, lingua exerta, eaq; bilis colore infecta, ob-
uium quemq; infilisse, citraq; rationem cucurrisse: de-
inde rursus subito uolentem consistere, furore quodā
insano percitum, momordisse non sibi antea præuisos:
hæc inquam si in eo sic habere intellexeris, statim rabi-
dum esse canem intelliges. Quare uulnus ab ipso illa-
tum longè uastius efficies, carne multo interuallo orbi-
culatim præcisa, ne facillè ad cicatricem perueniat: sed
foramen diu, quadraginta ut minimum diebus, patef-
cat, ut per ipsum canis uirus emanet. Cauterij igitur
admodum candentibus locū solemus adurere, et alijs
uti medicamentis, quæ extrahendi uim obtinent. Ego
uerò antidotum ipsam rosaceo mistam aliquando in
uulnus indidi, ut cucurbitule instar exugeret, ab altoq;
uirus ipsum extraheret: ut que nō modò epota, sed etiā

admota extrinsecus rabidorum moribus presentaneū
remedium existat. Sed neq; ad pestilentem luem (quæ
& ipsa ueluti fera quædam existens, ab aeris putredine
exorta, per inspirationes insiliens, haud unum aut alte-
rum hominem, sed plures quoq; ciuitates depascit, ua-
stat, & populat) reperire est aliud efficacius remediū.
Nam quemadmodum cōstat Diuum illum Hippocra-
tem, per solam alterationem aeris, discussisse olim ab
Athenis pestilentem eius cōstitutionem, nimirum per
totam urbem ex aromaticis lignis, & suauissimis flori-
bus, uarijs pyris extractis, ut aerem purum hoc modo
redditum, inspirarent homines in mali subsidium: si-
mili ratione theriace, ceu ipsa quoq; ignis quidam pur-
gatorius existat, præsumentes quidem ipsam in pesti-
lenti aeris statu, neutiq; malo corripi finit: correptis au-
tem mederi potest, malitiam inspirati aeris inalterās,
nec ipsam amplius grassari permittēs. Quare in pro-
spera quoq; ualitudine, ut crebro utaris hac antidoto,
consulo, sed præcipuè dum per horridam hyemē iter
facturus es. Iam uerò antidotus hæc sensus omnes cō-
firmat, acuit mentem, adeoq; ob uarietatem miscellæ,
ab iniurijs corpus securum facit, ut ne à deletherijs qui-
dem euinci possit: ut fertur de Mithridate, qui non the-
riace (ut quæ nōdum erat) sed alia antidoto, quam Mi-
thridation appellauit suo nomine, præmunitus, nō po-
tuit ueneno interire. Quum enim à Pompeio uictus,
in extremis cogeretur sibi sano per uenenum mortē
conciscere, medicamento copioso epoto, ipse quidem
ob presumptam antidotum, defungi uita non potuit: si-
liæ autem, quæ ob eximium erga patrem amorem, op-
petere cum eo mortem uolentes, idem medicamētum
hauserunt, subito animam exhalarunt. Quod Mithri-
dates sentiens, Pysto suo familiari iniūxit, ut ipsum iu-
gularret: qui pharmaci opus absoluens ferro, eum mo-
ri uiolenter coegit. At uerò theriace utendum est post

Pestilentē luē
esse ueluti fe-
ram quādam,
ab aeris putre-
dine exortam,
eiq; nihil effi-
caciū theriace
Pestilentia ab
Athenis abe-
git Hippocra-
tes, per totā vr-
bē varias py-
ras ex materia
aromatica ex-
trahens.
Theriaca, ceu
ignis purgato-
rius existit

Mithridates præ-
munitus anti-
doto, uinci a
ueneno nō po-
tuit, ac proin-
de opus medi-
camenti perfe-
cit ferro.

Theriace vten
dum esse post
absolutam co-
ctionem,

Theriaces pro
pinandæ quan-
titas.

Theriaces v-
sus qbus atati-
bus & tpiibus
congruat, et q-
bus minime.

Theriace cor-
pora puerorū
dissoluit.

Aurum iudica-
ri per ignem.

Ferum igne
mollescere.

Viperas cōbu-
stas, salutare
ab igne reddi,

absolutam coctionem, interdum quidem instar Aegyptiæ fabæ, cum binis aquæ cyathis, ubi exiguum ad coctionem ipsius intervallum erit: interim uerò auelanæ nucis magnitudine, ex tribus aquæ cyathis, quū plus temporis ad pharmaci distributionem es habiturus. Cæterū per æstatem neutiq; id pharmacum capere consuluerim. Similiter ætate florentibus, calidis si misq; naturis, nec multum, nec sæpe id exhibendum censeo: ijs uerò qui iam inclinant, & plurimum, & crebrò, non ex aqua, sed ex uino, ut propinetur, suadeo. In pueris omnino uitandum id medicamen est: ut quod facile corpora eorum dissoluat. Memini siquidem aliquando puellum ex intempestiuo usu antidoti dissolutum fuisse.

De salibus theriacis.

S Ales theriaci ad prædictos etiam affectus faciunt, modicè tamen ac longo tempore. Neq; enim euanescit ipforum facultas, tametsi ex cōbustis uiperis cōficiantur. Multa siquidem euadunt ignis commercio meliora: aut latentem naturam edunt. Aurum quippe iudicamus per ignem: adulteratumq; igne coarguitur: ac flamma exacte purgatum, esse probū apparet. Ferrum igne mollescit, flexūq; nobis ad multos uitæ usus est aptum. Nunquid etiam plurima quæ ingeruntur in corpus, nutriendis nobis ignis beneficio idonea redduntur. Etenim (ut alia præteream) uinum statim ab uuis præssum, est crudum: a Solis autem igne concoctum, suauissimū & maximè potabile reddit. Chalcitis etiā, cruda quidem corpora exurit: cocta uerò cicatricem inducit corporibus. Lapis phrygius crudus, acerrimus est: ignitus & cum alijs quibusdam tritus, fit oculorū præsentaneum remedium. Spongiæ combustæ cinis, sanguinis fluxionem potenter inhibet. Viperæ itaq; simul omnes integrèq; combustæ, insitam prauitatem deponunt: ab igneq; salutare redduntur. Peculiariter

THER. AD PIOSONEM 463

autem sales medentur maximè affectibus per summā cutem obortis, leucis enim dico, lepræ, atq; agresti im petigini: abiguntq; pedunculos, propriè ex corruptio ne enascentes. Præterea dentes optimè abstergunt, erodiq; ipsos nō permittunt, ac flaccidas gingiuas con densant, earumq; fluorem atq; putrilaginē reprimunt.

Sales Theriaci quibus auxiliē tur affectibus.

Præparatio autem eorum est talis. Viperæ prædi ctis similes, & eodem tēpore captæ, numero quatuor, non biduo post uenationem sumuntur. Præstiterit ta men si eodem die quo sunt captæ, ijs utaris. Dein salis ammoniaci, uel cōmunis, colore albi, & leniter splen dentis, modius Italicus. Cum quo tunduntur minuta tim, Gentianæ Creticæ, lib. j. S. aristolochiæ rotundæ, tantundem. Centaurij tenuis come, lib. ij. cardamomi, Armeniaci prasij, sing. vnc. vj. Scordij mōtani, selini, chamædryos Creticæ sing. lib. j. rutæ satiuæ seminis, tantundem. Melle Attico hæc uniuntur: & selibra ip sorum in ollam fictilē uacuam coniicitur. Postea qua tuor serpentes uiuæ: mox scillæ teneræ, admodumq; recentes, quinq; numero, conciduntur minutim: ita re liqua aliorum pars dimidia adiicitur: atq; ubi coope rueris ollam, lutoq; diligenter obliueres, quatuor fora minibus ipsam pertundes, ut per eam uapor coctionis mensuram indicet. Nam primūm fumus copiosus, ob scurus, turbidusq; expirare uidebitur, notans ignem iam inuasisse bestias: quē quidem ne inspires ipse, tibi summè cauendū est. Postea ubi uapor cessauerit, et te nuem quandam flammam per foramina exhibere con spexeris, tunc ipsa exquisitè esse cocta censeto: atq; ita ollam ab igne tollito, tota eam die ac nocte refrigerās. Deinde exemptos carbones, diligenter eos tundito, & cum his quæ subdam, incernito. Rutæ agrestis semi nis, hyssopi Cretici, sing. vnc. ix. agrestis fœniculi se minis, nardi Celticæ, stachyos Scythicæ, sing. vnc. vj. petroselini Macedonici, vnc. iij. amomi uuæ, vnc.

Sales Theria cos præparandi ratio.

iij. origani heracliotici summitatum, vnc. ix. hormini se-
 minis torrefacti, vnc. iij. thymi Attici summitatū, vnc.
 ix. Malabathri Indici fol. vnc. iij. baccarum iuniperi
 Laconici carnis, lib. ij. coriandri satiui sem. vnc. vj. pi-
 peris albi & nigri, sing. vnc. ij. silphij rad. vnc. x. zingi-
 beris, lib. ij. satyrj sem. uel rad. pulegij montani, seselis
 Massaliotici rufi, tortili montani seminis, mēthe, sing.
 vnc. vj. cassiæ optimæ vnc. ij. cinnamomi vnc. j. Rur-
 sus omnia contundito, concernitoq; & reponito in ui-
 treis uasis: neq; utaris ipsis nisi post dies ferè denos.
 Porro ego sales ipsos aliàs preparauī, non uiperas, sed
 earum loco, tantundem theriacorum pastillorum, unā
 cum alijs medicamentis comburens: qua industria ip-
 sos longè præstantissimos feci.



FINIS.



Quæ habentur in libello de theriaca ad
 Pamphilianum, ea omnia huic qui
 ad Pisonē inscribitur insunt
 lōge cumulatiora. Qua
 illum ex industria
 reliquimus.

Galenī

469

GALENI PERGAS

MENI DE ANTIDOTIS

LIBER PRIMVS.



MEDICAMENTA quæ nō extrinsecus corpi imposita, sed intra ipsum assumpta, affectibus auxiliantur, antidotos Medici appellant. Tres autem in uniuersum differentiae ipsarū existunt. Nonnullæ siquidem letaliū medicamentorum gratia offeruntur: quædam contra uirulentas feras opitulātur: aliæ affectibus ex praua uictus ratione obortis succurrunt. Sunt quæ tres hosce polliceantur usus, ut theriace ab Andrcmacho præparata, quæ Mithridation dictam ab usu hominum relegauit. Si quidem quum theriace haud exiguam uiperarum carnem contineat, hoc nomine ad uiperarum morsus præstantior q̃ Mithridation existit. Ad alia uerò Mithridation nihilo minus ualet: imò est etiam in quibus præstantius se exhibeat. At non easdem uires obtinent ipsæ antidoti, & post noxia medicamenta, & ante eadem assumptæ. Nam quæ ipsarum quantitas, quum p̃sumuntur, sufficit ut hoīem illesum custodiat, ea quadruplo, aut quicuplo aucta, quum post uenenū datur, auxilio est: idq; non semel quotidie, sed bis. Quod si quis etiam singulis diebus, quemadmodum nostro sæculo Imperator Aurelius Antoninus, uel ut ipse Mithridates, medicamentum capiat, omnino à deleterijs uenenis erit securus: ut Mithridatem ferunt, quum exitiali hausto medicamento, potius mortem oppetere, q̃ subiici Romano Imperio, elegisset, nihil reperisse, q̃ perimere ipsum potuerit. Porro Antoninus summo studio, singulis diebus ex ipsa theriace, instar fabæ Aegyptiæ, deglutiebat citra ullum liquore: à qua postea,

Antidoti quæ dicantur.

Antidotorum tres differētiæ.

Theriace, Mithridatium ab usu expulit.

Antidotos dū post uenenum dantur, liberius esse exhibēdas, q̃ si p̃sumerentur.

Mithridates cōmunitus antidoto, perimere se ueneno non potuit. Antonin⁹ Imp. singulis diebus utebatur theriace, instar Aegyptiæ fabæ.

Tomus IIII.

GGgg

quum in quotidianis actionibus premeretur sopore, detraxit papaueris succum. Rursus autem quum cruciaretur uigilijs, coactus fuit ex Theriace inueterata, ceterum ex opio confecta, aliquantulum addere. Quippe

Antidoti vetustiores, papaueris lachrymam longe mitiorem possident.

Galenus medicamentorum conquirendorum gratia, uarias plustrasse regiones. Medicamenta explorandi ratio. Mel optimum quale nam esse debeat.

eiusmodi medicamenta, si uetustiora sint, ipsam papaueris lachrymam longè mitiorem obtinent. Danda autem maximè opera est, ut medicamenta ex quibus huiusmodi antidoti præparantur, quæ exploratissima sint: quâdoquidem passim solent adulterari. Quæ quidem ut exquisitissima haberem, ipse inuisi alias tum Cyprum, tum Palestinam Syriæ nauigauit; in Lemnum. Porro in quo singula medicamenta alijs gustu aut odore præstant, in illo sanè, id quod ualidum est, principè inter similia specie, sibi uendicat locum. Sic enim mel dicimus præstantissimum esse, quod dulcissimum & acerrimum inter omnia alia fuerit: quodque colore pallidum, media sit consistèntia, defluensque sensim, suam cōtinuitatem tueatur. Danda autem opera est, ut quod uinum hisce medicamentis miscetur, ualidum atque firmissimum sit, ita ut non immutetur amplius. Etenim imbecillima & aquatissima uina, aut uehementer austera, maximèque omnium uinorum acescentia (hæc enim sunt alba & tenuia) ubi præuenerint primis annis acescere, reliquo tempore permanēt. Hæc autem ut caput minimè feriunt, sic nec corpus manifestè calfaciunt, nec concoctioni in uentriculo & uenis quicquid perspicuè conferunt, nec alendo corpori subministrant: quauis inter omnia uina celerrimè inueterentur: hoc est, promptè in ueterascentium qualitatem mutantur: quæ qualitas, acrimonia est cum perspicuo calore: postea uerò, amaror, in quem acrimonia mutatur. Cæterum ut uina ipsa uel acorem, uel amaritudinem contrahant, locus in quo asseruantur reposita, confert. Qui quidem optimus initio est frigidus: postea uerò calidus, aut e contrario, calidus per initia. Nam tepidus, faciliè ipsa in aco-

Vina, quæ celerrime oium inueterentur.

Veterascentium uinorum qualitas est acrimonia cum perspicuo calore, cui postea succedit amaritudo.

Vina reponendi ratio.

Tepidus locus uina in acore uertit.

rem uertit. Nonnulla autē sunt adeò imbecilla & aquo-
sa, ut ne initio quidem frigus tolerant. Ac talium custo-
diēdorum gratia, Pater meus stœbe copiosa calidaq;,
in calidissimam domum coniecta, uasa repleta occul-
tabat: qua industria usus, nunq̃ habuit acidum uinum,
sed celerrimè omnia ueterascentia. Quo autem nunq̃
ab scopo aberraret, uasis infundebat uinum non nouis,
sed ex quibus aliquod iam uetus uacuasset: curabatq;
ut furni, fociq; in proprinquo ipsi thecæ uinariæ essent:
qua ratione etiam in multis Italiæ locis uinum calfie-
ri intellexi. Verū quæ in hunc modum parantur
uina, ut firma durabiliaq; sunt, sic capitis dolorem con-
ciliant, propter furni qualitatem quam contraxerunt.
Itaq; eiusmodi omnia uina in medicamentis compo-
nendis, quæ intra corpus sumenda sunt, euitabis. In
emplastris uerò, & alijs quæ extrinsecus imponuntur
medicamentis, etiam talibus uti, si meliora desint, nihil
prohibet. Ad antidotos ergo Phalernum uinum, quod
nondum præ uetustate amaricet, optimum est. Præ-
stat autē ad theriacem deligere id quod dulcius fuerit,
gratia gustus gratoris: cuius sollicitudo in medicamē-
tis quæ deglutuntur, habenda est. Iam uerò mel om-
ne uetustum, redditur ex coctione amarum: neq; id mi-
rum est, quum uel citra cocturam, tēpore amarius ex
dulciori reddatur. Quare quod fuerit inueteratum, fu-
giendum ad antidotos est. In uniuersum autem, Me-
dicum debere esse peritum omnium stirpium, aut plu-
rimarū, oportet. Siquidē compositorū medicaminū uir-
tus uires simplicium sequit: exigua quadā, in ipsa con-
posituræ ratione differentia obueniente. Differentiæ
autem stirpium sunt, arbores, frutices, herbe, sping, uir-
gulta. Porro theriaces compositio quam descripsit car-
mine Andromachus, habet in hunc modum.

Stœben cōdu-
cere ad celerē
concoctionem
vinorum.

Vina quæ ma-
turerunt præ-
sidio ignis, ca-
pitis dolorem
conciliant.

Vina antido-
tis emplastris,
q̃ commoda,
qualia esse de-
beant.

Mel vetustum
ex coctione a-
maricat, id qd̃
tēpore vel ci-
tra cocturam
perpetitur.

Compositorū
virtus, vires
simplicium se-
quitur.

Stirpiū differē-
tiæ quæ sunt.

Hinc recitat Galenus carmina Andromachi, ac de

GGgg ij

inceps rationem conficiendæ Theriaces explicat, quæ omnia cōsultò reliquimus, q̄ sint prorsus eadem quæ habentur in cōmētario ad Pisonē. Itaq; ea tantū anno tabimus impræsentiarum, quorū in illo non meminit.

Galenus.

Viperas venā
diratio.

Quod pertinet ad uiperarū capturas, neq; iuxta marina loca, aut aquas falsuginosas uenandæ sunt. Quippe antidotum ex huiusmodi compositum uiperis, sc̄tim conciliat. A foetis etiam est abstīnēdum. Iam uerò, dum coquuntur, salis inijci debet, si quidem conuenienti tempore uiperas coeperis, modicum: sin

Artifcos The-
riacos conficiē
di ratio.

autem æstate, nihil. Panis ad conficiendos artifcos so-
leo miscere ipse uipereis carnibus quartam, aut quin-
tam partem. Qui nisi probè sit tostus, uerēdum est, ne
pharmacum ipsum ace scat. Sati us autem est ut multo
citius siccentur, aridum panem cum ipsis carnibus ac-
curatissimè læuigare, ac sic tenues orbiculos fingere:
q̄ si etiam brodium uiperarum affundas. Reponi autē
debent ubi assicati fuerint, in uase stanneo, uitreo ue,
aut aureo. Cæterū uitreum quidem & aureum, nul-
lum dolum admittit: stanneū uerò, adulteratur plum-
bi mistura. Tale igitur uitare conuenit in uniuersis an-
tidotis: ueluti & quod argento non purgato cōfectum
est. Celerrimè nāq; & huic ærugo oboritur. Durat ui-
gor ipsorum orbiculorum, si curiosè sint resiccati, & re-
positi, tribus & quatuor annis. At scillini trochisci,
ex tribus scillæ optimè toste ptibus, & duabus tenuis-
sime farinae crui, similiter conficiuntur.

Vasa vitrea
vel aurea nul-
lum dolum ad
mittere, stānea
aut adulterari
plūbi mistura
ac p̄inde able-
ganda ab an-
tidotis.

Scillonorum
confectio.

Post hæc subdidit Gale. descriptionem magmatis
Hedychroi, quam habes in commentario de theriaca
ad Pisonem.

Galenus.

Piper longum
adulteratū affu-
sa aqua soluit.

EX medicamentis quæ theriacem constituunt, lon-
gū piper solet adulterari. Cæterū adulteratum

quidem, affusa aqua soluitur: quod uerò adulterio caret, insolubile permanet. Contra autem, uerum sagapenum, statim aqua rigatum soluitur: quod non tale est, eliquescit minimè. Sciendum autem est, chalbanī partem, in sagapenum degenerare. Similiter etiā optima cassia in cinnamomum transit. Nec secus in optima myrrha opocalpason reperitur, ab ipsa myrrha diuersum. At opocalpason est letale: multisq; ob inscitiam myrrhæ, quæ opocalpason continebat, conciliauit exitium. Nam de industria nonnulli antidotum præparatum, ipsam ut laudatissimam iniecerunt: quod collyrijs inditam, optimum esse medicamentum uiderent.

Quemadmodum igitur in pueris gemellis inuicem similibus, qui quidem nō eis assueuerunt, alterū ab altero nequeunt discernere: ijs autem qui unā uixerunt, facillima est ipsorum dignotio: ita qui inter singula medicamenta est uersatus, facile uel minimas eorum differentias cognoscit, quæ latent illos, qui ipsa semel tantum, aut bis, conspexerint. Rosæ ad theriacem eligendæ sunt alijs omnibus rubentiores, atq; odoratæ magis. Vnumquodq; siquidem præstantissimū est, quod proprium generis sui odorem ualentissimū possidet. Præstant etiam in quolibet genere, nō rugosa, neq; exilia, sed quæ probè nutritam, solidamq; consistentiam sortiuntur. Scordium optimum, ex Creta nobis aduehitur, quod quidem cadauera supra ipsum iacētia, diutissimè tueri à putredine proditur. Opobalsamum aduultera plurimis modis, quos premo, ne quis sorte doctrina mea abutatur. Quare neq; eos probo, qui scripturas letaliū medicamentorū inuulgant. Porro cinnamomum optimū debet odoratissimum esse, gustati calidū, colore aut tale, ut si quis lactis colorē fusco admiscuerit, cum cœrulei pauxillo. At agaricum (quod sanè adulterium nullum admittit) laudatissimum est quod leuissimum: ut densum, graue, & lignosum, deterrimū.

Sagapenum aqua rigatum soluitur.

Chalbanī pars transit in sagapenum.

Cassia in cinnamomum conuertitur.

Opocalpason est letale, reperiturq; in myrrha.

Præstantissimum esse medicamentū qd propriū generis sui odorem ualentissimum possidet.

Scordii cadauera incorrupta tueri,

Letaliū medicamentorum doctrinam inuulgandam nō esse.

Cinnamomi optimi notæ. Agarici optimi notæ.

GGgg iij

**Croci optimi
notæ.**

**Carpesij fa-
cultas.**

**Spica nardi ra-
dix est, sed ob
similitudinem
quam cum spi-
cis habet, sic
appellatur.
Rheon adulte-
randi modus.**

**Rheon esse ve-
hementer astrin-
gens gustui.**

Crocus optimus est, qui flauissimus, odoratissimusq; existens, longo tempore in uigore perdurat. Iam uero in cinnamomi penuria, duplicata cassiæ portio inijcienda est. Carpesio etiam sæpe loco phu utimur. Est enim similis genere cum eo facultatis, sed ualentioris: nonnihilq; odoratum refert. Sunt enim tenues festucae, surculis cinnamomi persimiles. Nardus Indica, quæ radix quidem est (licet ob similitudinem formæ quā cum spicis habet, spica nardi uocetur) nō est emenda elota. Vnguentarij quippe, coquentes prius eam, ut ad alia ipsius decocto utantur, postea inutilem uendunt. Rheon quoq; ipsum adulteratur. Quādoquidem statim in regionibus ubi gignitur, recens nonnulli capientes ipsum, decoquunt, donec totum cremorē reddat: quem postea cremorem, ubi accuratius percoxerint, ceu purum, atq; ab aquæ mistura alienum, ad nos transmittunt: sicuti & rheon ipsum siccatum, tanq; neq; id prius cocturam fuerit expertum. Cognoscetur tamen facilè dolus: nam eiusmodi rheon nec densam, compactam ue substantiam possidet, ut quod integrū est, sed rarius apparet, astrictionemq; aut obscurā, aut planè nullam gustanti exhibet: quam tamen rheon uigens ualidissimam possidet.

Deinceps Galenus modum præparandæ Theriacæ tradit: qui quidem iam expositus est, in commentario ad Pisonem. Subiungit etiam cōpositiones eiusdem antidoti, à Damocrate, atq; etiam Critone proditas, quas quidem (quia descriptionem Andromachi unicè cōmendat Galenus, eiq; esse inhærendum censet) studiosi breuitatis ommittimus.

471

GALENI PERGA

MENI DE ANTIDOTIS,

Liber Secundus.



QVANDOQVIDEM de the-
riace toto priore libro tractauimus,
in præsentī de cæteris antidotis disse-
ramus, ab ijs quæ Andromachus de-
scripsit, exorſi.

Antidotus Mi-
thridatia, ad letalia peculiariter effi-
cax, ad omnesq; internos affectus. Dulcis radiculae,
drach. vj. S. obolos. iij. opij drach. iij. obol. ij. castorei,
drach. vj. polij, drach. v. obol. ij. costi tantundem. spice
nardi, drach. vj. obol. ij. casſiæ drach. v. obol. ij. thuris
drac. vj. seseleos drach. v. obo. ij. hypocisthidis succi,
drach. vj. achori drach. ij. scordij drach. vj. obol. ij. fo-
lij drach. iij. salis drach. vj. cypheos. drach. vj. obol. ij.
myrrhæ drach. vj. croci drach. vj. obol. ij. cinnamomi
tantundem. styracis drach. v. obol. iij. dauci seminis
drach. vj. obol. ij. zingiberis drach. vj. obol. ij. phu Pō
tici drach. ij. petroselini, drach. iij. obol. ij. nardi Gal-
licæ, sceniculi seminis, nardi Indicæ, sing. drach. iij. hy-
perici, acaciæ, utriusq; drach. ij. gentianæ drach. iij. ani-
ſi, drach. iij. Thlapsi drach. vj. obol. iij. meu athaman-
tici drach. iij. rosarum siccarum, cardamomi, sing. dra-
ch. iij. gummi, drach. ij. iunci odorati rotundi. drach. vj.
obol. ij. opopanacis tantūdem. opobalsami drach. vj.
obol. iij. chalbani drach. vj. scinci drach. ij. obol. ij. re-
ſinæ terebinthinæ drach. vj. obol. ij. uini Chii. quod sit
ſatis, mellis Attici cocti quantum ſat eſſe uideatur.

Conſcito. Antidotus Aelii Gaii, ad letalia & ui-
rulenta omnia: quæ, ſi inſpergatur ubi frequentant ſer-
pentes, eos fugat. Facit ad omnem oculurum fluxum,
& reliquarum partium. Diſcutit omnes moleſtias ani-

Antidoti Mitri-
datiæ descri-
ptio.

Antidotus.
Aelii fugans
serpentes, ad
cōpluresq; af-
fectus p̄ utilis.

GGgg iij

mi, febresq; longas & circuitu repetentes perfanat. Adhæc, menses, foetusq; absq; difficultate educit, auxiliaturq; phthificis, auellanae nucis instar epota, cū aque cyathis quaternis. Ad uipereos tamen morsus, ex uino exhibetur. Myrrhæ drach. xij. croci, nardi, utriusq; drach. xij. iunci odorati rotundi, drach. xij. cinnamomi drach. ij. amomi drach. iij. chalbani drach. ix. resinæ terbinthinæ drach. v. piperis albi drach. x. longi drach. xxxij. costi drach. viij. thuris drach. xij. lachrymæ papaueris tantūdem. scordii, drach. l. polii drach. iij. hypocisthidis succi drach. xij. petroselini drach. viij. seselis drach. xiiij. dauci seminis drach. xvj. opobalsami drach. xij. opopanacis tantundē. castorei, drach. viij. mellis Attici. sextar. ij. Conficito.

Antidotus ex
sanguinibus a
Damocrate
scripta.

Damocratis Antidotus ex sanguinibus ad uenena. Sanguinis anserini, & marinæ testudinis, & anatis, & hœdini, siccorū omnium, sing. drach. ij. Myrrhæ stillatitiæ, spicæ nardi, sing. drach. x. cinnamomi drach. vj. rosæ fol. sic. drach. viij. iunci rotundi, thuris, costi, sing. drach. j. amomi, piperis albi, utriusq; drach. iij. piperis longi, drach. j. S. croci drach. xij. castig. drach. viij. trifolij radicis, drach. v. polii tantundem. opobalsami drach. iij. petroselini, drach. iij. baccarum iuniperi, acori, rheu pontici, meu, dictāni, phu, ammoniaci thymiamatis, fœniculi, sing. drach. ij. agarici drach. ij. S. saxatilis rutæ, drach. iij. dauci, drach. ij. anisi, asari, ameos, cumini, sing. drach. j. S. sem. napi syluestris, drach. iij. scordii Cretensis, drach. v. mellis optimi duplum omnium. Detrita omnia, coctoq; melle excepta, uasis indito.

Rosaceorū pa-
stillorū confe-
ctio ex Damo-
crate.

Rosacei pastilli confectio ex Damocrate. Rosæ uirentis foliorum, lib. iij. iunci rotundi, drach. xx. myrrhæ drach. xij. croci drach. viij. Contusis rosis atq; per setaceum transmis- sis, addantur reliqua cōminuta: ac postea rursus simul tundantur, rediganturq; in prægrandes orbiculos.

Crocomagma-
tis preparatio.

Crocomagmatis preparatio Croci Cilicij drach. C.

myrrhæ pinguis, rosarum siccarū, amyli, gummi sing. drach. L. Omnia uino odorato, marinæ aquæ exper- te, excipiātur & læuigētur, ac deniq; in trochiscos frin- gantur.

Antidotus præfagiens nomine: qua ebi- bita, uenenum cum cibo sumptum, prorsus reddetur uomitu. Lemniæ terræ, drach. j. obol. ij. baccarum iu- niprri, drach. ij. læuigentur exactè cum olei dulcis pau- xillo. Propinatur ex mulsa, nucis ponticæ magnitu- do.

Asclepiadis ad eos qui letalia biberunt, re- media. Papaueris lachryma epota, confert mouere uomitum ex hydrelæo calente, uel ex oxycrato calido: aluum q; clysmis subducere. Opio epoto, merū copio- sius, statim bibitum iuuat: aut piper cum uino. Condu- cit etiam lac asininum haustum: atq; clysmi mitiores. Sumpto aconito, iuuat manipulum rutæ, leuigatum ui- no meraciori, ebibere. Si altercū nocuit, lac asininum, uel quoduis aliud, cum mulsa calida opitulatur. Si uir- ride coriadrū, auxiliatur uinum meracum potum, & pinguius gallinarū. Lepore marino assumpto prodest lac asininū bibere: sin minus, uaccinū, aut caprillum. Si toxium potum sit, uinum dulce adiuuat, oleum rosa- ceum, sanguis caprillus, semen q; napi cōtritum ex ul- no. Quibus fungi obsunt, dari debent raphani crudi q̄ plurimi: item uinum meracum, & cineris sarmenta- rij lixiuium: præterea nitrum aceto dilutum, aut fæx ui- ni combusta, trita q; cum aqua: aut absynthium ex ace- to, aut deniq; ruta ex aceto trita, exhibetur. Si ixia fue- rit ingesta, succurrit absynthium potum cum uino, ca- storeo, & ruta. Proderit & oxymeli potare, & uomitio- nes ciere. Buprestis assumpto, passi plurimi potus, ac dein uomitus opitulatur: necnō lac calidum bibitum, decoctum q; ficuum in potu datum. Si cātharides hau- stæ sint, conducit passum ex oleo bibere, plurimum q; etiā lactis haurire, & plures nucleos pini esse: aut can- tharidum alas, pedes q; cum melle detritos linctu assu-

Antidotus quæ
præfagientem
nominant.

Remedia ab
Asclepiade scri-
pta ad eos qui
letalia biberūt

mere. Psilothro hausto, prodest calentis olei portio, & uomitio excitata: necnon lac caprillum, & maluæ coctæ succus, si cū oleo hauriatur. Spuma argenti porta, auxiliatur piper, apium, myrrha, cum uino lœuigata, bibitaq; . Gypso ingesto, dari debet potui, cineris sarmentarij lixiuium, & thymus ex aquæ tritus. Lacte in grumos coacto, iuuat aceti potio. Item coagulum ex aqua fontana bibitum. Vel sulfuris, sulphuris equalis portio, lœuigata ex posca, bibitaq; . Hirudinē deuorata, alij muria, alij niuis, alij aceti potu expellere tentant. Asclepiades spongiam teneram frigida imbutam faucibus demittere iubet, ut hircudo spongie infixa extrahatur. Qui cerusam hauserint, ijs confert, olei calidi potus, uomitusq; : necnon lactis asinini haustus. Quum autem ignoratur species delecteriorum quæ aut comesta, aut bibita sunt, aquam afflatim calidā cum oleo propinare conuenit, ad uomitūq; incitare. Vtile etiam fuerit, & circuncidere somnum: subscriptisq; confectionibus uti. Apolloni phar macum præseruatuum ueneni. Rutæ folia. xx. nuces iuglandes. ij. salis grumus unus, caricæ duæ. Offerantur simul ieiuno stomacho: noxam quippe à letalibus prohibent. Aliud, Baccarum iuniperi, drach. ij. lemnij sigilli, drach. ij. & obol. ij. trita exceptaq; oleo reponito. Porrigitur ex hydromelite instar auellang nucis. Hac antidoto Nicomedes Rex utebatur: si quando eorum qui inuitassent ipsum, habebat fidem suspectam. Antidotus Mithridatis, Athanasia dicta, ad letalia medicamenta, & cuiuslibet uirulenti ictum. Auxiliatur etiam uentriculo, in quo cibus acescit: necnon sanguinem spuētibus, diuturna tussi infestatis, ac breuiter iecorarijs & lienosis, uesicæq; & uteri affectibus. Piperis albi, grana. xl. costi, meu, asari, acori, dauci Cretici seminis, petroselini, nardi Indicæ, lapidis Nestoritis, sing. drach. iij. croci, myrrhæ, singul.

Antidot° Apol
lonii a ueneno
præseruans.

Athanasia Mi
thridatia.

ANTIDOTIS, LIB. II. 475

drach. viij. cinnamomi, cassiæ, singul. drach. xij. mellis Attici cocti, quod sit satis. Datur nucis auellanæ magnitudine, ex mulso temperato. Antidotus Zopyria uocata, ad prædicta omnia, ad aliosq; affectus efficacissima. Opobalsami, drach. iij. nardi, Indice, myrrhæ Troglodyticæ, iunci rotundi floris, cinnamomi, characi, costi recentis, piperis longi, hypocisthidis, polij, piperis pereatici, scordij, meu Cretici, cardamomi, singul. drach. iij. thuris masculi, carpobalsami, dictamni, singul. drach. vj. petroselini, cassiæ rubentis, sing. drach. vij. croci Corycij, drach. viij. mellis Attici quod sit satis. Datur nucis auellane instar, si febris abest, ex uino: febrientibus, ex hydromelite.

Antidotus Zopyria.

Mithridatis Theriace, qua Rex Mithridates utebatur perpetuo, ut se à letali ueneno assereret. Quum itaq; à Romanis captus esset, nec bis epoto ueneno mori posset, gladio sibi ipsi mortem intulit. Confectio ipsius secundum Andromachum habet in hunc modum. Pastillorum scillinorum, drach. xlviij. pastillorum theriacorum, piperis nigri, hedychoi magmatis, lachrymæ papaueris nigri, sing. drach. xxiiij. rosarum siccarum, iunci rotundi odorati floris, polij, scordij, seminis napi, iridis Illyricæ, agarici, cinnamomi, dulcis radiculae succi, opobalsami, sing. drach. xij. roris marini, drach. viij. myrrhæ, croci, zingiberis, rheupontici, quinque folij radicis, nepitæ mōtanæ, marrubij, petroselini, stœcados, costi, piperis albi, thuris, sing. drach. j. obol. ij. cassiæ nigrae, drach. iij. piperis nigri, drach. j. longi tantundem. meu, asari, acori, dauci seminis, anserini sanguinis sicci, anatis sanguinis, sing. drach. iij. Excipiantur melle Attico, & cocto.

Mithridatis regis Theriace, qua præmunitus, quum postea ueneno extingui nō posset, sese gladio premit.

Theriaca Aelij admodum efficac. Bryoniæ radicis drach. xvj. trifolij seminis, opoponacis, sing. drach. viij. aristolochiæ tenuis, drach. xij. roris marini radicis, iris Illyricæ, Zingiberis, opij, singul. drach. viij. rutæ syluestris seminis, drach. xij. cumi-

Theriace Aelij.

ni Aethiopici, drach. xvj. myrrhæ, casfiæ, castorei, se-
felis, eryngij radicis, serpylli, lachrymæ Cyrenaicæ,
sing. drach. vj. Medicæ, drach. xij. sagapeni drach. vj.
croci drach. v. erui farinæ drach. xxiiij. Finguntur pa-
stilli ex aqua triobolares, danturq; cum uino.

**Theriace, Eu-
clidis.**

Theriaca Euclidis, ad internos dolores, aspidū mor-
sus, pleuritidesq; & quartanam febrem, si post uomi-
tum, instar auellang nucis sumatur. Castorei drac. vj.
opopanacis, sagapeni, sefelis, cachreos, chamedryos,
chamæpityos, marrubij, sing. drach. xvj. styracis, bitu-
minis Iudaici, myrrhæ, sing. drach. vij. lachrymæ pa-
paueris, drach. viij. mellis lib. j. Conficito. Alia ad
febres omnes repetētes per circuitus, Harpalo autho-
re. Myrrhæ drac. iiij. piperis longi, uel albi, opij, sing.
drach. ij. castorei obol. iiij. S. cardamomi, drach. iiij. sa-
gapeni drach. ij. Trita cum aqua in pastillos coguntur,
qui obolos duos pendeant. Propinentur singuli cum
cyathis duobus Adriani uini, & aquæ fontanæ coctæ,
quaternis. Si febris urgeat, cum hydromelite.

**Morsui rabidi
canis potio
Cratippi.**

**Candidum Ba-
phulli.**

Potio Cratippi ad morsui rabidi canis. Cancrorum
ustorum, drach. xx. myrrhæ drach. ij. croci drach. j. S.
gentianæ drac. j. piperis albi, grana. x. uini quod ad ex-
cipienda sit satis. Datur drachma. j. cum uini cyathis
tribus temperati. Album Emplastrum Baphul-
li, quod rabidorum morsibus commodissimè extrinse-
cus admouetur: daturq; etiam catapotium ex eo nucis
auellanæ instar, ad dies. xl. Est autem alternis diebus
amouendum à uulnere, ac rursus, ubi elueris sordes,
imponendum. Ceræ pōticæ, lib. ij. spumæ argenti, ce-
rusæ, sing. lib. olei ueteris, sextarium. myrrhæ, medul-
læ ceruinæ, utriusq; drach. ij. thuris drachma. Argenti
spuma oleo cogitur, & quum mutata fuerit, cerusa in-
spergitur, ac cera miscetur. Vbi tam spissum euaserit,
ut manus non inficiat, ab igne sublato, medullā, myr-
rham, & thus inijcito. Diophanti medicamentum,

ad scorpionum ictus, & phalangiorum morsus. Aristolochiæ drach. iij. piperis drach. ij. opij drach. j. pyrethri drach. iij. Fingatur pastilli, fabæ Aegyptiæ magnitudine: danturq; duo deglutiendi, & uini meraci cyathi duo.

Diophantis medicamentum ad scorpionum & phalangiorum ictus.

Aliud ad periculosos scorpionum & phalangiorum ictus. Rutæ sylvestris seminis, erucæ seminis, pyrethri, styracis, sulfuris uiui, sing. drach. vj. castorei drach. ij. Excipito testudinis sanguine, ac ternos obolos ex meraco uino exhibeto. Aliud ad eadem optimum, conferens etiam parturientibus ægræ.

Parturientibus ægræ, medicamentum conueniens.

Myrrhæ, castorei, styracis, singulæ drachmæ. Opij, drach. ij. chalbani drach. iij. Apij seminis acetabulum. Anisi tantūdem. Piperis grana. xxx. Fingitur ex uino, daturq; drachma una, ex uini hemina. Epithema ad phalangiorum ictus, & omnis serpentis: quod etiam in potu auxiliatur. Sulfuris uiui, chalbani, utriusq; denarij. iij. Liquoris libyci, nucum auellandarum purgatarum, sing. drach. ii. uino dissoluta, & melle excepta imponuntur.

Viperarum morsibus.

Ad uiperarum morsus optimum pharmacum ab Apollodoro compositum. Cumini sylvestris seminis, acetabulum. testudinis marinis sanguinis drach. iij. coaguli hinnuli, uel leporini, drach. iij. hœdini sanguinis, drach. iij. Omnia mista, uinoq; optimo excepta, reponito: atq; o liuæ magnitudinem, ex uini optimi cyatho dimidio, dum usus postulabit, porrigito.

Apollodori pharmacum.

Heræ antidotus, qua Marcus Cathegetes est usus. Trifolii bituminosi seminis. aristolochiæ rotundæ, rutæ sylvestris, erui insolati, sing. drach. vi. Vino excipiuntur, fiuntq; pastilli drach. iij. daturq; unus ex uino & oleo. Alia ad letalia, iecinorosos, inflationes uentris, & incipientes aquæ subter cutem suffusiones efficacissima. Myrrhæ drach. v. nardi Syriacæ, drach. v. S. iunci rotundi floris, drach. ii. S. cassiæ drach. iij. cinnamomi drach. iij. piperis albi sesquidrach. thuris drachma & obolus. costi drachma. Excipiuntur

Attico melle, fingunturq; nucis auellanæ instar: ac dantur ex mulso uel aqua.



FINIS.



Complura alia ad eisdem affectus, ex diuersis authoribus congerit Galenus remedia. Nos uerò ex omnibus ea in tuam gratiam, Cādide Lector, elegimus, quæ & præstantissima uidebantur, & facilius parari possunt. Habes itaq; omnes commentarios Galeni, in compendium enchiridionq; redactos, excepto forte uno uel altero, ex quibus nihil succi exprimi potuit. Nam quod pertinet ad cōmentaria in Hippocratem, quicquid in eis continetur cremoris (nisi fatalia decreta consiliū nostrum hoc intercipient) hoc est uniuersas sententias, instar indicis atq; alphabeti digestas, breui in lucem edemus.

Tuum igitur est, illis bene pre-

cari, qui in hoc sunt toti, ut

tuis commodis ser-

uiāt, recteq; tuis

studiis con-

sulant.

AD ORNATISSI

MVM VIRVM, D. D. GASPAREM

de la Hoz, Canonicum Secobiensem, Scripto-

rem Apostolicum, ac bonarum literarum

cultorem maximum, Andreæ La-


cunæ, Secobiensis, Militis San-

cti Petri, de ponderibus

et mensuris medici-

nalibus cōmen-

tarius.



ETVS Prouerbiū, et
querissimū est, mi Gaspar,
Vir Ornatisime, optimam
esse mensuram in rebus om-
nibus: quum nimirum om-
nia quæ in uita et sunt et
geruntur, ab ea suam abso-
lutionem, suam lucē, suumq;
ornamentum sortiantur: ni-

hilq; iustum, rectum, aut inculpabile sit, quod mensura
(quæ sola uirtus inest omnibus rebus) destituatur. Quā-
obrem, si exquisitè expendamus singula, quæ cœlesti il-
la mackina ambiuntur, quæq; supra cœlos consistunt,
omnia certè inueniemus, exactam quandam mensuram,
commodationemq; à suo conditore accepisse: quā per-
petuò tuentur, dum naturæ leges non transgrediuntur.
Quippe uniformes illæ orbium cœlestium lationes, pe-

rennes astrorum cursus, ordinatæ uicissitudines temporum, conspirationes elementorum, generationes denique omnium quæ supra terram & subter illam fiunt, non aliunde quàm à symmetria quadam, quæ in accurata partium mensura consistit, proficiscuntur. Iam uerò, quæ sanitas quidem corporum, aliud sit nihil, quàm debita & absoluta mensura eorum ex quibus conflantur: morbus autem, ab hac symmetria recessus quidam & lapsus, quis ambigit? Nemini etiam est dubium, decreta & leges Reip. mensuras quasdam existere, quæ singulis suum ius dispensant. Vt autem ipsius mensuræ summam efficaciam & uim, exemplo familiarissimo exponam, poemata optimis documentis & sententijs exculta, si metro claudicent, hoc est, mensura non consent, confestim stomachum mouet, nauseamque & fastidium gignunt. Contra uerò, quæ symmetria existunt, etiam si pudicitiam offendant, moresque iuuentutis corrumpant, magnifice ab omnibus celebrantur: tantum authoritatis uendicare sibi uidetur emmetron. Cæterum quum in alijs omnibus humanis actionibus, si recte perfici debeant, mensura quædam exquisita desideretur, tum uel maxime in arte Medica ea ipsa requiritur: ut in qua, uel minima à pondere ac mensura aberratio, soleat semper ægris perniciosa & piacularis existere. Nam quum generatio nostra, incolumitasque, miscellæ quatuor elementorum debeatur, certa quadam mensura confluentium & conspirantium in unam eandemque temperiem: sanè si quando rhythmus huius soluatur, necessum est ad recuperandum habitum pristinum, reducamur eo, iusta etiā, exploratissimaque mensura eius, quod
lapsus

lapsum corrigere possit, administrata. Qua neglecta, si quis-
 piam admoliat, præsidia corpori, morbi seminarium augebit,
 aut affectum alium maligniorem inducet: ita ut non minus ca-
 uendum à tali medico sit, quàm à morbo ipso. Quum igitur inter alia
 Galeni opera, redegissem nuper in succinctam Periochen com-
 mentarios illos de compositione medicamentorum κατὰ γένει
 καὶ κατὰ τόπον, ditissimos naturæ humanæ thesauros: per-
 suasumque haberem, neutiquam ex eorum lectione percepturos ali-
 quid frugis, qui in ratione ponderum & mensurarum non es-
 sent admodum exercitati: sed potius occasionem capturos, qua
 sibi ignominiae notam: ægris conciliarent summam internicio-
 nem: precium operæ me facturum existimaui, si quæ ueteribus,
 ac præcipue Galeno, circa pondera & mensuras medicinales
 conscripta sunt, aggerans, ea omnia paucis exposita, sub præsa-
 tione nominis tui, in publicam studiosorum commoditatē æde-
 rem: ut uel ex hoc argumento, amicitia nostra, & nunquam peritu-
 ra necessitudo, omnibus innotesceret: tibi autem, si quis hinc fru-
 ctus ab aliquo hauriendus esset, prorsus acceptus ferretur. Nec
 uerò collectanea hæc de mensuris cuiquam aptius quam tibi nuncupari
 potuissent, qui (ut ceteras ingenuissimas tui animi dotes impræ-
 sentiarum subtilem) diu noctuque astronomicis studiis indulgēs,
 in eisque felices tuas horulas, haud oscitante collocans, non modo
 plagas has inferiores, sed cælos etiam ipsos metiris, mentemque su-
 pra illos eueheris: contra quam faciunt plerique alij, qui ubi semel
 quæ pertinent ad cutem curandam sunt nacti, adeo ingenuarum
 artium, bonorumque omnium institutorum infelices obliuiscun-
 tur, ut ne inesse quidem sibi animam recordentur: ac pinde obruti,
 demersi que coeno suarum cupiditatum, corporisque mole depressi,
 eam, quocumque tandem irruat, sequantur: tantum abest ut (exem-

pro tui) cœlum unq̄ suspectent, aut in meditatione rerū pulcher-
rimarum asininas suas cogitationes exerceant. Hi tamen manci-
pia umbilici sunt: à quorum ingenio tam abes ipse, q̄ qui longis-
simè. Quippe ita uteris fortunæ bonis, quæ tuo Marte acquisi-
ta, tibi q̄ largissimè suppetunt, ut eorū quidem quæ ex usu sunt,
nihil desit corpusculo, amicisq; omnia communia fiant: animus
autem ipse, minimè ab eis præpediatur, sed ad altiora aspirans,
excolatur atq; locupletetur alijs ornamentis & opibus, quæ
tanto illis splendidiore & augustiores sunt, quanto mens no-
stra corpori dignitate antecellit. Quo sanè tam admirabili amo-
re sapientiæ accensus, & si fluctibus negotiorum nunquam non
obruaris, quæ maxima cum dexteritate administras: semper ta-
men philosophiæ studijs incumbis, in eisq; tam foeliciter pro-
moues, ut Diuinum istud ingenium tuum sæpenumero admira-
ri compellar. Ne autem huic nostro commentariolo contingat,
quod patriæ utriusq; nostrum communi Secobiæ accidit, cuius
quidē suburbia sunt ciuitate ipsa ampliora, non agam hic tecum
pluribus: quum tēpestiuum iam sit, ut promissis satisfaciamus.

Eorum quæ metiri homines solent, quædam solida, cor-
pulēta, graua & sibi cōtinua sunt, ut lapis, cera, lignū, &
ferrū: quædam solida quidē & sicca, sed dissoluta & mi-
nutula, qualia accumulare consueuimus: ut hordeū, oriza, &
triticum: quædam dæmum in liquidis fluidisq; consistunt: è
quorum numero est oleum, uinum, & mel. Quæ igitur sub
prima differentia cōprehenduntur, grauitate dijudicantur:
cui negotio statera est inuenta. Quæ uerò humidā consisten-
tiam possident, uasculi cauitate expendunt. At ea quæ quum
sint arida, aggerari in cumulū possunt, medio genere ambi-
gunt: modò quippe ipsa librare: modò uasculis mensurare
consueuimus: quemadmodum liquores fluentes. Quāq̄ hi
quoq; sæpenumero reuocātur ad staterā. Liquida qppe om-

nia quę corp̃i administrantur, uniuersi ferē iam ponderant, si Hispanos pharmacopolas excipias. Hi nanq; non ponderē, quēadmodū in Italia, Gallia, Germania, & Anglia mos est, sed uasculi cavitare liquida medicamenta metiuntur: id quod eodem probare ullo modo non possum. Nā quum ex liquoribus, hi quidē grauiore sint: illi autem leuiore, atq; tenuiū partium: certē necessum est, dum eos omnes ex quo pari uasculi cavitare dispensant, grauisimē interdum hallucinentur, capitaliq; errore labātur. Nemini siquidem in ambiguo est, quę crassarum sunt partium, ea contracta & exigua mole plurimum continere substantiæ: ut pauxillum sub tumore laxiori, quę raram consistentiam sortiūtur. Etenim si accipias unam heminam olei: uini aliā: ac tertiam deniq; mellis: cōperies planē, oleum quidem ipsum, uncias. ix. pendere: uinum autem. x. Mel tredecim cum dimidia: ita ut hoc ad uinum sit sesquiplum. Quod uerō aiunt, se non una eademq; mensura, oleū, mel, atq; uinum metiri: sed eorum liquorum singulis habere suā destinatam: id illos non reddit à culpa immunes. Nā quum in generibus singulis non paruum discrimen sit penes grauitatem & leuitatem (omphacinum enim oleum, exempli gratia, quod oliuæ immaturæ fuderūt, hyoscyaminum uē, tenuitate partiū & leuitate, multis numeris ab irino relinquitur) contingit sanē, ut dum cuiusq; indiuidui unciam unā sese administrare arbitrātur, alterius quidem plus: alterius autem longē minus exhibeant: ac sic artis præcepta euertant. Deberent itaq; aut liquores uniuersos librare: aut singulis eorum speciebus, mensuram peculiarem præscribere: quam quidem inuestigare, esset nimis operosi negotij.

Porrō mensura olei erat Galeni tēpore apud Romanos cornea, pellucidaq; & lineis quibusdam orbicularibus, quibus uncia discernentur, incisa. Sunt aut innumera ponderum ac mensurarum genera, secundū uarietates regionum ac morū. Quamobrē ea describemus impræsentiarū duntaxat, quę urbi Romæ, antiquissimæ totius orbis Metropoli,

HHhh ij

semp fuerunt familiarissima: quū præsertim Galenus uniuersas ferè pharmacorū cōpositiones, ad mēsuras Romanorū, ponderaq; reduxerit: cū qbus, ubi exposita fuerint, facillimū cuiq; erit, q apud alias ciuitates in usu habent, cōferre.

De ponderibus.

Nomina pōderum medicinaliū, in que medici passim incidunt, sunt, mina, libra, vncia, drachma, Scriptulus, obolus, siliqua, & granū. Romana igitur mina continet libras. xx. Nam Aegyptia, & Attica, xvj. tantū constant. Libram aut xij. vnciæ constituunt, quarū singule ex drachmis octo constant. Porro drachmam Galenus idē esse uult cum Romano denario: q̄uis contendat aliqui, eam esse partem septimam vnciæ. Constat aut drachma scriptulis tribus, que à Græcis γράμματα, scrupuli à neotericis, corrupta uoce, appellatur. Quorū quisq; duos obolos continet: ut horum singuli, siliquas tres, que & ceratia dicuntur. At uerò unaqueq; siliqua, grana quaternapendet. Reperiuntur etiā creberri-
mè inter nomenclaturas ponderū, faba Græca & Aegyptia: ac præterea nux iuglans, & Pontica. E quibus Græca quidem faba, duos obolos pēdit: Aegyptia autem drach. j. S. At iuglans nux, siliquas. lxxij. ut Pontica, xvij. Quæ omnia ordine resolutorio explicata, facile ex hac tabella discernes.

Mina Aegyptia.

vnc. xvj.

Mina Romana.

vnc. xx.

Libra Romana.

vnc. xij.

Vncia.

drach. viij.

Drachma, siue denarius, siue olca.

script. iij.

Scriptulus, siue scrupulus.

obolos. ij.

Obolus

siliquas. iij.

Siliqua

grana. iiij.

Faba Græca,

obol. ij.

Faba Aegyptia

drach. j. S.

Nux iuglans.

siliquas. lxxij.

Nux Pontica.

siliquas. xvij.

Si igitur ubiq; locorum & gentium, libræ, uncia, & drachmæ, essent inter se eadē, liceret profecto nobis, iuxta Galeni dogmata, in quavis orbis plaga & regione, medicamenta citra discrimen præscribere. Quum autē euariant passim ea pondera, certē nisi quis omnia illa ad tabellā præscriptam reuocet, singulaq; ad usus expēdat, priusq; alicui, pharmacum catharticum porrigat, fieri ullo modo non potest, qn ab scopo aberret, uidelicet aut plus q̄ sit ex usu, propinans: aut minus q̄ morbus postulet. Equidem experiētia didici Hispanicam unciam Romanam esse obolis duobus maiorem. Parisiensem, ferē integrā drachma. Coloniensis, Bruxellensis, atq; Antuerpiensis uncia, sunt similes: quarū singulæ Romanam tribus obolis superant. Ab hac, uncia Veneta (quā experiundi gratia, nuper in officina quadā librai) propemodū sesquidrachma relinquitur. Siquidem Veneta libra medicinalis Romanæ libræ uncias. x. cum dimidia, plus minus, pendet. Pro ratione itaq; harum differentiarum possem ipse iam in singulis horum locorum, numerum drachmarū intrepidē & augere, & detrahē: id quod mihi non perinde liceret absq; summa egrotantium clade, si proportionem ponderum quam habent inter se mutuo, accuratē prius non explorassem. Quam quum haberem perspectam, cuidam adolescenti, quem in ædibus Illustrissimi D.D. Ioannis à Mendoza, Cæsariæ apud Venetos Oratoris Splendidiss. suscepi curandum, unciam unam soluentis pharmaci exhibui: cuius in urbe Roma propinare drach. vii. ausus non fuisset.

De notis ponderum quibus Medici in officinis utuntur.

VT autem Græcorum characteres, quibus pondera exprimunt, in præsentiarū prætereant, ceu nihil ad nos pertinentes: Medici recentiores pro uncia, hanc notam. ℥ . usurpant: quemadmodū hanc, ℥ . pro drachma: similiterq; illam. ℥ . pro scriptulo: subdentes postea numerū quem expedire arbitrantur. Vt si ori uentriculi confirmando huiusmodi unguen instituerimus. ℞ olei absinthij, & cydonio.

rum, anā 3.ij. Nardini, vnc. S. ceræ elotæ, drach. v. pulu. corallij, & mentæ, anā 3.ij. perinde sonāt ac si scribamus. Olei absinthij & cydoniorum, singulorū vnc. ij. Nardini unciā dimidiam. ceræ elotæ drach. v. pulueris corallij & mentæ, singulorum scriptulum unū &c. Quippe uox (anā) quæ aliquando etiam in Galeni cōmentarijs occurrit, cuiusq; ptes equas significat. Præstaret autem medicamenta ipsa, quæ in se humani generis uitam, necemq; gerunt, minimè quidem notis aut numeris, sed literis extensis exprimere. Qñquidem iota unum sublatum aut additū, imò uerò ēt apiculus unus, sæpe ægros ipsos in exitium atq; internicionem adegit. Porro ut flores solent dispensari pugillis, sic manipulis herbæ. Cōmuniter autem uolunt esse pugillum, q̄tum tribus digitis apprehēdi possit: manipulum uerò, q̄tum tota manu. Ac pugillum quidem, hac nota P. manipulum autem, hac M. nostri Medici exprimunt.

Græcæ liquidorum mensuræ (quæ maximè sunt in usu etiam apud Latinos Medicos) partim ex Galeno, partim ex cōmentarijs Iacobi Syluij, Medici hac nostra ætate Clarissimi, excerptæ.

CADVS, siue Ceraunium, capit choas, hoc est Romanos congios. xij. uel libras mensurales. cvij.

CHOA, siue Congius, sextarios sex capit, seu Atticas cotylas. xij. seu libras. ix.

SEXTARIVS cotylas. ij. seu libram unā & dimidiam, seu cyathos. xij. continet.

COTYLA, quam nonnulli heminam appellant, quartarios ij. seu uncias mensurales. ix.

SEMICOTYLA recipit acetabula. ij. uel uncias. iij. cum dimidia, existens quarta sextarij pars.

ACETABVLVM (Græci ὀξύβαλον uocant) sesquicyathum, seu uncias. ij. & drach. ij. pendet.

CYATHVS conchas. ij. seu mystra. iij. seu chemas. v. seu cochlearia. x. seu fescunciam.

CONCHA mystra. ij. seu chemas. ij. cū dimidia, seu drac. vj.

ET MENSVRIS.

487

MYSTRVM chemē unam, & quartam eius partem, seu cochlearia.ij. cum dimidio, seu drach. iij.

CHEME cochlearia.ij. seu drach. ij. script. j. & grana. iij. & quatuor quintas grani.

COCHLEARIVM, drachmam. j. scriptulū dimidium, grana. ij. & duas quintas grani.

Porro uinum nona parte pōdus olei excedit. Mellis autem ad uinum proportio est sesquipla: hoc est tertia parte mel ipso uino est grauius, ut liquet ex tabella subdita.

Ceraunium Ita- licum habet }	Olei lib. xc.	Vini lib. c.	Mellis lib. cl.
Congius	lib. vij. & semissem.	lib. viij. unc. iij.	lib. xij. & semissem.
Sextarius,	unc. xv.	unc. xvj. drach. v. script. j.	lib. ij. vn- cia. j.
Cotyla	unc. vij. drach. iij.	unc. viij. drach. ij. script. ij.	libra. j. drach. iij.
Oxybaphum	selescunciam drach. ij.	uncias. ij. script. ij.	unc. iij. drach. j.
Cyathus	drach. x.	uncia. j. drach. iij. siliquas. iij.	unc. ij. script. ij.

Mensuræ aridorum quibus Medici maximē utuntur.

MEDIMNVS capit choenicas. xlvij.

CHOENIX cotylas. iij. uel sesquiseptarium, seu libras. ij. & quadrantem. j. & unc. iij.

SEXTARIVS cotylas. ij. seu unc. xij.

COTYLE oxybapha. iij. seu unc. ix.

OXYBAPHVM, sexquicyathum, seu unc. ij. & drach. ij.

CYATHVS cochlearia. x. seu selescunciam.

COCHLEARIVM drach.j. script.S. grana.ij. & duas
quintas grani.

Crebro autē usurpat Galenus hanc uocem Besslem: quæ quo-
tiescunq; occurrerit, pro vncijs octo accipiatur.

*Hæc sunt itaq; Vir Ornatisime, quæ sub tuo nomine uolui
ut omnibus fierent communia studiosis: quare pro tua feceris di-
gnitate, si ea contra uiligatorum morsus defenderis. Vale fœli-
citer, plurimumq; saluta meo nomine communes utriq; nostrum
amicos, atq; integerrimos Viros, D. Berrocalem, Scriptorem
Apostolicum: necnon. D. Falconeum à Gueuara, Iuris pruden-
tiæ licentiatum absolutissimum.*

Venetijs. iij. Idus Aprilis. M. D. XLVIII.

SERIES CHARTARVM.

Aaaa Bbbb Cccc Dddd Eeee Ffff Gggg
Hhhh Iiii Kkkk Llll Mmmm Nnnn Oooo
Pppp Qqqq Rrrr Ssss Tttt Vuuu Xxxx
Yyyy Zzzz.


AAaa BBbb CCcc DDdd EEee FFff
GGgg HHhh.


Omnes sunt quaterni, præter HHhh, qui est duernus.

V E N E T I I S

Apud Hieronymum Scotum.

I S 4 8





P. 1